

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		CARA PERBAIKAN ROBEKAN <i>SERVIKS</i>		
		No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.25/I-SPO/MTR/VI/2025	01	1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah		
Pengertian	Robekan serviks adalah robekan mulut rahim yang terjadi saat kelahiran berlangsung			
Tujuan	1. Tidak terjadi perdarahan setelah melahirkan (HPP) 2. Tidak mempengaruhi persalinan berikutnya			
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Bidan			
Prosedur	1. Siapkan alat, meliputi : 1. Heacting set 2. Tena kulum/ring klem 3. Spikulum sim's 4. Kasa steril 5. Kain atau doek steril 6. Antiseptik 7. Lampu sorot atau lampu senter. 8. Dekatkan alat disamping pasien 2. Lakukan persiapan klien/pasien 1. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 5. Atur posisi pasien dalam posisi lithotomi 3. Siapkan lingkungan 1. Jaga privasi pasien dengan memasang sketsel / sampiran 2. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman 4. Pelaksanaan Cuci tangan sebelum tindakan dan pakai alat pelindung diri 1. Berikan dukungan emosional dan penjelasan 2. Tindakan aseptis dan antiseptik vagina dan serviks 3. Pada umumnya tidak diperlukan anastesi, jika robekan luas atau jauh sampai ke atas berikan petidin dan diazepam iv pelan-pelan. 4. Asisten menahan fundus uteri			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CARA PERBAIKAN ROBEKAN <i>SERVIKS</i>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.25/I-SPO/MTR/VI/2025	01	2 / 2
	5. Bibir serviks dijepit dengan klem ovum, pindah penjepitan searah jarum jam sehingga semua bagian serviks dapat diperiksa. Pada bagian yang terdapat robekan, tinggalkan 2 klem di antara robekan. 6. Jahit robekan serviks dengan catgut kromik 0 secara jelujur mulai dari apeks. 7. Jika sulit dicapai dan diikat, apeks dapat dicoba dijepit dengan klem ovum atau klem arteri dan dipertahankan 4 jam, kemudian: 8. Sesudah 4 jam klem dilepas sebagian saja 9. Sesudah 4 jam berikutnya klem dilepas semua 10. Jika robekan meluas sampai puncak vagina, lakukan laparotomi 5. Rapikan Pasien dan bereskan Alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 6. Lakukan Evaluasi dan Dokumentasi 1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 2. Dokumentasi tindakan pada rekam medik pasien		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang Kandungan & Kebidanan		