

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGobatan DAN KONSELING IMS											
		No. Dokumen 351.28/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3									
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 22 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes										
Pengertian	Pengobatan IMS perlu disertai konseling agar obat diminum sampai tuntas, pasien sembuh dan dapat mencegah infeksi ulang												
Tujuan	Sebagai acuan penerapan pengobatan dan konseling IMS												
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi. 2. Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada 3. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, Jakarta, 2015. 4. Standard Operasional Prosedur Klinik Infeksi Menular Seksual, Departemen Kesehatan- USAID- FHI-ASA, 2007.												
Prosedur	A. Alat dan Bahan 2 buah kursi - Meja - Dildo & Kondom - Brosur, leaflet, lembar balik - Tensimeter - Stetoskop - Obat-obatan; cefixim kaps 400 mg, azitromisin tab 1 g, metronidazol 500 mg, asiklovir, Benzatin Penicillin 2,4 jt IU, water for injection, spuit 10 cc & jarum no 18G, flukonazol tab. - Box emergency B. Prosedur 1. Pelajari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium oleh DPJP. 2. Tetapkan diagnosis dan terapinya, catat pada catatan medis. 3. Kriteria Diagnosis berdasarkan pemeriksaan laboratorium sederhana dan Pengobatan. <table><tr><td>Diagnosis</td><td>Kriteria Laboratorium</td><td>Pengobatan</td></tr><tr><td>Gonore</td><td>Diplokokus Gram Negatif intraseluler pada sediaan apus duhtubuh uretra/serviks dengan pewarnaan Gram</td><td>Cefixim 400 mg dosis tunggal, per oral Atau Levofloxacin* 500 mg, dosis tunggal, peroral</td></tr><tr><td>Non-gonokokus</td><td>Tidak ditemukan diplokokus Gram negatif intraseluler, namun sel lekosit PMN ≥ 5 pada sediaan apus</td><td>Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral Atau Doksisisiklin* 2 X 100 mg, peroral, 7 hari</td></tr></table>				Diagnosis	Kriteria Laboratorium	Pengobatan	Gonore	Diplokokus Gram Negatif intraseluler pada sediaan apus duhtubuh uretra/serviks dengan pewarnaan Gram	Cefixim 400 mg dosis tunggal, per oral Atau Levofloxacin* 500 mg, dosis tunggal, peroral	Non-gonokokus	Tidak ditemukan diplokokus Gram negatif intraseluler, namun sel lekosit PMN ≥ 5 pada sediaan apus	Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral Atau Doksisisiklin* 2 X 100 mg, peroral, 7 hari
Diagnosis	Kriteria Laboratorium	Pengobatan											
Gonore	Diplokokus Gram Negatif intraseluler pada sediaan apus duhtubuh uretra/serviks dengan pewarnaan Gram	Cefixim 400 mg dosis tunggal, per oral Atau Levofloxacin* 500 mg, dosis tunggal, peroral											
Non-gonokokus	Tidak ditemukan diplokokus Gram negatif intraseluler, namun sel lekosit PMN ≥ 5 pada sediaan apus	Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral Atau Doksisisiklin* 2 X 100 mg, peroral, 7 hari											

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGobatan DAN KONSELING IMS		
	No. Dokumen 351.28/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3
		duh tubuh uretra, atau ≥ 30 bila berasal dari serviks	
	Trikomoniasis	Ditemukan ≥ 1 trikomonas vaginalis yang bergerak pada sediaan basah NaCl pada sampel Duh Tubuh Vagina atau pada urin	Metronidazol** 2gr dosis tunggal atau Metronidazol** 2 X 500 mg/hari, peroral selama 7 hari
	Vaginosis Bakterial	Bila ditemukan 3 dari 4 kriteria berikut : - Duh Tubuh Vagina - Clue Cell Positif - Sniff test Positif - Ph vagina > 4.5	Metronidazol** 2gr dosis tunggal atau Metronidazol** 2 X 500 mg/hari, peroral selama 7 hari
	SifilisDini	RPR Positif Sifilis Rapid/TPHA Positif; gejala tanda ulkus/ rash coitus susp: < 2 tahun Titer $\geq 1:8$	Benzatin Penicilin 2,4 Juta IU IM Dosis Tunggal
	Servitis	Bila ditemukan 1 dari 3 kriteria berikut : - Duh Tubuh Servick Mukopurulen - PMN Positif - Diplokokus Intraseluler	Sefiksim 400 mg dosis tunggal, per oral dan Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral
	Kandidiasis Vaginalis	Ditemukan pseudohifa/ blatospora pada sediaan basah KOH 10 % pada sampel Duh Tubuh Vagina	Flukonazol** 150 mg peroral dosis tunggal Atau Nistatin, 100.000 IU, intravaginal setiap hari selama 7 hari
	Urethritis GO	Bila ditemukan keadaan berikut: - Duh Tubuh Urethra Mukopurulen - PMN Positif - Diplokokus Intraseluler Positif	Sefiksim 400 mg dosis tunggal, per oral Atau Levofloxacin*500 mg, dosis tunggal, peroral
	Urethritis Non GO	Bila ditemukan keadaan berikut: - Duh Tubuh Urethra Mukopurulen - PMN Positif	Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral Atau Doksisiklin* 2 X 100 mg, peroral, 7 hari

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGobatan DAN KONSELING IMS		
	No. Dokumen 351.28/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
		- Tidak ditemukan Diplokokus Intraseluler	
	Proctitis	Ditemukan - Duh Tubuh Anus Mukopurulen	Sefiksim 400 mg dosis tunggal, per oral dan Azitromisin 1 gr dosis tunggal peroral
* Tidak boleh diberikan kepada anak dibawah 12 tahun ** Tidak boleh diberikan kepada Ibu hamil, Ibu menyusui atau anak dibawah 12 tahun dan pasien dalam pengobatan metronidazole diajurkan menghindari alkohol 4. Panggil pasien ke ruang konseling. 5. Berikan konseling pada pasien mengenai: a. Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium. b. Diagnosis, cara penularan, diskusikan sumber penularan, dan kemungkinan orang lain yang tertular, cara pencegahan. c. Obat yang diberikan; cara minum atau pakainya, berapa kali sehari, harus dihabiskan, hal-hal yang sebaiknya dilakukan sehubungan dengan obatnya, hal-hal yang harus dihindari saat pasien minum obat. 6. Minta pasien untuk mengulangi pesan dokter atau paramedis sehubungan dengan obat, untuk memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan. 7. Demonstrasikan cara memakai kondom yang benar. Minta pasien untuk mendemonstrasikannya kembali untuk memastikan pasien mampu memasang kondom dengan benar. 8. Jelaskan kapan pasien harus kembali untuk kontrol. 9. Diskusikan tentang pentingnya mendiagnosis dan memberikan terapi kepada pasangan seksual. Mintalah pasien untuk mengajak pasangan seksualnya untuk datang ke klinik. 10. Berikan kondom, jika pasien bersedia.			
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi RS 2. Instalasi Laboratorium		