



PENGKAJIAN RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
826.20/I-SPO/KPW/IX/2025

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

STANDART
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
08 September 2025

Ditetapkan Oleh:
PLT Direktur RS. Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Pengertian	Suatu prosedur dalam melakukan identifikasi dan pengkajian populasi pasien resiko tinggi pada pasien emergensi sebagai upaya mencegah kejadian yang tidak diharapkan
Tujuan	Sebagai acuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji populasi pasien resiko tinggi pada pasien emergensi supaya dapat dilakukan upaya peventif yang diperlukan
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien
Prosedur	- Lakukan identifikasi terhadap pasien dengan resiko bunuh diri berdasarkan besarnya kemungkinan pasien melakukan bunuh diri. Tiga macam perilaku bunuh diri tersebut adalah : - Isyarat bunuh diri Ditunjukkan dengan berperilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri, misalnya dengan mengatakan : “Tolong jaga anak-anak karena saya akan pergi jauh!” Atau “Segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya” Pada kondisi ini pasien mungkin sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya namun tidak disertai ancaman dan percobaan bunuh diri. Pasien umumnya mengungkapkan perasaan seperti rasa bersalah/ sedih/marah/putus asa/ tidak berdaya. Pasien juga mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri sendiri yang menggambarkan harga diri rendah. - Ancaman bunuh diri Umumnya diucapkan oleh pasien, berisi keinginan untuk mati disertai dengan rencana untuk mengakhiri kehidupan dan persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Secara aktif pasien telah memikirkan rencana bunuh diri, namun tidak disertai dengan percobaan bunuh diri. Walaupun dalam kondisi ini pasien belum pernah mencoba bunuh diri, pengawasan ketat harus dilakukan. Kesempatan sedikit saja dapat dimanfaatkan pasien untuk melaksanakan - Percobaan bunuh diri Merupakan tindakan pasien mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri kehidupannya. Pada kondisi ini, pasien aktif mencoba bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun, memotong urat nadi atau menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi - Petugas melakukan pengisian lembar asesmen bunuh diri
Unit Terkait	- Instalasi Rawat Inap (IRNA) - Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Maternitas <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) - Neonatologi <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU) - Instalasi Rawat Jalan (IRJA)