

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR TINDAKAN HEMODIALISIS DENGAN AKSES <i>DOUBLE LUMEN CATHETER</i> (DLC)		
	No. Dokumen 172/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Melakukan tindakan hemodialisis dengan menggunakan akses <i>double lumen catheter</i> (DLC) yang sudah terpasang	
Tujuan	<i>Insersi akses DLC berjalan aman, tepat, dan nyaman sehingga dapat meminimalisir risiko infeksi ataupun komplikasi intra hemodialisis</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan alat 1. Sarung tangan non steril 2. HD pack 3. Salep antibiotik 4. NaCl 0,9% 5. Betadin 6. Heparin B. Persiapan akses DLC 1. Perawat ucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga 2. Lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir menggunakan pertanyaan terbuka 3. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan 4. Atur posisi pasien setengah duduk agar pasien nyaman dalam pelaksanaan tindakan 5. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan non steril 6. Buka perban DLC, kemudian buang di tempat sampah limbah medis 7. Lakukan perawatan DLC sesuai prosedur berikut: a. Buka HD <i>pack</i> b. Buka spuit 3 cc dan 20 cc c. Pakai sarung tangan steril d. Bersihkan area exit site DLC dengan betadin dan NaCL 0,9%, tutup dengan kasa steril dan fiksasi dengan salep antibiotik e. Buka tutup DLC dan letakkan dalam kasa steril	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR TINDAKAN HEMODIALISIS DENGAN AKSES <i>DOUBLE LUMEN CHATHETER</i> (DLC)		
	No. Dokumen 172/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	f. Buang darah yang terdapat pada inlet kateter ke dalam bengkok atau tempat yang telah disediakan sejumlah $\pm$ 3 cc untuk mencegah masuknya bekuan darah ke dalam tubuh pasien g. Lakukan prosedur yang sama pada outlet kateter h. Isi spuit 3 cc dengan heparin sesuai kebutuhan i. Isi spuit 20 cc dengan NacCL 0,9% dan heparin j. Rapikan alat 8. Lepaskan sarung tangan dan mencuci tangan 9. Dokumentasikan kegiatan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		