

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS – HIPERTENSI		
	No. Dokumen 134/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Penanganan yang harus dilakukan bila terjadi hipertensi intradialisis	
Tujuan	<i>Mencegah terjadinya henti jantung intradialisis</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Hipertensi intradialisis ringan (TD < 180/120 mmHg) Berikan edukasi kepada pasien: 1. Kurangi asupan air agar kenaikan berat badan interdialitik tidak besar 2. Kurangi asupan garam 3. Rutin konsumsi obat anti hipertensi 4. Laporkan dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) B. Hipertensi intradialisis berat / krisis hipertensi (TD ≥ 180/120 mmHg) Tanpa kerusakan organ: 1. Pertimbangkan untuk menambah durasi hemodialisis disertai profiling ultrafiltrasi sampai tekanan darah membaik 2. Laporkan dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) Disertai kerusakan organ: 1. Pertimbangkan untuk menghentikan hemodialisis dan merujuk pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan terapi anti hipertensi segera 2. Laporkan dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)	
Unit Terkait	Unit Dialisis IGD	