

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS – HIPOTENSI		
	No. Dokumen 135/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS	
Pengertian	Tata laksana yang harus dilakukan bila terdapat hipotensi intradialisis		
Tujuan	1. <i>Penanganan hipotensi intradialisis</i> 2. <i>Pencegahan terjadinya henti jantung durante hemodialisis</i>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024		
Prosedur	1. Turunkan <i>quick of blood</i> (Qb) dan <i>ultrafiltration rate</i> (UFR) 2. Posisikan pasien pada posisi <i>trendelenburg</i> 3. Berikan normal salin 0,9% 100-200 cc (tergantung kondisi pasien) atau dekstros 40% 25 mL 4. Periksa tekanan darah dan nadi 5. Bila tekanan darah membaik, lanjutkan dialisis dan kaji ulang UFR. Pertimbangkan <i>profiling</i> UF 6. Bila belum ada kenaikan tekanan darah, ulangi pemberian NS 0,9% 100-200 cc atau D40 25 mL 7. Evaluasi ulang tekanan darah dan nadi 8. Pertimbangkan untuk menurunkan temperatur dialisat 9. Lapor dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) 10. Bila hipotensi masih berlanjut, pertimbangkan untuk menghentikan dialisis, darah dikembalikan ke tubuh pasien		
Unit Terkait	Unit Dialisis		