

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INDEPENDENT DUOBLE CHECK PEMBERIAN OBAT		
	No. Dokumen 962.1/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 08 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep
Pengertian	Proses di mana dua tenaga kesehatan secara independen memverifikasi pemberian obat tanpa memengaruhi atau berdiskusi sebelumnya. <i>Independent Double Check</i> digunakan pada situasi dengan risiko tinggi (<i>high alert</i>), seperti pemberian obat kemoterapi, insulin, atau heparin tetapi memiliki prosedur yang memerlukan presisi tinggi.	
Tujuan	Mengurangi risiko kesalahan manusia dalam situasi berisiko tinggi dengan verifikasi independen dan terhindar dari <i>medication error</i> .	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 2148.145/RSPHS/I-PER/DIR/IV/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	
Prosedur	1. Periksa terlebih dahulu obat yang telah disiapkan sudah lengkap dari segi kolom I.S.E.P (Input-Siap-Etiket-Penyerah) sudah terisi nama staff yang mengerjakan (terlampir nama panggilan staff tidak diperbolehkan hanya memakai Inisial nama). 2. Periksa kesesuaian 5 Benar obat (Pasien, Obat, Dosis, Rute pemberian, Waktu pemberian) sesuai dengan resep. 3. Lakukan identifikasi pasien sebelum melakukan penyerahan obat dengan melihat identitas, meliputi (nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis) 4. Lakukan serah terima obat dengan petugas lain (Bidan, Perawat, Dokter). Pemeriksaan <i>Independent double check</i> dilakukan oleh dua tenaga kesehatan secara independen memverifikasi pemberian obat tanpa memengaruhi atau berdiskusi sebelumnya. 5. Lakukan pembacaan resep dokter oleh petugas pertama secara independen. 6. Lakukan verifikasi mandiri, petugas pertama memeriksa label, dosis, bentuk sediaan, jumlah, waktu pemberian, rute penggunaan, indikasi obat. 7. Lakukan pemeriksaan ulang resep oleh petugas kedua secara independen. 8. Lakukan verifikasi mandiri, petugas kedua memeriksa label, dosis, bentuk sediaan, jumlah, waktu pemberian, rute penggunaan, indikasi obat. 9. Lakukan diskusi setelah kedua petugas menyelesaikan pemeriksaan masing-masing, hasil dibandingkan dan menyepakati hasil sebelum obat diberikan.	
	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Kamar Operasi 5. Instalasi Gawat Darurat 6. <i>Intensive Care Unit</i> 7. Maternitas 8. Perinatologi	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INDEPENDENT DUOBLE CHECK PEMBERIAN OBAT		
	No. Dokumen 962.1/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

LAMPIRAN

DAFTAR OBAT YANG MEMERLUKAN *INDEPENDENT DOUBLE CHECK*

1. Obat dengan Risiko Tinggi (High-Alert Medications)

- **Antikoagulan** (Heparin, Warfarin, Enoxaparin)
- **Insulin** (Semua jenis insulin termasuk Insulin Regular, Insulin Glargine, Insulin Aspart)
- **Elektrolit Konsentrat** (Kalium Klorida IV, Magnesium Sulfat IV, Natrium Klorida hipertonik 3% atau lebih)
- **Narkotik dan Opioid** (Morfina, Fentanil, Oksikodon, Hidromorfon)
- **Obat Kemoterapi** (Doksorubisin, Sisplatin, Metotreksat dosis tinggi)
- **Obat Neuromuskular Blokade** (Rokuronium, Vekuronium, Suksinilkolin)
- **Obat Sedasi dan Anestesi** (Propofol, Midazolam, Ketamin)
- **Obat Hipoglikemik Oral** (Glimepirid, Glibenklamid, Repaglinid)

2. Obat dengan Potensi Toksisitas Tinggi

- **Digoxin** (Mempunyai indeks terapi sempit, dapat menyebabkan toksisitas jantung)
- **Aminoglikosida** (Gentamisin, Amikasin)
- **Vancomycin** (Perlu pemantauan kadar obat dalam darah)
- **Antiaritmia** (Amiodaron, Lidokain IV)
- **Obat Imunosupresan** (Takrolimus, Siklosporin, Azatioprin)

3. Obat yang Membutuhkan Perhitungan Dosis Akurat

- **Obat Pediatri dan Neonatus** (Ampisilin, Gentamisin, Furosemid pada bayi baru lahir)
- **Obat yang Memerlukan Pengenceran Kritis** (Dobutamin, Dopamin, Noradrenalin)
- **Obat dengan Dosis Berdasarkan Berat Badan atau Luas Permukaan Tubuh** (Kemoterapi, Obat Anestesi)

4. Obat yang Berpotensi Menyebabkan Efek Samping Parah atau Fatal

- **Obat untuk Pasien dengan Insufisiensi Ginjal atau Hepatik** (Antibiotik tertentu, Antikejang)
- **Obat dengan Potensi Overdosis Tinggi** (Metotreksat oral dosis mingguan, Opioid dosis tinggi)