

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PEMBERIAN ANESTESI SUB ARACHNOID BLOK		
	No. Dokumen 935.31/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Suatu cara pemberian obat anestesi lokal hiperbarik 0,5 % golongan Bupivacaine atau isobarik golongan Ropivacaine, Lidocain 5 % menggunakan jarum spinal ke dalam <i>canalis serebrospinalis</i>	
Tujuan	Melakukan blok saraf untuk menghilangkan sensasi nyeri dan relaksasi otot sesuai ketinggian blok diinginkan untuk pasien yang akan menjalani tindakan operasi di area tubuh dengan dermatom setinggi thoracal IV ke bawah.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	- Persiapan alat dan obat : - Spinal set steril - Sput 3 cc, 5 cc dan 10 cc - Alat Monitor pasien. - Penutup luka antiseptik - Jarum spinal no.27 atau sesuai kebutuhan - Obat-obatan emergency (Sulfas Atropin, Ephedrin, Epineprin, Dexamethasone) - Obat anestesi lokal hiperbarik 0,5%, Lidocain 5% atau isobarik yang dibutuhkan - Obat anestesi lokal lidocain 2 % - Obat adjuvant sesuai kebutuhan (morphine) - Persiapan Pasien. - Jelaskan pada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan. - Atur posisi pasien tidur terlentang. - Pelaksanaan - Cuci tangan. - Pasien diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. - Pasang monitor pasien: NBP, ECG, Saturasi O2 - Posisikan pasien duduk atau berbaring lateral dengan punggung fleksi maksimal untuk analgesi spinal. - Identifikasi Lumbal 3 – 4	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERIAN ANESTESI <i>SUB ARACHNOID BLOK</i>		
	No. Dokumen 935.31/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	f. Desinfeksi dengan menggunakan Isodine dan alkohol 70 %. g. Infiltrasi menggunakan lidocain 2 % bila diperlukan. h. Inseri jarum spinal sesuai ukuran sampai keluar cairan cerebro spinalis. i. Lakukan barbotage , bila terdapat cairan cerebrospinalis dan tidak dijumpai darah kemudian diinjeksikan obat anestesi Spinal. j. Pasien diposisikan terlentang kembali. k. Evaluasi dan atur ketinggian blok. l. Observasi tanda-tanda vital pasien. m. Catat jenis, dosis obat anestesi yang dimasukkan. n. Catat perubahan tanda vital di lembar observasi o. Cuci tangan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. IPSRS		