

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MONITORING TINDAKAN ANESTESI LOKAL DILUAR KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 935.47/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Melakukan observasi dan mencatat informasi status fisiologis selama pasien dalam pengaruh obat anestesi local diluar kamar operasi.	
Tujuan	1. Memberikan kenyamanan pada pasien saat mendapatkan tindakan 2. Menghilangkan nyeri pada pasien sebelum dilakukan tindakan. 3. Memberikan anestesi lokal yang aman bagi pasien.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Oksimetri 4. Lembar monitoring pemberian anastesi. 5. Lidocain 2 % / Pehacain 6. SA (Sulfas Atropine) 7. Handscoon 8. Sduit 3 cc 9. Alcohol swab Persiapan Perawat 1. Pemberian anestesi hanya dilakukan oleh dokter atau perawat yang telah terlatih. 2. Monitoring dilakukan oleh perawat terlatih dan jika perlu dilakukan supervisi oleh kepala ruang. Pelaksanaan 1. Cek kembali rekam medis, instruksi pemberian obat anestesi, dosis, dan rute / cara pemberian. 2. Pastikan kembali lembar persetujuan tindakan telah ditandatangani oleh keluarga / orang yang bertanggung jawab atas pasien. 3. Identifikasi pasien, pastikan tidak ada kontra indikasi pemberian anestesi (riwayat alergi terhadap obat anestesi lokal). 4. Mempersiapkan pasien dan menjelaskan prosedur. 5. Cuci tangan 6. Mempersiapkan obat yang akan diberikan, sesuai dengan terapi yang diterima pasien.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MONITORING TINDAKAN ANESTESI LOKAL DILUAR KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 935.47/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	7. Pasang monitor dan tensi otomastis 8. Pasang oksimetri 9. Lakukan pemeriksaan tanda vital dan saturasi oksigen 10. Catat hasil pemeriksaan, lengkap dengan waktu pada lembar monitoring. 11. Injeksikan obat, maksimal pemberian lidokain 2% / pehacain adalah 5mg/KgBB, jika luka sangat lebar dan memerlukan anestesi lebih encerkan dengan NS dengan perbandingan 1:1, atau berikan adrenalin 0,1 dan dapat diberikan hingga maximal 7 mg/KgBB. 12. Ulangi pemberian dalam 30 menit jika dibutuhkan tindakan yang lebih panjang 13. Pantau adanya tanda-tanda toksisitas lidokain 2% / pehacain, tandanya antara lain: a. Bradikardi, penurunan SV dengan gejala pasien mengeluh pusing, penurunan kesadaran dan rasa tebal pada lidah. b. Penurunan tekanan darah. c. Jika terdapat tanda toksisitas pemmberian lidokain berikan SA (sulfas atropin) 2 ampul untuk tindakan awal. 14. Catat waktu pemberian dilembar monitoring. 15. Pastikan pasien aman hingga batas waktu <i>clearance</i> terlewati (30-45 menit pada lidokain 2% / pehacain). 16. Cuci tangan 17. Dokumentasikan direkam medis.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. <i>Intensive Care Unit</i> 5. Unit Maternitas 6. Unit Perinatologi		