

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROFILAKSIS PASCA PAJANAN (PPP)		
	No. Dokumen 935.73/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
Pengertian	Profilaksis pasca pajanan (PPP) adalah pengobatan antiretroviral jangka pendek untuk menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi pasca pajanan HIV dan Hepatitis, baik di tempat kerja melalui hubungan seksual. Dalam lingkup pelayanan kesehatan, PPP merupakan bagian dari pelaksanaan paket Kewaspadaan Universal yang menekankan terjadinya pajanan terhadap bahan menular.	
Tujuan	1. Agar seluruh petugas mematuhi protokol kewaspadaan universal. 2. Imunisasi Hepatitis B untuk petugas kesehatan bila sumber daya memungkinkan. 3. Ketersediaan obat PPP dapat mengurangi risiko penularan HIV di tempat kerja pada petugas kesehatan. 4. Ketersediaan obat PPP pada petugas kesehatan dapat meningkatkan motivasi petugas kesehatan untuk bekerja dengan orang yang terinfeksi HIV. 5. Ketersediaan obat PPP diharapkan dapat membantu pemahaman tentang adanya risiko terpajan dengan HIV di tempat kerja.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	1. Pertolongan pertama : cuci segera luka dan kulit yang terkena darah atau cairan tubuh dengan air mengalir dan sabun bila diperlukan kemudian permukaan mukosa dibilas dengan air. 2. Nilailah pajanan tentang potensi penularan infeksi HIV / Hepatitis berdasarkan tingkat berat pajanan dan macam cairan tubuh. 3. Berilah profilaksis pasca pajanan a. Pemberian antiretroviral untuk HIV dilakukan pada pajanan bersumber dari ODHA (atau sumber yang kemungkinan terinfeksi dengan HIV). b. Pemberian injeksi HB Imunoglobulin dan vaksin HBV 3x (bulan ke-1, bulan ke-2 dan bulan ke-5 pasca pajanan) pada pajanan bersumber dari pasien HbSAg positif	

	4. Lakukan evaluasi pada sumber pajanan tentang kemungkinan adanya infeksi HIV dan hepatitis. a. Pemeriksaan HIV atas sumber pajanan hanya dapat dilaksanakan setelah diberikan konseling pra tes dan mendapatkan persetujuan (<i>informed consent</i>), dan tersedia rujukan untuk konseling, dukungan selanjutnya serta jaminan untuk menjaga konfidensialitas yang luka. b. Pemeriksaan HbSAg dan HCV dilakukan setelah terpajan HbSAg positif 5. Rahasiakan identitas petugas pasca pajanan. 6. Lakukan konsultasi kepada dokter jaga penyakit dalam. 7. Periksakan laboratorium lengkap sesuai hasil konsultasi.
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Maternitas dan Perinatologi 3. Instalasi Gawat Darurat. 4. Instalasi Rawat Jalan. 5. Instalasi Kamar Operasi. 6. Instalasi Farmasi. 7. Instalasi Sterilisasi dan Laundry. 8. Instalasi Gizi dan Dapur 9. Instalasi Laboratorium. 10. Instalasi Radiologi. 11. <i>Cleaning Service</i>. 12. Komite PPI