

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.78/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep	
Pengertian	Kewaspadaan yang diterapkan untuk memutus mata rantai transmisi mikroba penyebab infeksi pada pasien yang diketahui maupun dugaan terinfeksi atau terkolonisasi patogen yang dapat ditransmisikan lewat udara (airborne), droplet, kontak dengan kulit maupun lingkungan yang terkontaminasi.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan kewaspadaan berdasarkan transmisi		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	1. Penempatan pasien a. Transmisi melalui kontak - Tempatkan di ruang rawat terpisah bila tidak memungkinkan kohorting, bila keduanya tidak memungkinkan maka pertimbangkan epidemiologi mikrobanya melalui edukasi pasien - Tempatkan pasien dengan jarak > 1 meter - Jaga supaya tidak terjadi kontaminasi silang ke lingkungan dan pasien lain. b. Transmisi melalui droplet - Tempatkan di ruang rawat terpisah bila tidak memungkinkan kohorting, bila keduanya tidak memungkinkan, buat pemisah dengan jarak >1 meter antar tempat tidur dan jarak dengan pengunjung - Pertahankan pintu terbuka, tidak perlu penanganan khusus terhadap udara dan ventilasi. c. Transmisi melalui udara (airborne) - Tempatkan pasien di ruang terpisah dengan aliran udara ≥ 12 ACH - Usahakan pintu ruang pasien selalu tertutup - Bila ruang terpisah tidak memungkinkan, tempatkan pasien dengan pasien lain yang mengidap mikroba yang sama, jangan dicampur dengan infeksi yang lain dengan jarak > 1 meter 2. Transportasi pasien a. Transmisi melalui kontak - Batasi gerak - Transportasi pasien jika perlu - Bila diperlukan pasien keluar ruangan, perlu kewaspadaan agar resiko minimal transmisi ke pasien lain atau lingkungan dan pasien b. Transmisi melalui droplet - Batasi gerak dan transportasi		

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.78/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3
	- Untuk membatasi droplet dari pasien dengan menggunakan bedah pada pasien - Terapkan hygiene respirasi dan etika batuk c. Transmisi melalui airborne - Batasi gerak dan transportasi pasien hanya kalau perlu saaja - Bila perlu untuk pemeriksaan pasien dapat diberikan masker N95 3. Penggunaan APD petugas a. Transmisi melalui kontak - Cuci tangan kemudian memakai sarung tangan bersih nonsteril saat masuk keruangan pasien, ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius (feses, cairan tubuh/darah, cairan drain) - Lepaskan sarung tangan sebelum keluar dari kamar pasien dan cuci tangan dengan antiseptik b. Transmisi melalui droplet - Cuci tangan kemudian memakai sarung tangan bersih nonsteril saat masuk keruangan pasien, ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius (feses, cairan tubuh/darah, cairan drain) - Lepaskan sarung tangan sebelum keluar dari kamar pasien dan cuci tangan dengan antiseptik - Gunakan masker bila bekerja dalam radius 1 meter terhadap pasien, masker seyogyanya menutupi mulut dan hidung, dipakai saat memasuki ruang rawat pasien dengan infeksi saluran nafas - Gaun bersih/ tidak steril dipakai saat memasuki ruangan rawat pasien bila baju yang digunakan tembus air - Jaga agar tidak terjadi kontaminasi silang antara pasien dengan lingkungan dan dari lingkungan pasien lain c. Transmisi melalui airborne - Gunakan masker respirator (masker N95) saat masuk ruang rawat pasien - Bila melakukan tindakan dengan kemungkinan timbul aerosol, gunakan sarung tangan, tutup kepala, google, gaun/ apron dan sepatu booth 4. Peralatan untuk perawatan pasien a. Transmisi melalui kontak - Bila memungkinkan peralatan non kritikal dipakai untuk satu pasien, atau untuk pasien dengan mikroba yang sama - Bersihkan peralatan sebelum digunakan kepada pasien yang lain b. Transmisi melalui droplet - Tidak perlu penanganan udara secara khusus - Desinfeksi permukaan yang dilakukan terjadwal dengan baik (desinfeksi permukaan dilakukan setiap hari dan dilakukan bongkaran besar setiap minggunya) c. Transmisi melalui airborne - Ruang rawat pasien bila memungkinkan dibuat bertekanan negatif dengan filtrasi udara menggunakan hepa filter, bila tidak memungkinkan bisa dg ventilasi alamiah atau ventilasi campuran		
Unit Terkait	Semua Unit Pelayanan, Penunjang dan Umum Komite PPI		

 RUJAH SAKIT PRIMA HUSADA	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.78/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3