



FORMULARIUM PT. DISA PRIMA MEDIKA TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : disaprimamedika@gmail.com

FORMULARIUM PT. DISA PRIMA MEDIKA 2025

Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusunan Formularium PT. Disa Prima Medika



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

Pengadaan Farmasi PT. Disa Prima Medika

[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)

(apt. Yeny Imas Christiana, S. Farm)

Disetujui Oleh :
Ketua Komite Farmasi dan Terapi

[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)

(dr. Sadi Hariono, MMRS)

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR : 1120/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025**

TENTANG

PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,

- Menimbang : a. bahwa Formularium disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai kajian pola penyakit yang terjadi di rumah sakit dan mempertimbangkan formularium nasional
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur PT. Disa Prima Medika tentang Formularium yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1818/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA TENTANG PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**
- Kedua : Penetapan Formularium Rumah Sakit Prima Husada sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan jika diperlukan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Formularium Rumah Sakit Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Formularium PT. Disa Prima Medika ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi daftar sediaan farmasi yang tersedia di rumah sakit dan telah disepakati oleh para anggota Komite Farmasi dan Terapi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan formularium ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Formularium PT. Disa Prima Medika yang menaungi Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Sukorejo ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada Group dapat lebih baik.

Malang, 1 November 2025
Direktur PT. Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERATURAN DIREKTUR	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
1 Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Non Steroid, Antipirai	5
1.1 Analgesik Narkotik	5
1.2 Analgesik Non Narkotik	5
1.3 Anti Pirai	6
1.4 Nyeri Neuropatik	7
2 Anestetik	7
2.1 Anastesik Lokal	7
2.2 Anastesik Umum dan Oksigen	7
2.3 Obat untuk Prosedur Operative	8
3 Relaksan Otot Perifer dan Penghambat Kolinesterase	8
3.1 Penghambat dan Pemacu Transmisi Neuromuskuler	8
3.2 Obat untuk Miastenia Gravis	8
3.3 Penghambat Kolinesterase	8
3.4 Spasme Muskuloskeletal	8
4 Antialergi dan Anafilaksis	8
5 Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan	9
6 Antiepilepsi-Antikonvulsi	9
7 Antiinfeksi	10
7.1 Anti Bakteri	10
7.1.1 Beta Laktam	10
7.2 Antibakteri Lain	11
7.2.1 Makrolid	11
7.2.2 Aminoglikosida	11
7.2.3 Linkosamid	11
7.2.4 Tetrasiklin	12
7.2.5 Sulfametoksazol - Trimetropim	12
7.2.6 Kuinolon	12
7.2.7 Lain-Lain	12
7.3 Anti Infeksi Khusus	13
7.3.1 Antituberkulosis	13
7.3.2 Antilepra	14
7.3.3 Antiseptik Saluran Kemih	14
7.4 Anti Infeksi Khusus	13
7.4.1 Antifungi Sistemik	14
7.4.2 Antivirus	14
8 Anti Migrain dan Anti vertigo	14
8.1 Anti Migrain	15
8.2 Anti Vertigo	
9 Anti Neoplastik, Imunosupresan, dan Obat untuk Terapi Paliatif	15
9.1 Hormon dan Anti Hormon	15
9.2 Imunosupresan	15
9.3 Neurotonik	15
10 Anti Parkinson	16
11 Obat yang Mempengaruhi Darah	16
11.1 Anti Anemia	16
11.2 Obat yang Mempengaruhi Koagulasi	16
12 Produk Darah Dan Pengganti Plasma	17
12.1 Pengganti Plasma dan Plasma Ekspander	17
13 Diagnostik	17
13.1 Bahan Kontras Radiologi	17
13.2 Tes Fungsi	17
13.2.1 Tes Kulit	17
13.3 Ultrasound	17

13.4 Lain-Lain	17
14 Antiseptik dan Disinfektan	18
14.1 Antiseptik	18
14.2 Disinfektan	18
15 Obat dan Bahan untuk Gigi	18
15.1 Anti Fungi Orofaringeal	18
16 Diuretik dan Obat untuk Hipertrofi Prostat	18
16.1 Diuretik	18
16.2 Obat untuk Hipertrofi Prostat	18
17 Hormon, Obat Endokrin Lain, dan Kontrasepsi	19
17.1 Anti Diabetes	19
17.1.1 Anti Diabetes Oral	19
17.1.2 Anti Diabetes Parenteral	19
17.2 Hormon Kelamin dan Obat yang Mempengaruhi Fertilitas	21
17.2.1 Estrogen	21
17.2.2 Progesteron	21
17.2.3 Kontrasepsi	21
17.2.3.1 Kontrasepsi, Oral	21
17.2.3.2 Kontrasepsi, Parenteral	22
17.2.3.3 Kontrasepsi, AKDR (IUD)	22
17.2.3.4 Kontrasepsi, Implan	22
17.3 Hormon Tiroid dan Anti Tiroid	22
17.4 Kortikosteroid	22
18 Obat Kardiovaskuler	23
18.1 Antiangina	23
18.2 Anti Aritmia	23
18.3 Anti Hipertensi Sistemik	24
18.4 Anti Hipertensi Pulmonal	25
18.5 Anti Agregasi Platelet	25
18.6 Trombolitik	27
18.7 Obat untuk Gagal Jantung	27
18.8 Obat untuk Kardiogenik dan Sepsis	28
19 Antihiperlipidemia	29
20 Obat Topikal untuk Kulit	48
20.1 Antiakne	30
20.2 Anti Bakteri	30
20.3 Anti Fungi	30
20.4 Anti Inflamasi dan Antipruritik	31
20.5 Antiskabies dan Antipedikulus	31
20.6 Keratolitik dan Keratoplastik	31
20.7 Lain-Lain	31
21 Larutan Elektrolit, Nutrisi, dan Lain-Lain	32
21.1 Oral	32
21.2 Parenteral	32
21.3 Elektrolit Pekat	34
21.4 Lain-Lain	34
22 Obat untuk Mata	34
22.1 Miotik dan Antiglaukoma	36
23 Oksitoksik	36
24 Psikofarmaka	36
24.1 Anti Ansietas	36
24.2 Anti Depresi	37
24.3 Anti Obsesi Kompulsi	37
24.4 Anti Psikosis	37
24.5 Obat untuk Gangguan Bipolar	38
25 Obat untuk Saluran Cerna	38
25.1 Antasida dan Antiulkus	38
25.2 Antiemetik	39
25.3 Antihemoroid	39
25.4 Antispasmodik	40
25.5 Obat untuk Diare	40



25.6 Katartik	40
25.7 Obat untuk Antiinflamasi	40
25.8 Lain-Lain	40
26 Obat Untuk Saluran Nafas	40
26.1 Antiasma	42
26.2 Antitusif	42
26.3 Ekspektoran dan Antimukolitik	42
26.4 Obat untuk Penyakit Paru Obstruksi Kronik	42
26.5 Batuk, Pilek, dan Flu	43
27 Obat yang Mempengaruhi Sistem Imun	43
27.1 Serum dan Immunoglobulin	43
27.2 Vaksin	43
28 Obat untuk Telinga, Hidung, dan Tenggorokan	45
29 Vitamin dan Mineral	45



KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		PERESEPAN MAKSIMAL	PRB	APOL	OEN	UMUM/ ASURANSI
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI							
1.1 ANALGESIK NARKOTIK							
1	Fentanil						
	a)	Hanya untuk nyeri berat dan harus diberikan oleh tim medis yang dapat melakukan resusitasi.					
	1.	Inj 0,05 mg/mL (i.m./ i.v.)	10 amp/kasus	(-)	(-)	√	√
2	Kodein						
	1.	Tab 10 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	2.	Tab 15 mg		(-)	(-)	√	√
	3.	Tab 20 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
3	Morfin						
	a)	Untuk pemakaian pada tindakan anestesi atau perawatan di Rumah Sakit;					
	b)	Untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak respons terhadap analgesik non narkotik;					
	c)	Untuk nyeri pada sindrom koroner akut.					
	1.	Inj. 10 mg/ ml	infus per 24 jam	(-)	(-)	(-)	√
4	Petidin						
	a)	Hanya untuk nyeri sedang hingga berat pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit.					
	b)	Tidak digunakan untuk nyeri kronis.					
	1.	Inj. 50 mg/ ml	2 amp/hari	(-)	(-)	(-)	√
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK							
1	Ibuprofen						
	1.	Tab 400 mg	- Untuk nyeri akut : 14 tab/kasus - Untuk nyeri kronis : 60 tab/bulan	(-)	(-)	√	√
	2.	Susp 200 mg/ 5 ml	1 btl/kasus	(-)	(-)	√	√
	3.	inj 100 mg/mL	2.400 mg/hari selama 3 hari	(-)	(-)	√	√
		Digunakan untuk analgesik perioperatif, atau untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.					
2	Ketorolac						
	1.	inj 30 mg/mL	2-3 amp/hari, maks. 5 hari.	(-)	(-)	(-)	√
		Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.					
3	Metamizol						
	1.	Untuk nyeri post operatif dan hanya dalam waktu singkat.					
		inj 500 mg/mL	3 amp/hari, maks. 5 hari.	(-)	(-)	(-)	√
4	Parasetamol						
	1.	Tab 500 mg	180 tab/bulan	(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 600 mg		(-)	(-)	√	√
	3.	Sir 120 mg/5ml	2 btl/kasus	(-)	(-)	√	√
	4.	Drop 100 mg/ml	1 btl/kasus	(-)	(-)	√	√
	5.	Inf 10 mg/ml	3 btl/hari, maks.3 hari	(-)	(-)	(-)	√
Hanya untuk pasien di ruang perawatan intensif yang memerlukan analgesik berkelanjutan.							
5	Tramadol						
	Hanya untuk nyeri sedang sampai berat.						
	1.	Kaps 50 mg		(-)	(-)	(-)	√

	2.	Inj 50 mh/ml	3 amp/hari, maks. 7 hari	(-)	(-)	(-)	√
6		Asam mefenamat					
	1.	Tab 500 mg	30 tab/bulan	(-)	(-)	(-)	√
7		Natrium diklofenak					
	1.	Tab 50 mg	30 tab/bulan	(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tab. lepas lambat 75 mg		(-)	(-)	(-)	√
8		Kalium diklofenak					
	1.	Tab 50 mg		(-)	(-)	(-)	√
9		Ketoprofen					
	1.	Tab 100 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Suppositoria 100 mg	2 sup/hari, maks 3 hari	(-)	(-)	(-)	√
		Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.					
10		Meloksikam					
	1.	Tab 7.5 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tab 15 mg		(-)	(-)	(-)	√
11		Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg					
	1.	Krim	Sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
12		Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg, vit. E 30 mg					
	1.	Krim	Sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
13		Kombinasi mengandung : Parasetamol 350 mg, ibuprofen 200 mg					
	1.	Tab.	Sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
14		Kombinasi mengandung : Methampyrone 500 mg, Diazepam 2 mg					
	1.	Tab 502 mg	Sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
15		Etoricoxib					
	1.	Tab 60 mg	Sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
16		Celecoxib					
	1.	Kaps 200 mg		(-)	(-)	(-)	√
17		Parecoxib					
	1.	Inj 40 mg		(-)	(-)	(-)	√
18		Deksketoprofen					
	1.	Inj. 25mg/2ml		(-)	(-)	(-)	√
19		Kombinasi mengandung : Paracetamol 325 mg, Tramadol 37,5 mg					
	1.	Tab.		(-)	(-)	(-)	√
20		Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, Eugenol 14 mg, Metilsalisilat 102 mg					
	1.	Krim		(-)	(-)	(-)	√
21		Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, Eugenol 14 mg, Metilsalisilat 102 mg, Vitamin E 30 mg					
	1.	Krim		(-)	(-)	(-)	√
1.3 ANTIPIRAI							
1		Allopurinol					
		Tidak diberikan pada saat nyeri akut					
	1.	Tab 100 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab 300 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
2		Kolkisin					
	1.	Tab 500 mcg	30tab/bulan	(-)	√	√	√
3		Sodium hyaluronat					

	1.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Injeksi 25 mg/2,5 ml		(-)	(-)	(-)	√
1.4 NYERI NEUROPATIK							
1	Amitriptilin						
	1.	Tab 25 mg	30 tab/bulan	(-)	(-)	(-)	√
2	Gabapentin						
	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetik.						
	1.	Kaps 100 mg	90 kaps/bulan	(-)	√	(-)	√
	2.	Kaps 300 mg	90 kaps/ bulan	(-)	√	(-)	√
3	Pregabalin						
	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetik.						
	1.	Kaps 75 mg	120 kaps/bulan	(-)	√	(-)	√
2. ANASTETIK							
2.1 ANASTETIK LOKAL							
1	Bupivacain heavy						
	1.	Inj + glukosa 8%		(-)	(-)	√	√
		Khusus untuk analgesia spinal.					
2	Levobupivakain HCl						
	1.	Inj. 5mg/ml		(-)	(-)	√	√
3	lidokain						
	1.	Inj. 2%		(-)	(-)	√	√
4	ropivakain						
	1.	Inj. 7,5 mg/ml		(-)	(-)	√	√
5	Etil klorida						
	1.	Spray 100 ml		(-)	(-)	√	√
6	Kombinasi mengandung :						
	a.	Lidokain	2,5%				
	b.	Prilokain	2,5%				
	1.	Krim		(-)	(-)	(-)	√
7	Kombinasi mengandung :						
	a.	Lidocain	20 mg/ml				
	b.	Epinefrin	0,0125 mg/ml				
	1.	Inj. 2 ml		(-)	(-)	(-)	√
2.2 ANESTETIK UMUM DAN OKSIGEN							
1	Sevofluran						
	1.	Ih. 250 ml		(-)	(-)	√	√
2	Deksmedetomidin						
	1.	Inj. 100mcg/ml		(-)	(-)	√	√
		Untuk sedasi pada pasien di ICU, kraniotomi, bedah jantung atau operasi yang memerlukan waktu pembedahan yang lama.					
3	Isofluran						
	1.	Ih. 250 ml		(-)	(-)	√	√
4	Ketamin						
	1.	Inj. 100mg/ml		(-)	(-)	√	√
5	Propofol						
	1.	Inj. 1%		(-)	(-)	√	√
6	Nitrogen oksida						
	1.	Ih. gas dalam tabung		(-)	(-)	√	√
7	Oksigen						

	1.	lh. gas dalam tabung		(-)	(-)	√	√
2.3 OBAT UNTUK PROSEDUR OPERATIF							
1	Atropin						
	1.	Inj. 0.25 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Diazepam						
	1.	Inj. 5mg/ml		(-)	(-)	√	√
3	Midazolam						
	1.	Inj. 5 mg/ml	- Dosis rumatan: 1 mg/jam (24 mg/hari) - Dosis premedikasi: 8 vial/kasus.	(-)	(-)	√	√
		Dapat digunakan untuk premedikasi sebelum induksi anestesi dan rumatan untuk sedasi di ruang perawatan intensif.					
3. RELAKSAN OTOT PERIFER DAN PENGHAMBAT KOLINESTERASE							
3.1 PENGHAMBAT DAN PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER							
1	Atrakurium						
	1.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	√	√
		Hanya untuk tindakan anestesi dan pasien ICU yang memerlukan, karena menggunakan ventilator.					
2	Neostigmin						
	1.	Inj. 0,5 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
3.2 OBAT UNTUK MIASTENIA GRAVIS							
1	Piridostigmin						
	1.	Tab 60 mg	120 tab/bulan	(-)	√	√	√
2	Neostigmin						
	1.	Inj. 0,5 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
3.3 PENGHAMBAT KOLINERASE							
1	Donepezil						
	a)	Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.					
	b)	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu neurologi, penyakit dalam geriatri, atau ilmu kedokteran jiwa berdasarkan pemeriksaan neurobehaviour atau neuropsikiatri.					
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
	2.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
3.4 SPASME MUSKULOSKELETAL							
1	Eperison						
	1.	Tab. 50 mg		(-)	(-)	(-)	√
2	Tizanidin						
	1.	Tab. 2 mg		(-)	(-)	(-)	√
4. ANTIALERGI DAN OBAT UNTUK ANAFILAKSIS							
1	Cetirizin						
	1.	Tab. 10 mg	- Urtikaria akut: 1 tab/hari, maks 5 hari. - Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan.	(-)	(-)	√	√
		2.	Sir. 5 mg/5ml	1 btl/kasus	(-)	(-)	√
2	Cyproheptadin						
	1.	Tab. 4 mg		(-)	(-)	(-)	√
3	Deksametason						
	1.	Inj. 5mg/ml	20mg/hari	(-)	(-)	√	√
	2.	Tab. 0,5 mg		(-)	(-)	√	√

4	Difenhidramin					
	1.	Inj. 10 mg/ml	30mg/hari	(-)	(-)	√
5	Epinefrin					
	1.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√
6	Klorfeniramin					
	1.	Tab. 4 mg	3 tab/hari, maks 5 hari	(-)	(-)	√
7	Loratadin					
	1.	Tab. 10 mg	- Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan, hanya dilakukan di FPKTL.	(-)	(-)	√
8	Mebhidrolin					
	1.	Tab. 50 mg		(-)	(-)	√
5. ANTIDOT DAN OBAT LAIN UNTUK KERACUNAN						
5.1 KHUSUS						
1	Atropin					
	1.	Inj. 0,25 mg/ml		(-)	(-)	√
2	Kalsium glukonat					
	1.	Inj. 10%		(-)	(-)	√
3	N-asetil sistein					
		Untuk keracunan parasetamol yang disengaja atau tiba-tiba				
	1.	Inf. 200 mg/ml		(-)	(-)	√
4	Natrium bikarbonat					
	1.	Tab. 500 mg		(-)	(-)	√
	2.	Inj. 8,4%	Obat high alert	(-)	(-)	√
5	Neostigmin					
	1.	Inj. 0,5 mg/ml		(-)	(-)	√
6. ANTIEPILEPSI - ANTIKONVULSI						
1	Levetirasetam					
		Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial.				
	1.	Tab. 500 mg	180 tab/bulan	(-)	√	√
2	valproat					
		Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy)				
	1.	Tab. salut enterik 250 mg	60 tab/bulan	(-)	√	√
	2.	Tab. lepas lambat 500 mg	90 tab/bulan	(-)	√	√
	3.	Sir. 250 mg/ 5 ml	5 btl/ bulan	(-)	√	√
3	Diazepam					
	1.	Enema 10 mg/ 2,5 ml	2 tube/ hari, bila kejang	(-)	(-)	√
	2.	Enema 5 mg/ 2,5 ml	2 tube/ hari, bila kejang	(-)	(-)	√
	3.	Inj. 5 mg/ml	10 amp/kasus, kecuali untuk kasus di ICU Tidak untuk i.m	(-)	(-)	√
4	Fenitoin					
	1.	Kaps. 100 mg	120 kaps/bulan	(-)	√	√
	2.	Inj. 50 mg/ml		(-)	(-)	√
5	Karbamazepin					
	1.	Tab. 200 mg	120 tab/ bulan	(-)	√	√
6	Magnesium sulfat					
		Hanya untuk kejang pada preeklampsia atau eklampsia. Tidak digunakan untuk kejang lainnya.				
	1.	Inj. 20%		(-)	(-)	√
	2.	Inj. 40%		(-)	(-)	√

7	Fenobarbital						
	1.	Inj. 50 mg/ml	40 mg/kgBB	(-)	(-)	√	√
8	Topiramate						
	1.	Tab. 25 mg		(-)	(-)	(-)	√
7. ANTIINFEKSI							
7.1 ANTIBAKTERI							
7.1.1 BETA LAKTAM							
1	Amoksisilin						
	1.	Tab. 500 mg	10 hari	(-)	(-)	√	√
	2.	Sir, kering 125 mg/5ml	1 btl/kasus	(-)	(-)	√	√
2	Benzatin benzilpenisilin						
	1.	Inj 1,2 juta IU/ml (i.m)	2 vial/bulan	(-)	(-)	√	√
		Inj 2,4 juta IU/ml (i.m)	1 vial/bulan	(-)	(-)	√	√
3	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	amoksisilin	500 mg				
	b.	Asam klavulanat	125 mg				
		Hanya untuk terapi lanjutan untuk pasien yang sebelumnya mendapatkan antibiotik parenteral amoksisilin-asam klavulanat atau sesuai hasil uji resistensi.					
	1.	tab . 625 mg		(-)	(-)	√	√
4	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	ampisilin	500 mg				
	b.	sulbaktam	250 mg				
	1.	serb inj 750 mg	10 hari	(-)	(-)	√	√
5	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	ampisilin	1000 mg				
	b.	sulbaktam	500 mg				
	1.	Serb inj 1500 mg		(-)	(-)	√	√
6	Cefadroksil						
	1.	Kaps. 500 mg	5 hari	(-)	(-)	√	√
	2.	Sir. kering 125 mg/5 ml	1 btl/kasus	(-)	(-)	√	√
7	Cefazolin						
	1.	Inj. 1000 mg	- Maksimal diberikan 24 jam setelah operasi. - Untuk kasus profilaksis bedah jantung (katup prostetik, bypass arteri koroner, bedah jantung terbuka), jika diperlukan antibiotik lanjutan dapat diberikan maksimal selama 48 jam.	(-)	(-)	√	√
		Digunakan pada profilaksis bedah untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi.					
8	Cefiksim						
	Antibiotik parenteral sefalosporin generasi tiga atau sesuai hasil uji resistensi.						
	1.	tab/kaps 100 mg	10 hari	(-)	(-)	√	√
	2.	tab/kaps 200 mg	10 hari	(-)	(-)	√	√
9	Cefoperazon						
	1.	Serb inj 1.000 mg		(-)	(-)	√	√
		Diberikan atas persetujuan dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit tropik dan/atau infeksi atau					

		DPJP yang ditunjuk oleh KFT/KPRA untuk:					
	a)	Antibiotik kategori Watch					
	b)	Ketika antibiotik kategori Access tidak efektif					
	c)	Mengatasi infeksi pada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal.					
10		Cefotaksim					
	1.	Serb inj. 1.000 mg	10 hari	(-)	(-)	√	√
11		Ceftazidim					
	1.	Ser. inj 1.000 mg	3 g/ hari selama 7 hari	(-)	(-)	√	√
		Antibiotik lini ketiga (reserved antibiotic), untuk infeksi yang terbukti disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Diberikan atas persetujuan KFT/KPRA/pimpinan RS.					
12		Ceftriakson					
	1.	Inj 1.000 mg	2 g/hari selama 7 hari. Untuk meningitis 4g/hari selama 14 hari	(-)	(-)	√	√
13		Ceftizoksim					
	1.	Serb inj 1.000 mg		(-)	(-)	√	√
14		Cefuroksim					
	1.	Serb inj 750 mg	3 g/kasus	(-)	(-)	√	√
7.1.2 ANTIBAKTERI LAIN							
7.1.2.1 MAKROLID							
1		Azithromisin					
		Diberikan atas persetujuan dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit tropik dan/atau infeksi atau DPJP yang ditunjuk oleh KFT/KPRA untuk:					
	a)	Antibiotik kategori Watch.					
	b)	Ketika antibiotik kategori Access tidak efektif					
	1.	Tab. sal selaput 500 mg	3 hari	(-)	(-)	√	√
2		Eritromisin					
	1.	Tab 250 mg	- 4 tab/kaps per hari selama 5 hari. - Untuk Streptococcus pyogenes dan difteri: 10 hari.	(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 500 mg	- 4 tab/kaps per hari selama 5 hari. - Untuk Streptococcus pyogenes dan difteri: 10 hari.	(-)	(-)	√	√
	3.	Sir. 200mg/ 5 ml		(-)	(-)	√	√
7.1.2.2 AMINOGLIKOSIDA							
1		amikasin					
		Hanya digunakan untuk infeksi oleh bakteri gram negatif yang resistan terhadap gentamisin.					
	1.	Inj 250mg/ ml		(-)	(-)	√	√
7.1.2.3 LINKOSAMID							
1		klindamisin					
	1.	Kaps 150 mg	4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis selama 6 minggu.	(-)	(-)	√	√
	2.	Kaps 300 mg	- 4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis 8 kaps/hari selama 6 minggu	(-)	(-)	√	√

			- Untuk abses paru atau empiema: 3 – 4 kaps/hari selama 14 hari				
7.1.2.4 TETRASIKLIN							
1	Doksisiklin						
	1.	Kaps 100 mg	- 2 kaps/hari selama 10 hari. - Acne vulgaris: 50 mg - 100 mg/ hari hingga 12 minggu.	(-)	(-)	√	√
7.1.2.5 SULFAMETOKSAZOL - TRIMETROPIM							
1	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Sulfamettoksazol	400 mg				
	b.	trimetropim	80 mg				
	1.	Tab 480 mg		(-)	(-)	√	√
2	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Sulfamettoksazol	800 mg				
	b.	trimetropim	160 mg				
	1.	Tab 960 mg		(-)	(-)	√	√
3	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Sulfamettoksazol	200 mg				
	b.	trimetropim	40 mg				
	1.	Sir 240 mg/ 5 ml		(-)	(-)	√	√
7.1.2.6 KUINOLON							
Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun, ibu hamil, atau ibu menyusui.							
1	Siprofloksasin						
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Inf. 2mg/ml	4 btl/ hari	(-)	(-)	(-)	√
2	Levofloksasin						
	1.	Tab 500 mg	10 hari	(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tab 750 mg	10 hari	(-)	(-)	(-)	√
	3.	Inf. 500 mg	10 hari	(-)	(-)	(-)	√
		Inf. 750 mg	10 hari	(-)	(-)	(-)	√
7.1.2.7 LAIN-LAIN							
1	Metronidazol						
	1.	Tab 500 mg	Untuk infeksi akibat bakteri anaerob, dapat diberikan maksimum 2 minggu/kasus, kecuali pada kasus abses paru, otak, hepar dan organ lain disesuaikan dengan kebutuhan pasien	(-)	(-)	√	√
	2.	Inf 5 mg/ml	3 btl/ hari	(-)	(-)	√	√
2	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	metronidazol	500 mg				
	b.	Nystatin	10.000IU				
	1.	ovula		(-)	(-)	√	√
	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	fradiomisin	2,5 mg				
	b.	gramisidin	1 mg	(-)	(-)	√	√
3	Meropenem						
	1.	Serb inj 1.000 mg		(-)	(-)	√	√

	a)	Diberikan atas persetujuan KFT/KPRA/pimpinan RS untuk antibiotik lini ketiga (reserved antibiotic) pada infeksi oleh kuman penghasil ESBL.	a) Febrile neutropenia:Dosis 1g-3 g/hari, sampai ANC > 500/mm ³ .				
	b)	Tidak untuk profilaksis prabedah	b) Sepsis dan infeksi berat mengancam jiwa:Dosis 1g-3 g/hari sampai diperoleh hasil kultur, maks 7 hari.				
4		Thiampenicol					
	1.	Kaps. 500 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Sir. kering 125 mg/5ml		(-)	(-)	√	√
7.2 ANTIINFEKSI KHUSUS							
7.2.1 ANTITUBERKULOSIS							
a)	Disediakan oleh Program Kemenkes.						
b)	Penggunaan sesuai dengan Program Nasional Pengendalian TB.						
1	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Isoniazid	300 mg				
	b.	Rifapentin	300 mg				
	a) Digunakan untuk terapi pencegahan TB pada pasien ODHIV. b) Kontra indikasi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT): anak dibawah 2 tahun, ibu hamil, ODHIV yang mengkonsumsi antiretroviral jenis nevirapin atau lopinavirritonavir						
	1.	Tab	3 x 1 selama 12 minggu (diminum 1 minggu sekali)	(-)	(-)	√	√
2	Pirazinamid						
	a)	Hanya untuk paduan pada TB Resisten Obat					
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	√	√
3	rifapentin						
	Digunakan untuk pengobatan pencegahan TB						
	1.	Tab 150 mg		(-)	(-)	√	√
4	Isoniazid						
	1.	Tab 100 mg	10 mg/kgBB, maks 6 bulan setiap hari	(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 300 mg	300 mg/ hari, maks 6 bulan	(-)	(-)	√	√
5	Etambutol						
	1.	Tab. 250 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Tab. 500 mg		(-)	(-)	√	√
6	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Rifampicin	150 mg				
	b.	Isoniazid	75 mg				
	c.	Pirazinamid	400 mg				
	d.	Etambutol	275 mg				
	1.	OAT Dewasa 4 FDC Tahap 1		(-)	(-)	√	√
	2	OAT Dewasa 4 FDC Tahap 1 dosis harian		(-)	(-)	√	√
7	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Rifampicin	150 mg				
	b.	Isoniazid	150 mg				
	1.	OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2		(-)	(-)	√	√
8	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Rifampicin	150 mg				

	b.	Isoniazid	75 mg				
	1.	OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2 dosis harian		(-)	(-)	√	√
9	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Rifampicin	75 mg				
	b.	Isoniazid	50 mg				
	c.	Pirazinamid	150 mg				
	1.	OAT anak 3 FDC Tahap 1		(-)	(-)	√	√
10	Kombinasi KDT/FDC mengandung:						
	a.	Rifampicin	75 mg				
	b.	Isoniazid	50 mg				
	1.	OAT anak 3 FDC Tahap 2		(-)	(-)	√	√
7.2.2 ANTILEPRA							
1	Rifampisin						
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	(-)	√
7.2.3 ANTISEPTIK SALURAN KEMIH							
1	Asam pipemidat						
	1.	Tab. 400 mg	28 kaps/kasus	(-)	(-)	(-)	√
7.3 ANTIFUNGI							
7.3.1 ANTIFUNGI SISTEMIK							
1	Itrakonazol						
	a)	Hanya untuk aspergilosis, onikomikosis, deep mycosis yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kultur					
	b)	Untuk histoplasmosis, penegakan diagnosis melalui pemeriksaan biopsi sumsum tulang, organ yang diduga terinfeksi atau kultur darah					
	c)	Tidak diberikan bersama dengan obat lain yang terbukti dapat berinteraksi dengan itraconazol.					
	1.	Kaps 100 mg		(-)	(-)	√	√
2	Flukonazol						
	a)	Digunakan untuk kandidiasis sistemik/pada pasien immunocompromised.					
	b)	Digunakan untuk berbagai bentuk kriptokokosis.					
	1.	Kaps 150 mg		(-)	(-)	√	√
3	Ketoconazol						
	1.	Tab 200 mg	Maks 30 tab/kasus	(-)	(-)	√	√
	2.	Krim 2%		(-)	(-)	√	√
	3.	Scalp solution 2%		(-)	(-)	√	√
4	Nistatin						
	1.	Susp 100.000 IU/ml		(-)	(-)	√	√
7.4 ANTIVIRUS							
1	Acyclovir						
	1.	Tab 200 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 400 mg		(-)	(-)	√	√
	3.	Krim 5%		(-)	(-)	(-)	√
2	Metisoprinol						
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Sir. 250 mg/ 5 ml		(-)	(-)	(-)	√
8. ANTIMIGREN DAN ANTIVERTIGO							
8.1 ANTIMIGREN							
1	Propranolol						

	1.	Tab 10 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tab 40 mg		(-)	(-)	(-)	√
2	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	Ergotamin	1 mg				
	b.	Kafein	50 mg				
	1.	Tab 51 mg	8 tab/ minggu	(-)	(-)	√	√
8.2 ANTIVERTIGO							
1	Betahistin						
	1.	Tab 6 mg					
	a)	Hanya untuk sindrom meniere atau vertigo perifer.	1 minggu	(-)	√	(-)	√
	b)	Untuk sindrom meniere atau vertigo non Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)	30 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
	2.	Tab 24 mg	90 tab/ bulan	(-)	√	(-)	√
		Hanya untuk sindrom meniere					
2	Flunarizin						
	1	Tab 5 mg		(-)	(-)	(-)	√
9. ANTI NEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN, DAN OBAT UNTUK TERAPI PALIATIF							
9.1 HORMON DAN ANTI HORMON							
1	Deksametason						
	1.	Tab 0,5 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Inj 5 mg/ ml		(-)	(-)	√	√
2	Metilprednisolon						
	1.	Tab 4 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 8 mg		(-)	(-)	√	√
	3.	Tab 16 mg		(-)	(-)	√	√
9.2 IMUNOSUPRESAN							
1	Metotreksat						
	a)	Untuk imunosupresi					
	b)	Untuk pasien dengan luas psoriasis di atas 10%					
	1.	Tab 2,5 mg		(-)	(-)	√	√
2	Azatiopin						
	1.	Tab 50 mg	120 tab/ bulan	(-)	√	√	√
3	Hidroksiklorokuin						
	a)	Untuk kasus SLE (Systemic Lupus Erythematosus). atau					
	b)	Untuk kasus RA (Rheumatoid Arthritis).					
	1.	Tab 200 mg	60 tab/ bulan	(-)	√	√	√
4	Hidroksikarbamid						
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	(-)	√
9.3 NEUROTONIK							
1	Piracetam						
	1.	Tab 800 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Inj 200 mg/15 ml		(-)	(-)	(-)	√
2	Citicolin						
	1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Inj. 250 mg/2ml		(-)	(-)	(-)	√
	3.	Inj 500 mg/2ml		(-)	(-)	(-)	√
3	Mecobalamin						
	1.	Kaps 500 mcg		(-)	(-)	(-)	√

	2.	Inj 500mcg/ml		(-)	(-)	(-)	√
10. ANTI PARKINSON							
1	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	benserazid	25 mg				
	b.	levodopa	100 mg				
	1.	Tab 125 mg	120 tab/bulan	(-)	√	√	√
2	Triheksifenidil						
	1.	Tab 2 mg	90 tab/bulan	(-)	√	√	√
	a)	Dapat digunakan pada gangguan ekstrapiramidal karena obat.					
	b)	Dalam penanganan gangguan ekstrapiramidal perlu dilakukan monitoring sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.					
	c)	Terapi awal dapat diberikan di Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dan mempunyai surat penugasan dari Kementerian Kesehatan.					
3	Pramipeksol						
	1.	Tab 0.125 mg	60 tab/ bulan	(-)	√	(-)	√
		Dosis 0,125 mg dapat juga digunakan untuk Restless Leg Syndrome (RLS)					
	2.	Tab 0.25 mg		(-)	(-)	(-)	√
11. OBAT YANG MEMPENGARUHI DARAH							
11.1 ANTI ANEMI							
1	Asam folat						
	1.	Tab 0.4 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Tab 1 mg		(-)	(-)	√	√
2	Kombinasi KDT/FDC mengandung :						
	a.	Fe fumarat	91,27 mg				
	b.	Asam folat	0,8 mg				
	c.	Vitamin c	50 mg				
	d.	Vitamin b12	7,5 mcg				
	e.	Cupri sulfat	0,2 mg				
	f.	Mangan sulfat monohidrat	0, mg				
3	1.	Tab		(-)	(-)	√	√
	Fe						
	1.	Tab. 325 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Drop. 15 mg/ ml		(-)	(-)	√	√
3	3.	Sir. 15 mg/ 5 ml		(-)	(-)	√	√
11.2 OBAT YANG MEMPENGARUHI KOAGULASI							
1	Asam traneksamat						
	Untuk perdarahan masif atau berpotensi perdarahan > 600 cc						
	1.	Tab salut selaput 500 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Inj. 100 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Fitomenadion						
	1.	Inj. 2 mg/ml					
	a)	Dosis untuk bayi batu lahir 1 mg		(-)	(-)	√	√
	b)	Dosis untuk bayi prematur 0,5 mg		(-)	(-)	√	√
3	Enoksaparin sodium						
	1.	Inj 10.000 IU/ml	2 vial/hari	(-)	(-)	√	√
		Dapat digunakan untuk tromboemboli atau sindrom koroner akut atau pencegahan trombus pada					

		hemodialisis atau pada tirah baring 3 hari dengan risiko sedang sampai tinggi mengalami tromboemboli.					
4		Fondaparinux					
	1.	Inj. 2,5 mg/0,5 ml	1 vial/ hari	(-)	(-)	√	√
	a)	Digunakan untuk tromboemboli dan/atau sindrom koroner akut.					
	b)	Tidak digunakan sebelum dan selama prosedur Intervensi Koroner Perkutan (IKP/PCI) pada pasien sindrom koroner akut (ACS).					
	c)	Diberikan 6 jam setelah operasi ortopedi tungkai bawah dan tulang belakang, dan operasi abdominal.					
5		Karbazokrom					
	1.	Inj. 50 mg/10 ml		(-)	(-)	√	√
6		Heparin na					
	1.	Inj. 5000 iu/ml	Dosis sesuai dengan target APTT (maks 20.000 - 40.000 IU/hari).	(-)	(-)	√	√
7		Edoxaban tosylate					
	1.	Tab. 30 mg		(-)	(-)	√	√
8		Warfarin					
	1.	Tab. 2 mg		(-)	(-)	√	√
	a)	Untuk pencegahan dan/atau terapi thromboembolism.					
	b)	Dosis harian disesuaikan dengan target INR					
	c)	Pada pasien dalam kondisi stabil (tidak ada perdarahan), dengan tercapainya target INR (2-3), diperlukan evaluasi INR rutin maksimal setiap 3 bulan.					
12. PRODUK DARAH DAN PENGGANTI PLASMA							
12.1 PENGGANTI PLASMA DAN PLASMA EKSPANDER							
1		Albumin serum normal (human albumin)					
	1.	Inj. 25%		(-)	(-)	(-)	√
	a)	Kadar albumin < 2,5 g/dL.					
	b)	Kadar albumin < 2,5 g/dL pada sindrom nefrotik yang disertai edema anasarka dan/atau renjatan.					
	c)	Diberikan apabila terdapat kondisi presyok atau syok, dan/atau untuk kasus asites masif dengan penekanan organ pernapasan atau perut.					
2		Pengganti plasma golongan gelatin					
	1.	Infus	6 btl/hari, maks 2 hari	(-)	(-)	√	√
13. DIAGNOSTIK							
13.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI							
1		Ioheksol					
	1.	Inj. 240-350 mg iodine/ml		(-)	(-)	√	√
13.2 TES FUNGSI							
13.2.1 TES KULIT							
1		Tuberkulin protein purified derivative					
	1.	Inj. 2 tuberculin unit/ 0,1 ml		(-)	(-)	√	√
13.3 ULTRASOUND							
1		Ultrasound transmission gel					
	1.	Gel		(-)	(-)	(-)	√
13.4 LAIN-LAIN							
1		Lubrikan gel					



	1.	Gel tube		(-)	(-)	(-)	√
14. ANTISEPTIK DAN DISINFEKTAN							
14.1 ANTISEPTIK							
1	Tetrachlorodecaoxygen						
	1.	Lar. 0,001037%		(-)	(-)	(-)	√
2	Catatan: Dibuat baru (recenter paratus, r.p.), dalam botol tertutup rapat, terlindung dari cahaya.						
	Hidrogen Peroksida						
	1.	Cairan 3%		(-)	(-)	√	√
3	Povidone Iodine						
	1.	Larutan 10%		(-)	(-)	√	√
4	Octenidine dihydrochloride						
	1.	Spray 0.1%		(-)	(-)	(-)	√
5	Hexetidine						
	1.	Larutan 0,1%		(-)	(-)	(-)	√
14.2 DISINFEKTAN							
1	Etanol 70 %						
	1.	Larutan 70%		(-)	(-)	√	√
2	Etanol 95 %						
	1.	Larutan 95%		(-)	(-)	√	√
15. OBAT DAN BAHAN UNTUK GIGI							
15.1 ANTI FUNGI OROFARINGEAL							
1	Nistatin						
	1.	Susp 100.000 IU/ml btl.12 ml		(-)	(-)	√	√
16. DIURETIK DAN OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT							
16.1 DIURETIK							
1	Furosemid						
	1.	Tab. 40 mg	120 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Hidroklorotiazid						
	1.	Tab. 25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
3	Spironolakton						
	1.	Tab. 25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 100 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
4	Manitol						
	1.	Infus 20 % fls. 500 ml	2 btl/hari	(-)	(-)	√	√
16.2 OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT							
1	Dutasterid						
	1.	Tab. 0,5 mg	30 kaps/ bulan	(-)	√	(-)	√
2	Phenazopyridine						
	1.	Tab. 100 mg		(-)	(-)	(-)	√
3	Tamsulosin						

	1.	Tab. Lepas lambat 0,4 mg	30 kaps/ bulan	(-)	✓	(-)	✓
17. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN DAN KONTRASEPSI							
17.1 ANTI DIABETES							
17.1.1 ANTI DIABETES ORAL							
1	Acarbose						
	1.	Tab. 50 mg	90 tab/ bulan	✓	✓	(-)	✓
	2.	Tab. 100 mg	90 tab/ bulan	✓	✓	(-)	✓
2	Glibenklamid						
	1.	Tab. 5 mg	Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/ bulan	✓	✓	(-)	✓
3	Gliquidon						
	1.	Tab. 30 mg	90 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
4	Glimepirid						
	1.	Tab. 1 mg	60 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
	2.	Tab. 2 mg	60 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
	3.	Tab. 3 mg	60 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
	4.	Tab. 4 mg	30 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
5	Metformin						
	1.	Tab. 500 mg	120 tab/ bulan. Dosis efektif: 1.500-2.500 mg/hari	✓	✓	✓	✓
	2.	Tab. 850 mg	60 tab/ bulan	✓	✓	✓	✓
6	Pioglitazone						
	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer						
	1.	Tab. 15 mg	30 tab/ bulan	✓	✓	(-)	✓
7	Sitagliptin						
	a)	Tidak digunakan sebagai lini pertama/terapi inisial.					
	b)	Sebagai terapi tambahan pada metformin dan/atau sulfonilurea dengan dosis optimal yang masih dapat ditoleransi oleh pasien.					
	c)	Tidak digunakan sebagai obat tunggal.					
	1.	Tab. 100 mg	30 tab/ bulan	✓	✓	(-)	✓
17.1.2 ANTI DIABETES PARENTERAL							
Analog Insulin Basal							
1	Insulin glargine						
	a)	Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau					



	b)	Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.					
	c)	Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.					
	1.	Inj 100 IU/mL (penfill cartridge)	Dalam kondisi tertentu, Dokter di FPKTP dapat melakukan penyesuaian dosis (titrasi) insulin basal hingga 20 IU/hari.	√	√	(-)	√
	2.	linj 300 IU/mL (penfill cartridge)		(-)	√	(-)	√
Analog Insulin Prandial							
1	Insulin aspart						
	1.	Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)		√	√	(-)	√
2	Insulin glulisin						
	1.	Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)		√	√	(-)	√
Analog Insulin Campuran							
1	Kombinasi 70% insulin protamine aspart dan 30% insulin aspart						
	a)	Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau					
	b)	Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.					
	c)	Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.					
	1.	Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)		√	√	(-)	√
2	Kombinasi 75% insulin protamine lispro dan 25% insulin lispro						
	a)	Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau					
	b)	Pasien diabetes melitus tipe 2					



		dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.					
	c)	Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.					
	1.	Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)		√	√	(-)	√
3	Co-formulation 70% insulin degludec (ultra-long acting insulin) dan 30% insulin aspart						
	a)	Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkendali (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL).					
	b)	Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.					
	c)	Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.					
	1.	Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)		√	√	(-)	√
17.2 HORMON KELAMIN DAN OBAT YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS							
17.2.1 ESTROGEN							
1	Clomiphene citrate						
	1.	Tab. 50 mg		(-)	(-)	(-)	√
17.2.2 PROGESTERON							
1	Noretisteron						
	Hanya untuk amenorea sekunder, perdarahan uterus abnormal atau endometriosis.						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/ bulan	(-)	(-)	√	√
2	Micronized progesterone						
	1.	Kaps. 100 mg		(-)	(-)	(-)	√
17.2.3 KONTRASEPSI							
17.2.3.1 KONTRASEPSI, ORAL							
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.						
	1.	Tab. Kombinasi : Levonorgestrel 0,15 mg, ethinyl estradiol 0,03 mg		(-)	(-)	√	√
2	Linestrenol						
	1.	Tab. 0,5 mg		(-)	(-)	√	√

17.2.3.2 KONTRASEPSI, PARENTERAL							
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.						
	1.	Inj. Kombinasi : Medroksi progesteron asetat 120 mg, Estradiol sipionat 10 mg		(-)	(-)	√	√
2	Medroksi progesterone asetate						
	1.	Inj. 150 mg/ 3 ml		(-)	(-)	√	√
17.2.3.3 KONTRASEPSI, AKDR (IUD)							
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.						
	Copper T						
	1.	Set		(-)	(-)	(-)	√
17.2.3.4 KONTRASEPSI, IMPLAN							
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.						
	Levonorgestrel						
	1.	Implan 2 rods, @ 75 mg (3-4 tahun)		(-)	(-)	√	√
17.3 HORMON TIROID DAN ANTITIROID							
1	Levothyroxine Sodium						
	1.	Tab. 50 mcg	Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan	(-)	√	√	√
2	Propylthiouracil						
	1.	Tab. 100 mg	Untuk bulan pertama maks 180 tab/bulan	(-)	√	√	√
3	Thiamazol						
	1.	Tab. 10 mg	Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan	(-)	√	√	√
17.4 KORTIKOSTEROID							
1	Dexametason						
	1.	Tab. 0,5 mg		√	√	√	√
	2.	Inj. 5 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Hidrokortison						
	1.	Inj. 100 mg		(-)	(-)	(-)	√
3	Metilprednisolon						
	1.	Tab. 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus	√	√	√	√
	2.	Tab. 8 mg		√	√	√	√
	3.	Tab. 16 mg		√	√	√	√
	4.	Inj. 125mg/ 2ml vial.		(-)	(-)	√	√
		Hanya digunakan untuk kasus spesialistik, digunakan dalam waktu relatif singkat.					
4	Triamcinolon						
	1.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	(-)	(-)
	2.	Tab. 4 mg		(-)	(-)	(-)	(-)
	3.	Salep 5 g		(-)	(-)	(-)	(-)
5	Prednison						



	1.	Tab. 5 mg	Maks 90 tab/bulan	√	√	√	√
18. OBAT KARDIOVASKULER							
18.1 ANTI ANGINA							
1	Amlodipin						
	Untuk angina dengan bradiaritmia.						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
2	Isosorbid Dinitrat						
	1.	Tab. 5 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 10 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√
	3.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√	√
	Untuk kasus rawat inap dan UGD.						
3	Nitroglyserin						
	1.	Tab 2.5 mg	90 kaps/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 5 mg	90 kaps/bulan	√	√	√	√
4	Ivabradin						
	Digunakan untuk pengobatan simptomatik angina pectoris yang kronik stabil pada pasien dengan ritme sinus normal yang telah gagal dengan beta bloker.						
	1.	Tab. 5 mg	Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction <35%. Utk angina 60 tab/bln maks 3 bln	(-)	√	(-)	√
5	Gliseril trinitrat						
	1	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
	2	Kaps. lepas lambat 2,5 mg		√	√	(-)	√
	3	Kaps. lepas lambat 2,5 mg		√	√	(-)	√
18.2 ANTI ARITMIA							
1	Amiodarone						
	1.	Tab. 200 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Inj. 50 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Digoksin						
	1.	Tab. 0,25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Inj. 0,25 mg/ml		(-)	(-)	√	√
3	Lidokain						
	1.	Inj. 50 mg		(-)	(-)	√	√
4	Propranolol						
	1.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	a)	Untuk kasus-kasus dengan gangguan tiroid					



		b) Untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes					
18.3 ANTI HIPERTENSI SISTEMIK							
Catatan :		Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.					
1	Amlodipine						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
2	Bisoprolol						
	1.	Tab 2.5 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
3	Diltiazem HCl						
	1.	Kaps. lepas lambat 100 mg	Maks 30 kaps/bulan	√	√	(-)	√
	2.	Kaps. lepas lambat 200 mg	Maks 30 kaps/bulan	√	√	(-)	√
4	Irbesartan						
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya						
	1.	Tab. 150 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
5	Candesartan						
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya.						
	1.	Tab. 8 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
6	Captopril						
	1.	Tab. 25 mg	90 tab/bulan	√	√	(-)	√
7	Clonidine						
	1.	Tab. 0,15 mg	90 tab/bulan	√	√	(-)	√
8	Lisinopril						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
9	Nicardipine						
	Hanya untuk pasien dengan hipertensi berat dan memerlukan perawatan						
	1.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√	√
10	Nifedipine						
	1.	Kaps. 10 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√



	2.	Tab. lepas lambat 30 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
11	Ramipril						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
	2.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
12	Valsartan						
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya						
	1.	Tab. 80 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 160 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
13	Nimodipine						
	a)	Untuk pencegahan kasus vasospasme pada pengobatan perdarahan subarachnoid					
	b)	Hanya diberikan di ruang perawatan					
	1.	Tab. 30 mg	12 tab/hari, maks 21 hari	(-)	(-)	(-)	√
	2.	Inf. 0,2 mg/ml	Maks. 3 hari	(-)	(-)	(-)	√
14	Metildopa						
	Untuk hipertensi pada wanita hamil						
	1.	Tab. 250 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√
15	Hidroklortiazid						
	1.	Tab. 25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
16	Telmisartan						
	Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m ²						
	1.	Tab. 80 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
17	Imidapril						
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
18.4 ANTI HIPERTENSI PULMONAL							
1	Sildenafil						
	1.	Tab. 50 mcg	90 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
	a)	Digunakan untuk Hipertensi Arteri Pulmonal (HAP) pada pasien dewasa. Diagnosis ditegakkan dengan echocardiography.					
	b)	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit jantung atau bedah jantung.					
2	Beraprost Sodium						
	1.	Tab. 20 mcg	90 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
18.5 ANTI AGREGASI PLATELET							
1	Asam Asetilsalisilat						



	1.	Tab. 80 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
2	Cilostazol						
	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit dalam atau penyakit jantung dan pembuluh darah atau neurologi atau bedah toraks, kardiak dan vaskular.						
	1.	Tab. 100 mg	60 tab/bln	(-)	√	(-)	√
		Hanya untuk kasus Peripheral Arterial Disease (PAD) atau pasien yang terbukti telah resistan terhadap asam asetilsalisilat yang ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan resistensi asam asetilsalisilat.					
3	Clopidogrel						
	a)	Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif.	Diberikan 1 x 75 mg selama 10 hari sebelum PCI/ kateterisasi dan dilanjutkan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/ hari maks selama 12 bulan.				
	b)	Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI.	Diberikan loading dose 600 mg pre tindakan dilanjutkan dengan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan.				
	c)	Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD).	Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan.				
	d)	Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI.	Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan.				
	e)	Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obatobat golongan Proton Pump Inhibitor (PPI).					
	f)	Lazimnya klopidoogrel diberikan bersama dengan antiplatelet aspirin atau antiplatelet lainnya dosis rendah.					
	g)	Pemberian klopidoogrel lebih dari 12 bulan dapat dilakukan bila terjadi alergi/intoleransi terhadap asam asetilsalisilat, atau terjadi stroke berulang walaupun faktor risiko telah terkontrol.					
	1.	Tab. 75 mg		√	√	√	√
4	Ticagrelor						
	a)	Untuk pasien kasus PCI dengan Acute Coronary Syndrome (ACS). atau	60 tab/bulan, maks 1 tahun.				



	b)	Diberikan bersama dengan asam asetil salisilat untuk menurunkan risiko stroke pada pasien stroke iskemik akut (NIH stroke scale score ≤ 5) atau transient ischaemic attack (TIA) dengan risiko tinggi (ABCD2 score ≥ 6)	2 tab per hari, Maks. 30 hari.				
	1.	Tab. 90 mg		(-)	√	(-)	√
18.6 TROMBOLITIK							
1		Streptokinase					
	a)	Untuk infark miokard akut dengan onset < 12 jam.					
	b)	Dapat diberikan di FPKTL yang memiliki fasilitas ICCU/ICU/unit stroke.					
	c)	Kontraindikasi: tidak boleh diberikan jika ditemukan kontraindikasi fibrinolitik antara lain: riwayat stroke hemoragik atau riwayat stroke iskemik dalam 6 bulan terakhir, AVM, tumor otak, trauma kepala, perdarahan aktif gastrointestinal, pascaoperasi besar dalam 3 bulan, dan diseksi aorta.					
	1.	Inj. 1,5 juta IU		(-)	(-)	√	√
18.7 OBAT UNTUK GAGAL JANTUNG							
1		Bisoprolol					
		Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.					
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
	2.	Tab. 2.5 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
2		Digoksin					
	1.	Tab. 0,25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
		Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia.					
	1.	Inj. 0,5 mg/ 2 ml		(-)	(-)	√	√
3		Furosemid					
	1.	Tab. 40 mg	120 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	√	√
4		Captopril					
	1.	Tab. 25 mg	90 tab/bulan	√	√	(-)	√
5		Spirolonakton					
	1.	Tab. 25 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
6		Ramipril					
	1.	Tab. 5 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. 10 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
7		Karvedilol					



		Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.					
	1.	Tab. 6,25 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
8		Trimetazidine diHCl					
	1.	Tab. 35 mg		(-)	(-)	(-)	√
9		Candesartan					
		Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya.					
	1.	Tab. 8 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
	2.	Tab. 16 mg	30 tab/bulan	√	√	(-)	√
10		Ivabradin					
		Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction < 35%.					
	1.	Tab. 5 mg	60 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
11		Isosorbid dinitrat					
		Untuk gagal jantung akut.					
	1.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√	√
12		Sacubitril valsartan					
	a)	Hanya untuk pasien yang tidak respon terhadap golongan ARB & ACE inhibitor.					
	b)	Hanyua untuk pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF ≤ 40%)					
	1.	Sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 / 25,7 mg	60 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
	2.	Sacubitril valsartan 100 SK tab sal selaput 48,6 / 51,4 mg	60 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
	3.	Sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 / 102,8 mg	60 tab/bulan	(-)	√	(-)	√
13		Spironolakton					
	1.	Tab. 25 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
18.8 OBAT UNTUK SYOK KARDIOGENIK DAN SEPSIS							
1		Dobutamin					
	1.	Inj. 50 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
2		Dopamin					
	a)	Hanya untuk syok kardiogenik, dekompensasi kordis akut dan syok septik.					
	b)	Tidak untuk syok hipovolemik.					



	1.	Inj. 40 mg/ml		(-)	(-)	√	√
3	Epinephrine						
	1.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√	√
4	Norepinephrine						
	1.	Inj. 1 mg/ml		(-)	(-)	√	√
19. ANTIHIPERLIPIDEMIA							
1	Atorvastatin						
	a)	Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat Lemak. atau					
	b)	Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi.					
	1.	Tab. 20 mg	60 tab/bulan	√	√	(-)	√
2	Cholestyramine						
	1.	Serbuk 4 gram	4 sachet	(-)	√	(-)	√
3	Simvastatin						
	Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hiperlipidemia dengan salah satu kondisi berikut:						
	a)	Kadar LDL > 160 mg/dL untuk pasien tanpa komplikasi diabetes melitus/PJK.					
	b)	Pasien ASCVD (pasca PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 70 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan.					
	c)	Kadar LDL > 130 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap kontrol diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan.					
	1.	Tab. 20 mg	30 tab/bulan.	√	√	√	√
4	Fenofibrat						
	a)	Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL.					



	b)	Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa minimal 12 jam.					
	1.	Kaps. 100 mg	30 kaps/ bulan	(-)	√	√	√
	2.	Kaps. 300 mg	30 kaps/ bulan	(-)	√	√	√
5		Rosuvastatin					
	a)	Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat lemak. atau					
	b)	Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah ≤ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi.					
	1.	Tab. 10 mg	60 tab/ bulan	√	√	√	√
20. OBAT TOPIKAL UNTUK KULIT							
20.1 ANTIKNE							
1		Kombinasi mengandung : Benzoyl Peroxide 5% (50 mg), Clindamycin Phosphate 1.2% (12 mg).					
	1.	Gel		(-)	(-)	(-)	√
2		Azelaic acid					
	1.	Krim 20%		(-)	(-)	(-)	√
20.2 ANTI BAKTERI							
1		Perak Sulfadiazin					
		Hanya untuk luka bakar.					
	1.	Krim 1 %		(-)	(-)	√	√
2		Kombinasi mengandung : Neomycin sulfat 0,5%, placenta extract 10%					
	1.	Krim		(-)	(-)	(-)	√
3		Mupirocin Calcium					
	1.	Krim 2%		(-)	(-)	√	√
4		Gentamicin					
	1.	Salep 0,1%		(-)	(-)	(-)	√
5		Kombinasi neomisin 0,5% dan hidrokortison 1%					
	1.	Krim		(-)	(-)	(-)	√
6		Kombinasi neomisin 5mg, bacitrasin 250 IU					
	1	serbuk		(-)	(-)	(-)	√
20.3 ANTI FUNGI							
1		Fusidic Acid 2 %					

	1.	Krim 2 %		(-)	(-)	(-)	√
2	Ketoconazole						
	1.	Krim 2 %		(-)	(-)	√	√
	2.	Scalp sol 2%		(-)	(-)	√	√
		Pada pitiriasis yang luas.					
3	Mikonazol			(-)	(-)	√	√
	1.	Krim 2 %					
4	Kombinasi mengandung : Metronidazol 500 mg, nistatin 100.000 IU						
	1.	Ovula		(-)	(-)	√	√
20.4 ANTIINFLAMASI DAN ANTIPRURITIK							
1	Heparin Natrium						
	1.	Gel 20 gram		(-)	(-)	(-)	√
2	Hidrokortison						
	1.	Krim 1%		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Krim 2,5%		(-)	(-)	√	√
3	Mometason furoat						
	1.	Krim 0,1%		(-)	(-)	(-)	√
4	Clobetasol Propionate						
	Untuk dermatitis kronik berat yang hiperkeratotik, yang tidak respons terhadap steroid topikal lainnya.						
	1.	Salep 0,05%		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Krim 0,05%		(-)	(-)	(-)	√
5	Desonide						
	1.	Krim 0,05%		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Lotion 0,05%		(-)	(-)	(-)	√
20.5 ANTISKABIES DAN ANTIPEDIKULOSIS							
1	Permethrin						
	1.	Lotion 5%		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Krim 5%		(-)	(-)	√	√
20.6 KERATOLITIK DAN KERATOPLASTIK							
1	Asam salisilat						
	1.	Serbuk 1 kg		(-)	(-)	(-)	√
2	Liquor carbonis detergens						
	1.	Lar. 5%		(-)	(-)	(-)	√
20.7 LAIN-LAIN							
1	Centella asiatica extract						
	1.	Salep 10 mg		(-)	(-)	(-)	√
2	Urea						
	1.	Krim 10%		(-)	(-)	√	√

3	Triamcinolon					
	Hanya untuk keloid					
	1.	Inj. 10 mg/ml		(-)	(-)	(-) ✓
4	Kombinasi mengandung : O2 (Converted to ozone), dan Olive oil					
	1.	Gel.		(-)	(-)	(-) ✓
21. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI DAN LAIN-LAIN						
21.1 ORAL						
1	Kalium Klorida					
	1.	Tab. 600 mg	90 tab/bulan	(-)	✓	✓ ✓
2	Kombinasi mengandung : Karbohidrat 0,6g, protein 0,02g, lemak total 0,1 g, vit C 10mg, vit B1 0,5 mg, vit B2 0,5 mg, vit B6 0,5 mg, Niacin 2 mg					
	1.	Sachet		(-)	(-)	(-) ✓
3	Kalsium polistirena sulfonat					
	1.	Serbuk 5 gram		(-)	(-)	(-) ✓
4	Natrium Bikarbonat					
	1.	Tab. 500 mg		(-)	✓	✓ ✓
5	Zinc					
	1.	Sir. 20 mg/5 ml		(-)	(-)	(-) ✓
	2.	Tab. dispersible 20 mg		(-)	(-)	✓ ✓
6	Asam keto					
	1.	Tab		(-)	(-)	(-) ✓
21.2 PARENTERAL						
1	Kombinasi mengandung : CaCl ₂ 0,10 g, KCl 0,15 g, NaCl 3 g, Na asetat 3H ₂ O 1,9 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
2	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
3	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
4	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 2,25 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
5	Kombinasi mengandung : Glukosa 27,5 g, NaCl 1,125 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
6	Kombinasi mengandung : Glukosa 50 g, WFI ad 500 ml					
	1.	Inf.		(-)	(-)	✓ ✓
7	Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 13.5 g, NaCl 0.875 g, KCl 0.750 g, Na laktat 1.12 g, WFI ad 500 ml					

	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
8	Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 50 g, NaCl 0,875 g, KCl 0,75 g, Na Lactate 1,075 g, WFI ad 500 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
9	Kombinasi mengandung : NaCl 0,9 g, WFI ad 100 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
10	Kombinasi mengandung : NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
11	Kombinasi mengandung : NaCl 9 g, WFI ad 1000 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
12	Kombinasi mengandung : NaCl 4.3 g, KCl 0.15 g, CaCl ₂ 0.165 g, dekstrosa monohidrat 25 g, WFI ad 500 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
13	Kombinasi mengandung : NaCl 3 g, KCl 0.15 g, CaCl ₂ 0.1 g, Na.Laktat 1,55 g, WFI ad 500 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
14	Kombinasi mengandung : NaCl 15 g, WFI ad 500 ml						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
15	Kombinasi mengandung: L-Isoleucine 8,45 g, L-Leucine 9,46 g, L-Valine 7,09 g, L-Arginine 15 g, L-Ornithine-L-aspartate 10 g, L-Malic acid 7 g, Xylitol 50 g, Pyridoxine HCl 0,12 g, Nicotinamide 0,08 g, Sodium acetate 1,831 g, Sodium chloride 1,987 g, Magnesium sulphate 0,739 g, Sodium hydroxide 0,898 g						
	1.	Larutan		(-)	(-)	(-)	√
16	Kombinasi mengandung : Poli (O-2-hidroksi etil) pati 60,00 g (Substitusi molar: 0,38-0,45, berat molekul rata-rata: 130.000 Da), natrium asetat trihidrat 4,63 g, natrium klorida 6,02 g, kalium klorida 0,30 g, magnesium klorida heksahidrat 0,30 g						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
17	Larutan mengandung asam amino						
	1.	Inf.		(-)	(-)	√	√
18	Kombinasi mengandung :						
	a.	Fursultiamine HCl	2,5 mg				
	b.	dextrose monohydrate	200 mg				
	1.	Inj.		(-)	(-)	√	√



19	Kombinasi mengandung :						
	a.	Glycyrrhizic acid	40 mg				
	b.	Glycine	400 mg				
	c.	L-Cysteine	20 mg				
	1.	Inj.		(-)	(-)	√	√
21.3 ELEKTROLIT PEKAT							
1	Dextrosa monohidrat						
	1.	Lar. 400 mg		(-)	(-)	√	√
2	Kalium Klorida						
	1.	Lar. 74.6 mg		(-)	(-)	√	√
3	Natrium Bicarbonat						
	1.	Lar. 84 mg		(-)	(-)	√	√
4	Magnesium sulfat						
	1.	Lar. 200 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Lar. 400 mg		(-)	(-)	√	√
5	Sodium Chloride						
	1.	Lar. 9 mg		(-)	(-)	√	√
21.4 LAIN-LAIN							
1	Manitol						
	1.	Inf. 20 %		(-)	(-)	(-)	√
2	Air untuk irigasi (Sterile water)						
	1.	Inf. 1000 ml		(-)	(-)	(-)	√
3	Air steril untuk injeksi (WFI)						
	1.	Cairan inj.. 25 ml					
22. OBAT UNTUK MATA							
1	Carboksimetil selulosa Na						
	1.	Tetes mata 5 mg		(-)	(-)	(-)	√
2	Gentamisin						
	1.	Salep mata 0,3%		(-)	(-)	√	√
3	Kombinasi mengandung : CaCl ₂ anhidrat 0,075 g, K Iodida 0,075 g, Na Tiosulfat 0,0075 g, Fenilmerkuri nitrat 0,3 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
4	Kombinasi mengandung : Dextran 70 1 mg, hypromellose 3 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
5	Kombinasi mengandung : HPMC 3 mg, Dextran 1 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
6	Kombinasi mengandung : Chloramphenicol base 5 mg, Dexamethasone sodium phosphate 1 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√

7	Kombinasi mengandung : NaCl 4,4 mg, KCl 0,8 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
8	Kombinasi mengandung : Polimiksin 600 UI, neomisin 3,5 mg, deksametason 1 mg, benzalkonium 0,1 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
9	Kombinasi mengandung : polimiksin-B sulfat 6000 UI/ml, neomisin 3,5 mg, deksametason 0,1%						
	1.	Salep mata		(-)	(-)	(-)	√
10	Kombinasi mengandung : tobramycin 3 mg, deksametason 1 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
11	Levofloxacin						
	Hanya digunakan untuk operasi intraokular, keratitis, operasi katarak atau infeksi berat.						
	1.	Tetes mata 0,5%		(-)	(-)	(-)	√
12	Nafazolin HCl						
	1.	Tetes mata 1 mg		(-)	(-)	(-)	√
13	Natrium diklofenak						
	1.	Tetes mata 1 %		(-)	(-)	(-)	√
14	Phenylephrine HCL						
	Tidak diberikan pada pasien hipertensi.						
	1.	Tetes mata 10%		(-)	(-)	(-)	√
15	Tetrakain						
	1.	Tetes mata 0,5%		(-)	(-)	√	√
	2.	Tetes mata 2%		(-)	(-)	(-)	√
16	Tobramycin						
	Pada pasien yang resisten terhadap kuinolon dengan kasus ulkus kornea post operasi mata.						
	1.	Tetes mata 3 mg		(-)	(-)	(-)	√
17	Tropikamid						
	1.	Tetes mata 0,5%		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tetes mata 1%		(-)	(-)	(-)	√
18	Sodium Hyaluronate						
	1.	Tetes mata 0,1 %		(-)	(-)	(-)	√
19	Cromoyl Sodium						
	1.	Tetes mata 20 mg		(-)	(-)	(-)	√
20	Polyvinylpyrrolidone						
	1.	Tetes mata 20 mg		(-)	(-)	(-)	√
21	Kombinasi mengandung : Vitamin A 1000IU, oxymetazoline hydrochloride 0,25mg						

	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
22	Atropin sulfat						
	1.	Tetes mata 0,5%		(-)	(-)	(-)	√
23	Kombinasi mengandung : Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg						
	1.	Tetes mata		(-)	(-)	(-)	√
24	Betametason						
	1	Tetes mata 1mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
25	Natamycin						
	1.	Tetes mata 50 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
22.1 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA							
1	Timolol						
	Dapat diberikan di FPKTP yang memiliki fasilitas untuk mengukur tekanan intraokuler.						
	1.	Tetes mata 0,5%	2 btl/ bulan	(-)	√	√	√
2	Asetazolamid						
	a)	Tidak diberikan dalam jangka panjang.					
	b)	Hati-hati pemberian pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.					
	c)	Sebagai penanganan awal dan sementara di Puskesmas pada pasien glaukoma akut sebelum dirujuk.					
	1.	Tab. 250 mg	Maks 120 tab/ bulan. Untuk glaukoma akut: 1 minggu (paket CBG)	(-)	√	√	√
3	Betaxolol						
	1.	Tetes mata 0,5%	1 btl/ kasus	(-)	√	√	√
4	Latanoprost						
	Hanya untuk pasien glaukoma yang tidak memberikan respons pada timolol.						
	1.	Latanoprost 0,005%	1 btl/ bulan	(-)	√	√	√
23. OKSITOSIK							
	Metilergometrin						
	1.	Tab. 0,125 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Inj. 0,2 mg/ml		(-)	(-)	√	√
2	Misoprostol						
	1.	Tab. 0,2 mg		(-)	(-)	√	√
3	Oksitosin						
	1.	Inj. 10 UI/ml		(-)	(-)	√	√
24. PSIKOFARMAKA							
24.1 ANTI ANSIETAS							
1	Alprazolam						



	a)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Internis Psikosomatik.					
	b)	Hanya untuk kasus: - Panic attack - Panic disorder					
	c)	Peresepan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam maksimal 5 hari/bulan.					
	1.	Tab 0.5 mg	Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	2	Tab 1 mg	Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan	(-)	√	√	√
2	Diazepam						
	1.	Tab 2 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	2.	Tab 5 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	3.	Inj 5mg/mL		(-)	(-)	√	√
3	Clobazam						
	1.	Tab 10 mg	60 tab/bulan	(-)	√	√	√
4	Kombinasi mengandung : Klordiazepoksid 5mg, Klidinium Br 2,5 mg						
	1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
5	Lorazepam						
	1.	Tab 0.5 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
	2.	Tab 2 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
6	Estazolam						
	1.	Tab 1 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Tab 2 mg		(-)	(-)	(-)	√
24.2 ANTI DEPRESI							
1	Amitriptilin						
	1.	Tab 25 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
2	Escitalopram						
	1.	Tab 10 mg	30 tab/ bulan	(-)	(-)	(-)	√
3	Fluoksetin HCl						
	1.	Tab 10 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab 20 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
24.3 ANTI OBSESI KOMPULSI							
1	Fluoksetin HCl						
	1.	Tab 10 mg	30 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab 20 mg	120 tab/bulan	√	√	√	√
24.4 ANTI PSIKOSIS							
1	Aripripazol						
	a)	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi dibidang ilmu kedokteran jiwa, atau neurologi, atau neurologi anak. Termasuk untuk kasus iritabilitas terkait dengan gangguan autisme					
	1.	Tab 10 mg	Maksimal 15 mg/hari	√	√	√	√
2	Clozapin						
	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resitan terhadap antipsikotik lain						
	1.	Tab 25 mg	60 tab/bulan	(-)	√	√	√
3	Haloperidol						
	1.	Tab 0.5 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Maks 90 tab/bulan	√	√	√	√
	2.	Tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan	√	√	√	√
3	3.	Inj. 5mg/mL	Untuk agitasi akut Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk	(-)	(-)	√	√

			pemakaian jangka panjang) Maksimal pemberian 4 amp/hari selama maksimal 3 hari				
4		Risperidone					
	a)	Untuk skizofrenia					
	b)	Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat.					
	c)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa					
	1.	Tab 2 mg	120 tab/bulan	√	√	√	√
5		Trifluoperazin					
	a)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa					
	1.	Tab 5 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√
6		Olanzapine					
	a)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa					
	b)	Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat.					
	1.	Tab 5 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
7		Fluphenazine decanoate					
	1.	Inj. 25 mg/ml	Hanya untuk rumatan pada pasien skizofrenia. Maks 1 amp/2 minggu	√	√	√	√
8		Quetiapine fumarat					
	a)	Untuk skizofrenia					
	b)	Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respons terhadap pemberian litium atau valproat.					
	c)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.					
	1.	Tab. 200 mg	60 tab/bulan	√	√	√	√
9		Klorpromazin HCl					
	1.	Tab 100 mg	90 tab/bulan	√	√	√	√
24.5 OBAT UNTUK GANGGUAN BIPOLAR							
1		Na Divalproat					
	1.	Tab. lepas lambat 500 mg	90 tab/ bulan	√	√	√	√
	2.	Tab. sal. enterik 250 mg	60 tab / bulan	√	√	√	√
2		Litium karbonat					
	1.	Tab 200 mg	180 tab/ bulan	(-)	√	√	√
25. OBAT UNTUK SALURAN CERNA							
25.1 ANTASIDA DAN ANTIULKUS							
1		Kombinasi mengandung : Al(OH) ₃ 200 mg, Mg(OH) ₂ 200 mg, Simethicone					
	1.	Tab		(-)	(-)	√	√
	2.	Sirup suspensi		(-)	(-)	√	√
2		Lansoprazole					
	a)	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis					
	b)	Diberikan 1 jam sebelum makan.					
	c)	Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna.					
	1.	Kaps 30 mg	Maks 30 tab/bln	(-)	√	√	√
	2.	Serbuk Inj. 30 mg	1-3 amp/hari maks 3 hari.	(-)	√	√	√
3		Omeprazole					
	a)	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis.					
	b)	Diberikan 1 jam sebelum makan.					

	c)	Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna.					
	1.	Kaps 20 mg	Maks 30 kaps/bulan	(-)	√	√	√
	2.	Serbuk inj. 40 mg	1-3 amp/hari maks 3 hari.	(-)	√	√	√
4		Esomeprazole					
	1.	Serbuk inj 40mg	1 amp/hari maks 3 hari	(-)	(-)	√	√
5		Pantoprazole					
	1.	Serbuk inj. 40 mg		(-)	(-)	(-)	√
		Ranitidine					
	1.	Tab. 150 mg	30 tab/bulan	(-)	√	√	√
6	2.	Sirup 75 mg/5ml	Rawat inap : maksimal 1 btl Rawat jalan : sesuai plafon	(-)	(-)	(-)	√
	3.	Inj. 25 mg/ml	2 amp / hari	(-)	(-)	√	√
7		Sucralfat					
	1.	Sirup suspensi 500mg/mL		(-)	√	√	√
8		Dimetil-polisiloksan aktif					
	1.	Tab 40 mg		(-)	(-)	(-)	√
9		Misoprostol					
	1.	Tab 600 mcg		(-)	(-)	(-)	√
25.2 ANTIEMETIK							
1		Dimenhidrinat					
	1.	Tab. 50 mg		(-)	(-)	√	√
		Domperidone					
	1.	Tab. 10 mg		(-)	(-)	√	√
2	2.	Sirup 5 mg/5 mL		(-)	(-)	√	√
	3.	Drop 5 mg/ mL		(-)	(-)	(-)	√
		Metokloperamid					
	1.	Tab. 10 mg		(-)	(-)	(-)	√
3	2.	Inj. 10 mg/2 mL		(-)	(-)	√	√
		Ondansetron					
	1.	Tab. 8 mg	Maks 3 tab/hari pasca kemoterapi atau pasca radioterapi maksimal 5 hari	(-)	(-)	√	√
4	2.	Inj. 8 mg/ 4 mL	Maksimal 1 botol pascakemoterapi atau pascaradiologi	(-)	(-)	√	√
	3.	Inj. 4 mg/ 2mL	Inj diberikan 1 amp sebelum kemoterapi	(-)	(-)	√	√
5		Ramosetron Hcl					
	1.	Inj. 0,3 mg/2 mL		(-)	(-)	(-)	√
6		Granisetron					
		Inj. 1mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
25.3 ANTIHEMOROID							
1		Kombinasi mengandung : Bismuth subgallate 150 mg, zinc oxide 120 mg, lidocaine HCl 10 mg, hexachlorophene 2,5 mg					
	1.	Suppositoria	5 sup/kasus	(-)	(-)	√	√
2		Hidrosmin					
	1.	Kaps 200 mg	Rawat inap : sesuai plafon Rawat jalan : maks 10 tab	(-)	(-)	(-)	√
3		Kombinasi mengandung: Lithospermi radix extractum 0,18 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, dibucaini HCl 0,5 mg, diphenhydramini HCl 0,5 mg, cetrimide 2,5 mg					
	1.	Suppositoria		(-)	(-)	(-)	√
4		Kombinasi mengandung : Lithospermi radix extractum 0,18 mg, prednisolone 1 mg, lidocaine 15 mg, cetrimide 2,5 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, lechitium ovi 100 mg					

	1.	Suppositoria		(-)	(-)	(-)	√
25.4 ANTI SPASMODIK							
1	Atropin						
	1.	Inj. 0,25 mg/mL		(-)	(-)	√	√
2	Hiosin butilbromida						
	2.	Inj. 20 mg/mL		(-)	(-)	(-)	√
3	Kombinasi : Hyoscine butylbromide 10 mg, Paracetamol 500 mg						
	1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
4	Isoxsuprine HCl						
	1.	Tab. 20 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Inj. 10 mg		(-)	(-)	(-)	√
25.5 OBAT UNTUK DIARE							
1	Kombinasi mengandung : NaCl 0,52 g, KCl 0,30 g, trinitrium sitrat dinitrat 0,58 g, glukosa anhidrat 2,7 g						
	1.	Sachet		(-)	(-)	(-)	√
2	Attapulgit						
	1.	Tab 600 mg		(-)	(-)	(-)	√
3	Loperamid HCl						
	a)	Tidak digunakan untuk anak.					
	1.	Tab 2 mg	< 60 tahun : 10 tab/kasus > 60 tahun : 4 tab / kasus	(-)	(-)	√	√
4	Zinc						
	a)	Harus diberikan bersama oralit selama 10 hari.					
	1.	Tab. 20 mg		(-)	(-)	√	√
	2.	Sirup 20 mg/5 mL	Rawat jalan sesuai plafon Rawat inap : maks 1 btl	(-)	(-)	√	√
5	Kombinasi mengandung : Dextrose/glucose anhydrous 2.70 gram, Sodium chloride 0.52 gram, Potassium chloride 0.30 gram, Trisodium citrate 0.58 gram						
	1.	Sachet					
25.6 KATARTIK							
1	Bisakodil						
	1.	Tab 5 mg	2 tab/hari selama 5 hari kecuali untuk konstipasi kronis	(-)	(-)	√	√
	2.	Suppositoria 10 mg	3 sup/ kasus	(-)	(-)	√	√
2	Lactulosa						
	1.	Sirup 3,335 g / 5ml	Rawat jalan sesuai plafon Rawat inap : maks 1 btl	(-)	(-)	√	√
3	Kombinasi mengandung : Na. lauril sulfoasetat 0,045 g, PEG 400 0,625 g, sorbitol 4,465 g, Na Sitrat 0,450 g, asam sorbat 0,005 g						
	1.	Enema		(-)	(-)	(-)	√
4	Kombinasi mengandung : Monobasic Na phosphate 19 g, dibasic Na phosphate 7 g						
	1.	Enema		(-)	(-)	(-)	√
25.7 OBAT UNTUK ANTIINFLAMASI							
1	Sulfasalazin						
	a)	Untuk episode akut colitis ulcerativa dan colitis ulcerativa yang hipersensitif terhadap sulfonamida					
	1.	Tab 500 mg		(-)	√	√	√
25.8 LAIN-LAIN							
1	Asam ursodeoksikolat						
	1.	Kaps. 250 mg	90 kaps / bulan	(-)	√	(-)	√
26. OBAT UNTUK SALURAN NAFAS							
26.1 ANTI ASMA							
1	Aminofillin						
	1.	Tab. 200 mg		(-)	√	(-)	√
	2.	Inj. 24 mg/mL		(-)	(-)	(-)	√
2	Budesonid						

	a)	Hanya untuk serangan asma akut.					
	1.	Cairan inh. 0,25 mg/mL	Hari pertama maks 5 respul perhari, selanjutnya 2-4 respul perhari selama 5 hari.	(-)	(-)	√	√
3		Kombinasi mengandung : budesonide 160 mcg, formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg					
	1.	Serbuk inhalasi	Untuk terapi rumatan pada asma. Untuk terapi pelega pada asma persisten sedang-berat. untuk terapi rumatan pada PPOK. Tidak untuk bronkospasme akut. Asma intermiten : 1 tbg/bulan Asma persisten sedang : maks 2 tbg/bln. Asma berat: 3-4 tbg/bln. PPOK: 2 tbg/bln	√	√	√	√
4		Dexametason					
	1.	Tab 0,5 mg		√	√	√	√
	2.	Inj 5 mg/mL		(-)	(-)	√	√
5		Epinefrin					
	1.	Inj. 1 mg/mL		(-)	(-)	√	√
6		Fenoterol HBr					
	a)	Hanya untuk serangan asma akut.					
	1.	Aerosol 100 mcg/puff	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/bulan	√	√	(-)	√
7		Indacaterol					
	1.	Serbuk inhalasi 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.	√	√	(-)	√
8		Kombinasi mengandung : Ipratropium bromide 0.5 mg, salbutamol sulphate 2,5 mg					
	a)	Serangan asma akut.					
	b)	Bronkospasme yang menyertai PPOK.					
	c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).					
	d)	Sebagai nebulizer di UGD dan ruang perawatan.					
	1.	Cairan inh.	Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari paling lama 5 hari. Kasus ICU maks 10 vial/hari.	(-)	(-)	(-)	√
9		Metilprednisolon					
	1.	Tab 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus	√	√	√	√
	2.	Tab 8 mg		√	√	(-)	√
	3.	Tab 16 mg		√	√	(-)	√
	4.	Inj 125mg/mL		(-)	(-)	√	√
10		Salbutamol					
	a)	Hanya untuk serangan asma akut dan/atau bronkospasme yang menyertai PPOK atau SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)					
	1.	Tab 2 mg		√	√	√	√
	2.	Cairan inh 2,5 mg/2,5 mL	Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari Kasus di ICU maks 10 vial/hari	(-)	(-)	√	√
11		Kombinasi mengandung : Salmeterol 50 mcg, fluticasone propionate 250 mcg					
	a)	Tidak diberikan pada kasus asma akut.					

	1.	Inh. 250 mcg/puff	Maks 1 diskus atau 60 kapsul /bln	√	√	(-)	√
12		Tiotropium bromide					
	a)	Diberikan sebagai pengobatan pemeliharaan tambahan pada pasien asma persisten berat, berusia > 6 tahun, yang tetap bergejala terhadap kombinasi LABA + ICS dan telah mengalami eksaserbasi parah dalam satu tahun terakhir					
	b)	Hanya digunakan untuk severe asthma.					
	1.	Respimat inh. 2.5 mcg	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.	√	√	(-)	√
	2.	Respimat inh. 2.5 mcg refill	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.	√	√	√	√
13		Terbutalin					
		Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.					
	1.	Inj. 0,5 mg/ml	4amp/hari	(-)	(-)	√	√
14		Teofilin					
	1.	Tab. lepas lambat 250 mg		(-)	(-)	√	√
26.2 ANTITUSIF							
1		Kodein					
	1.	tab 10 mg	Maksimal 90 mg/hari	(-)	√	√	√
	2.	tab 15 mg		(-)	√	(-)	√
	3.	tab 20 mg		(-)	√	(-)	√
26.3 EKSPEKTORAN DAN MUKOLITIK							
1		Ambroxol					
	1.	Tab. 30 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Sir. 15 mg/5 mL		(-)	(-)	(-)	√
	3.	Drops 15 mg/mL		(-)	(-)	(-)	√
2		Glyceril Guaiacolat					
	1.	Tab. 100 mg		(-)	(-)	(-)	√
3		Asetilsistein					
	1.	Tab 200 mg	Maksimal 3 x sehari (600 mg/hari)	√	√	(-)	√
	2.	Infus 200mg/mL	Untuk keracunan parasetamol yang disengaja atau tiba-tiba Maksimal 3 hari	(-)	(-)	(-)	√
4		Kombinasi mengandung : asetilsistein 200 mg, paracetamol 500 mg					
	1.	Tab	Rawat jalan: sesuai plafon Rawat inap : maks 10 tab	(-)	(-)		√
5		Erdostein					
	1.	Tab. 300 mg		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Sirup 175 mg/ 5 ml	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 10 tab	(-)	(-)	(-)	√
26.4 OBAT UNTUK PENYAKIT PARU OBSTRUksi KRONIS							
1		Indakaterol					
	1.	Serbuk inhalasi 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.	√	√	(-)	√
2		Kombinasi mengandung : Ipratropium bromide 0.5 mg, salbutamol sulphate 2,5 mg					
	a)	Serangan asma akut.					
	b)	Bronkospasme yang menyertai PPOK.					
	c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).					
	1.	Cairan inh.	Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari paling lama 5 hari.	√	(-)	(-)	√

			Kasus ICU maks 10 vial/hari				
26.5 BATUK, PILEK, DAN FLU							
1	Kombinasi mengandung ; parasetamol 125 mg, dekstrometorfan 3,75 mg, klorfeniramin maleat 2mg fenilopropanolamin 3,125 mg						
	1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
2	Pseudoephedrin HCl						
	1.	Drops 7,5 mg btl. 15 ml		(-)	(-)	(-)	√
3	Kombinasi mengandung : Pseudoefedrin HCl 60 mg, Triprolidin HCl 2,5 mg						
	1.	Tab	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks10 tab	(-)	(-)	(-)	√
4	Kombinasi mengandung : Pseudoefedrin HCl 30 mg, Triprolidin HCl 1,25 mg						
	1.	Sirup	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 2 btl	(-)	(-)	(-)	√
5	Kombinasi mengandung : chlorpheniramine maleate 2 mg, dextromethorphan HBr 10 mg, Pseudoephedrin HCL 30 mg						
	1.	Sirup	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 2 btl	(-)	(-)	(-)	√
6	Kombinasi mengandung : Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 2 mg, glyceryl guaiacolate 50 mg, paracetamol 500 mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg						
	1.	Tab	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 10 tab	(-)	(-)	(-)	√
7	Kombinasi mengandung : Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 0,5 mg, glyceryl guaiacolate 25 mg, paracetamol 125 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, succus liquiritiae 125 mg						
	1.	Sirup	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 2 btl	(-)	(-)	(-)	√
8	Kombinasi mengandung : Extract thymi 41,67 mg, extract primulae 10 mg, extract althaea 58,33 mg, extr droserae 25 mg, extract serphylli 35 mg, oleum eucalyptus, oleum anisi, menthol, oleum menthae, sodium saccharin						
	1.	Sirup	Rawat jalan : sesuai plafon Rawat inap : maks 2 btl	(-)	(-)	(-)	√
9	Kombinasi mengandung : Paracetamol 500 mg, penilpropanolamin 15 mg, klorpeniramin 2 mg, gliseril guaiacolat 50 mg						
	1.	Tab.		(-)	(-)	(-)	√
10	Kombinasi mengandung : parasetamol 500 mg, pseudoefedrin 7,5 mg, klorpeniramin 2 mg						
	1.	Tab.		(-)	(-)	(-)	√
27. OBAT YANG MEMPENGARUHI SISTEM IMUN							
27.1 SERUM DAN IMMUNOGLOBULIN							
1	Imunoglobulin tetanus						
	a)	Khusus umum, asuransi swasta, JKK					
	1.	Inj. 250 IU/mL		(-)	(-)	√	√
2	Hepatitis B surface antigen						
	1.	Inj. 20 mcg/mL		(-)	(-)	√	√
	2.	Inj. 10 mcg/mL		(-)	(-)	√	√
3	Serum anti bisa ular						
	1.	Inj. 5 ml		(-)	(-)	√	√
27.2 VAKSIN							
1	Kombinasi mengandung : Diphtheria toxoid not <20 IU; tetanus toxoid not <40 IU; Bordetella pertussis antigens: Pertussis						

	toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg; inactivated poliovirus: type 1 (Mahoney) 40 D antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D antigen units, type 3 (Saukett) 32 D antigen units; HBsAg 10 mcg; H. influenzae type b polysaccharide 12 mcg (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein 22-36 mcg					
1.	Inj. 0,5 ml		(-)	(-)	(-)	√
2	Kombinasi mengandung : Adsorbed diphtheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, adsorbed pertussis toxoid 25 mcg, adsorbed filamentous haemagglutinin 25 mcg, adsorbed pertactin 8 mcg, adsorbed recombinant HBsAg 10 mcg, 40 D-antigen units of type 1 (Mahoney), 8 D-antigen units of type 2 (MEF-1) & 32 D-antigen units of type 3 (Saukett) of the poliovirus, adsorbed polysaccharide of HiB (PRP) 10 mcg (conjugated to tetanus toxoid 20-40 mcg)					
1.	Inj. 0.5 ml		(-)	(-)	(-)	√
3	Kombinasi mengandung : Adsorbed diphtheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg, pertactin 8 mcg, inactivated poliovirus type 1 (Mahoney) 40 D-antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D-antigen units & type 3 (Saukett) 32 D-antigen units, H. influenzae type b polysaccharide 10 mcg (terkonjugasi dg tetanus toxoid lebih kurang 30 mcg)					
1.	Inj. 0.5 ml		(-)	(-)	(-)	√
4	Human tetanushospatelin Antitoksin Tetanus 1.500 UI					
1.	Inj. 1.500 UI		(-)	(-)	√	√
5	Kombinasi mengandung : Agkistrodon rhodostoma ≥10 LD50, Bungarus fasciatus ≥10 LD50, Naja sputatrix ≥25 LD50, phenol 2.5 mg					
1.	Inj. 5 ml		(-)	(-)	(-)	√
6	Kombinasi mengandung : Human papillomavirus type 16 L1 protein 20 mcg, human papillomavirus type 18 L1 protein 20 mcg (recombinant & ASO4 adjuvanted).					
1.	Inj. 0.5 ml		(-)	(-)	√	√
7	Human rotavirus vaccine RIX4414 strain not < 10 ⁶ CCID50					
1	Inj. 1.5 ml		(-)	(-)	√	√
8	Kombinasi mengandung : Pneumococcal polysaccharide (serotype 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, & 23F) & nontypeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine, adsorbed					
1.	Inj. 0.5 ml		(-)	(-)	(-)	√
9	Kombinasi mengandung : Haemagglutinin of influenza virus antigen of strain A/H1N1 15 mcg, strain A/H3N2 15 mcg, strain B 15 mcg, thimerosal 4 mcg					
1.	Inj. 0,5 ml		(-)	(-)	(-)	√
10	Kombinasi mengandung : Measles, Mumps, Rubella Vaccine					
1.	Inj. 0,5 ml		(-)	(-)	√	√
11.	Pneumococcal polysaccharide conjugated vaccine 7 valent					
1.	Inj. 0,5 ml		(-)	(-)	√	√

12	Kombinasi mengandung :Typhoid Vi polysaccharide 0.025 mg, Phenol (preservative) max 1.250 mcg.					
1.	Inj. 0,5 ml		(-)	(-)	(-)	√
13	Live attenuated recombinant Japanese Eencephalitis virus : 4.0-5,8 log PFU					
1.	Inj 0.5 mL		(-)	(-)	√	√
28. OBAT UNTUK TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN						
1	Docusate Sodium					
1.	Drop 5 mg/ 10 ml		(-)	(-)	(-)	√
2	Chloramphenicol base 1 %					
a)	Untuk infeksi telinga dengan membran timpani yang utuh					
1.	Tetes telinga		(-)	(-)	(-)	√
3	Fluticasone propionat					
1.	Inh. 50 mcg/puff	1 btl/bulan	(-)	(-)	(-)	√
	Untuk rumatan asma (Tidak untuk serangan asma akut).					
4	Kombinasi mengandung : Polymixin B Sulfate 10.000 UI, neomycin sulfate 5 mg, fludocortisone acetate 1 mg, lidokain HCl 40 mg					
1.	Tetes telinga		(-)	(-)	(-)	√
5	Natrium Klorida					
1.	Drops 6,5 mg/ml		(-)	(-)	(-)	√
6	Framycetin sulfat 5 mg, gramicidin 0,05 mg, dexamethason 0,5 mg					
1.	Drops 5mL		(-)	(-)	(-)	√
7	Ofloxacin					
1.	Drops 3mg/mL		(-)	(-)	(-)	√
29. VITAMIN DAN MINERAL						
1	Kombinasi mengandung : Ekstrak kering Bilberry 80 mg, Retinol 1600 IU, vit.E 40 mg, Beta-carotene 5 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
2	Kombinasi mengandung : Ekstrak kering Bilberry 80 mg, Retinol 1600 IU, vit.E 40 mg, Beta-carotene 5 mg, lutein 250 mg, zeaxanthin 60 mcg, Zn 5 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
3	Vitamin B1					
1.	Inj. 2,5mg/ml amp		(-)	(-)	(-)	√
4	Kombinasi mengandung : vit.B1 1 mg, vit.B2 1,25 mg, vit.B6 1 mg, vit.B3 10 mg, Ca D-Panhotenat 5 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
5	Piridoksine (Vitamin B6)					
1.	Tab 10 mg		√	√	√	√
6	Kombinasi mengandung : Vit.B1 100 mg, vit.B6 100 mg, vit.B12 5000 mcg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
7	Kombinasi mengandung : Vit. B1 50 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 100 mcg, metampiron 500 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
8	Kombinasi mengandung : Vit. B1 100 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 5000 mcg					
1.	Inj		(-)	(-)	(-)	√
2.	Sachet		(-)	(-)	(-)	√
9	Kombinasi mengandung : Vitamin B1 100mg, Vitamin B6 100 mg, Vitamin B12 5 mg.					
1.	Inj		(-)	(-)	(-)	√



10	Kombinasi mengandung : Silybin-phospholipids (silybin setara dengan 48 mg, 3-SN-phosphatidyl choline 96 mg) 144 mg, vitamin B1 6 mg, vitamin B2 6 mg, vitamin B6 6 mg, vitamin B12 6 mcg, vitamin E 15 mg, nicotinamide 30 mg.					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
11	Vitamin C					
1.	Tab 500 mg		(-)	(-)	(-)	√
12	Kombinasi mengandung : Vit.A 2400 IU, vit.D 400 IU, vit.C 60 mg, vit.B1 4mg, vit.B2 1.2 mg, vit.B6 1.2 mg, vit.B12 4 mcg, nikotinamida 16 mg, kolin 12 mg, inositol 12 mg, L-lysine HCl 200 mg, kalsium 33,1 mg, natrium 5,2 mg/ 5 ml					
1.	Sirup		(-)	(-)	(-)	√
13	Kombinasi mengandung : natural fish oil, providing DHA 214 mg, EPA 20 mg, vit E 10 mg					
1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	√
14	Kombinasi mengandung : Cod liver oil 200 mg, vit.A 120 IU, vit D3 17 IU, omega-3, EPA 16mg, DHA 14mg, vit.E 5mg, vit.B12 1mcg, vit.B9 0.3mg, vit.B6 0,6 mg, Ca 40mg, Mg 25mg, Fe 4.76 mg					
1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	√
15	Kombinasi mengandung : Fe Fumarat 360 mcg, B6 3 mg, vit.B9 1,5 mcg, B12 15,5 mcg, vit C 75 mcg, Vit E 5 mg, Cu sulfat 0,35 mcg, Co sulfat 0,15 mg, Mn Sulfat 0,05 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
16	Kombinasi mengandung : Fe fumarat 90 mg, vit.B1 6mg, vit.B3 30 mg, vit.B6 5 mg, vit.B9 0.8 mg, vit.B12 0.025 mg, fish oil 10%, EPA 50%, DHA 200 mg					
1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	√
17	Kombinasi mengandung : Radix astragali membranaceus 0.127 g, radix salvia miltiorrhizae 0.025 g, radix paeoniae rubra 0.025 g, rhizoma lingusticum chuanxiong 0.025 g, radix panax notoginseng 0.025 g, cortex moutan (paeonia suffruticosa) 0.025 g, whitmania pigra Whitman 0.015 g, eupolyphaga seu steleophaga 0.015 g, lignum dalbergiae odoriferae 0.025 g, calculus bovis (synthetic) 0.006 g, ramulus uncariae cum uncis 0.006 g, buthus martensii 0.021 g, radix polygalae tenuifolia/ sibirica 0.025 g, rhizoma acori tatarinowii 0.025 g					
1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
18	Kombinasi mengandung : DL-3-methyl-2-oxo-valeric acid 67 mg, 4-methyl-2-oxo-valeric acid 101 mg, 2-oxo-3-phenyl-propionic acid 68 mg, 3-methyl-2-oxo-butyric acid 86 mg, DL-2-hydroxy-4-methylthio-butyric acid 59 mg, L-lysine monoacetate 105 mg, L-threonine 53 mg, L-tryptophan 23 mg, L-histidine 38 mg, L-tyrosine 30 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
19	Kombinasi mengandung : kolin sitrat 147,5 mg, sitidin monofosfat 121,5 mg, fosfatidil serin 125 mg					
1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
20	Kombinasi mengandung : Orthosiphonis Folium 150 mg, Sericocalysis Folium 75 mg, Phyllanthi Herba 50 mg, Foenigraeci Semen 100 mg					

	1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
21	N (2)	L Alanyl Glutamin					
	1.	Infus 200mg/100mL		(-)	(-)	(-)	√
22		Kombinasi mengandung : Dibasic calcium phosphate 200 mg, Calcium Lactate 100 mg, Vitamin B6 20 mg, Vitamin C 25 mg, Vitamin D 100 IU					
	1.	Tab		(-)	(-)	(-)	√
23		Metilcobalamin					
	1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	√
24		Calcitriol 0,25 mcg					
	a)	Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 atau pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol.					
	1.	Kaps	Maksimal 90 kaps/bulan	√	√	(-)	√
25		Glucosamine HCl					
	1.	Tab 250 mg		(-)	(-)	(-)	√
26		Kombinasi mengandung : Kalsium karbonat 400 mg, vit D3 50 IU, evening primrose oil (mengandung asam γ-linoleate 40 mg) 400 mg					
	1.	Kaps		(-)	(-)	(-)	√
27		Kalsium laktat					
	a)	Untuk hipoparatiroidisme.					
	1.	Tab 500 mg		(-)	√	√	√
28		Fe					
	1.	Sirup 15 mg/5mL		(-)	(-)	(-)	√
	2.	Drop 15 mg/mL		(-)	(-)	(-)	√
29		Asam folat					
	1.	Tab 400mcg		(-)	√	(-)	√
	2.	Tab 1 mg		(-)	√	(-)	√
30		Red yeast rice (angkak) extract 300mg, Guava folium extract 300mg					
	1.	Sachet		√	√	√	Hanya untuk umum
31		Ekstrak ginkgo-biloba 40mg					
	1.	Tab		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
32		Kombinasi mengandung : Vitamin A 2000 IU, tiamine 5 mg, riboflavin 2 mg, pyridoxine 5 mg, cyanocobalamin 2 mcg, nicotinamide 10 mg, folic acid 15 mcg, choline 5 mg, inositol 12 mg, biotin 100 mcg, vitamin E 5 IU, Fe 5 mg, Zn 2,5 mg, Mg 35 mg, copper 300 mcg, selenium 20 mcg, chromium 15 mcg, lysine 100 mg, L-glutamine 50 mg					
	1.	Sirup		(-)	(-)	(-)	√
33		Kombinasi mengandung : Zn 1.5 mg, vitamin A 2,000 IU, vitamin B1 0.5 mg, vitamin B2 0.6 mg, vitamin B12 2 mcg, vitamin C 30 mg, vitamin D3 400 IU, vitamin E 5 IU, pantothenic acid 5 mg, nicotinamide 8 mg, biotin 5 mcg					
	1.	Drop		(-)	(-)	(-)	√
34		Kombinasi mengandung : Chinacea angustifolia 250 mg, black elderberry 400 mg, Zn picolinate 10 mg, vit C 50 mg					
	1.	Tablet		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum
35		Kombinasi mengandung : Vitamin C 100 mg, Vitamin D3 400 IU, Vitamin E 10 IU, Zinc 10 mg					
	1.	Sirup		(-)	(-)	(-)	√

36	Kombinasi mengandung : Ekstrak curcuma xanthorrhiza rhizoma (temulawak) 20 mg dan piperin 2,5 mg						
	1.	Tablet		(-)	(-)	(-)	Hanya untuk umum