

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKIN TES BENZATINE PENICILLIN		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 375.41/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 23 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Untuk menghindari syok anafilaktik, reaksi hipersensitivitas berat terhadap Benzathine Penicillin, perlu dilakukan skin tes terlebih dahulu		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan skin tes benzathine penicillin		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi. 3. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, Jakarta, 2015. 4. Standard Operasional Prosedur Klinik Infeksi Menular Seksual, Departemen Kesehatan- USAID- FHI-ASA, 2007.		
Prosedur	A. Alat dan Bahan 1. Sarung tangan 2. Benzathine Penicilin 2,4 juta IU 3. Water for injection 4. Kapas alkohol 5. Insul 1 cc B. Prosedur 1. Jelaskan kepada pasien tentang prosedur yang akan dijalani dan alasan harus dilakukan skin test. 2. Larutkan Benzatin Penicillin dengan 9 cc Aqua. 3. Ambil 0,1 cc ke dalam insul 1 cc kemudian tambahkan 0,9 cc Aqua for injection. 4. Desinfeksi lengan bawah bagian dalam dengan kapas alcohol. 5. Suntikkan secara intradermal sebanyak 0,02cc dengan jarum suntik ukuran 26 atau 27 pada permukaan volar lengan bawah. 6. Tepi bentol kemerahan akibat injeksi ditandai dengan bolpen 7. Amati selama 15 – 20 menit. 8. Bila diameter bentol kemerahan meluas lebih dari 3 mm dibandingkan lesi awal, tes kulit dinyatakan positif. 9. Bila hasil uji kulit positif, berarti pasien alergi terhadap penisilin, desensitisasi juga bisa dilakukan pada ibu hamil.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		