

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEHIDRASI BERAT NEONATUS		
	No.Dokumen 875.1/I-SPO/DIR/VI/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 25 Juni 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Dehidrasi berat adalah dehidrasi yang terjadi apabila terdapat dua atau lebih tanda dan gejala klinis berupa letargi atau penurunan kesadaran,mata cekung, turgor memanjang (> 2 detik) dan tidak bisa minum atau malas minum.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas untuk mengatasi dehidrasi berat bayi/ anak.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 476.A4/RSPH/I/DIR/VII/2016 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap		
Alat dan bahan	1. Cairan infus RL 2. Infus set 3. Abocath 4. Plester 5. Spalek 6. Kapas Alkohol 7. Oralit 8. Gelas 9. Air Minum		
Prosedur	1. Lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 2. Laporkan hasil kepada DPJP 3. Persiapkan memasang infus jalur IV - Berikan cairan IV ringer lactat (jika tidak tersedia berikan Nacl 0,9) sebanyak 30 ml/kgBB selama 1 jam (10 tetes/makro/kgBB menit atau 30 tetes mikro/kgBB/menit dilanjutkan 70 ml/kgBB dalam 5 jam berikutnya 4. Lakukan monitoring selama 30 menit 5. Laporkan kondisi pasien ke DPJP setelah dilakukan tindakan pemberian infus. Dokumentasikan <i>advice</i> DPJP dalam CPPT dalam format SBAR 6. Lakukan tindakan sesuai dengan <i>advice</i> DPJP 7. Pantau selalu kondisi pasien sampai stabil 8. Dokumentasikan semua tindakan dan hasil evaluasi dalam rekam medis		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap Neonatologi 3. NICU		