

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	HIPOTERMIA NEONATUS		
	No.Dokumen 875.2/I-SPO/DIR/VI/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 25 Juni 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Hipoglikemia adalah kadar gula plasma kurang dari 2,6 mmol/L (< 47 mg/dl). Untuk neonatus aterm berusia kurang dari 72 jam dipakai batas gula darah plasma < 35 mg/dl. Sedangkan untuk neonatus prematur dan KMK yang berusia kurang dari 1 minggu, disebut hipoglikemia bila kadar gula darah plasma kurang dari 25 mg/dl		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas untuk mengatasi hipoglikemi pada neonatus		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 476.A4/RSPH/I/DIR/VII/2016 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap		
Alat dan bahan	1. S spuit 3cc, 5 cc, 10cc, 20cc 2. Infus set 3. Cairan dextrose 10%		
Prosedur	1. Lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 2. Lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu 3. Laporkan hasil kepada DPJP 4. Jika asimtomatis: teruskan pemberian ASI setiap 1-2 jam atau 3-10 ml/kg, selanjutnya monitor kadar gula darah setiap kali sebelum bayi minum sampai kadar gula darah stabuil. Jika kadar gula darah tetap rendah, dapat dimulai infus glukosa dengan pemberian ASI tetap dilanjutkan 5. Jika simptomatis atau kadar gula plasma < 25 mg/dL: segera berikan D10% 2cc/kgBB dan diberikan ASI secara lebih sering. Dilanjutkan dengan IVFD D10% 60ml/kgBB/hari 6. Cek GD ulang setiap 30 menit – 1 jam sampai euglikemik kemudian setiap 6 jam 7. Jika GD stabil 24 jam dan 2 kali pemeriksaan berurutan GD >47mg/dL, infus diturunkan bertahap 8. Dokumentasikan semua tindakan dalam rekam medis		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap Neonatologi		