INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 5

Hirsutismo, hipertricosis y depilación



© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ÍNDICE

5.1. El pelo.

5.2. Hirsutismo.

5.3. Hipertricosis.

5.4. Métodos de depilación y epilación.

OBJETIVOS

- Saber las diferencias entre hirsutismo e hipertricosis.
- Saber la diferencia entre depilación y epilación y conocer los diferentes métodos.

5.1. EL PELO

El pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo formada por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el cabello las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.



El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100 000 y 150 000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de esta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede penetrar en estos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por la frente.

Estructura

El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del árbol se consideraría aquí tallo piloso y la tierra se consideraría aquí folículo piloso. El cabello es por tanto una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la epidermis denominada folículo piloso.

Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. Cada cabello empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño tubo llamado folículo.

A medida que el pelo crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde puede ser visto. La parte que vemos, que forma la fibra del cabello (eje), de hecho, está biológicamente muerta. El eje del pelo es una estructura compleja que consiste en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras exteriores (cutícula). Cutícula del Cabello.

La cutícula es la parte externa de la fibra del pelo. Es la cutícula la que necesita cuidados y la que está sujeta a ataques del medio. La condición de su cabello depende de la cutícula. El viento, la lluvia, la luz solar, piscinas y agua salada, químicos fuertes,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

permanentes excesivas, decoloración o coloración y daño mecánico causado por cepillado fuerte puede causar daño a su cabello. Dependiendo del tipo de daño, hay tratamientos especiales que le pueden ayudar a prevenir y a reparar el cabello dañado.

Los vasos capilares en la base de cada folículo, llamado papila, nutren cada raíz de cabello para permitirle crecer. Esta parte del pelo requiere el cuidado que viene desde adentro, de una nutrición completa con todas los minerales, vitaminas y aminoácidos. Una deficiencia en vitaminas o un nivel anormal de proteínas, debido a una dieta desequilibrada o a cambios hormonales, puede alterar su crecimiento, dañando la estructura y la operación de la raíz del pelo. Estas situaciones pueden llevar problemas de pérdida y caída del cabello. Cada folículo tiene una glándula sebácea que es responsable de mantener la condición de su pelo. El sebo es ese material graso producido por las glándulas sebáceas que lubrica naturalmente su cabello.

En definitiva, en el cabello podemos distinguir dos partes: La parte externa y visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el interior de la piel, que conocemos como raíz pilosa. Mientras que el tallo está compuesto por células totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la raíz es la parte viva del pelo en la que se encuentran las células germinativas. A esta zona se la conoce como matriz.

La raíz

Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la epidermis denominada folículo piloso. Este permite su crecimiento.

La raíz del pelo está compuesta por células vivas, no queratinizadas. Podemos distinguir varias partes:


Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células de la matriz germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de la vaina externa.

- Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al folículo piloso y que disminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario de la vaina interna).

- Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya formado por fibras musculares lisas que se dirigen desde la dermis papilar hasta por debajo de la glándula sebácea.

- Bulbo piloso: Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado por un conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que formarán la queratina del pelo. La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina la papila el pelo desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila reanudándose el ciclo piloso.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

El tallo

En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte central formada por la médula y dos capas envolventes: Una media, llamada corteza o córtex y una externa denominada cutícula. Está compuesto por células muertas queratinizadas y sin núcleo.

- Cutícula: Es la parte más exterior del tallo y está formada por unas células aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (translúcidas) que se superponen unas sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el extremo libre hacia la punta del pelo.

- Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De ella dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.

- La médula: Es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí.

Propiedades

Las propiedades más importantes del cabello son:

- Permeabilidad: Se define la permeabilidad como la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos y debe tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico. Las fibras de queratina tienen una gran atracción por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a absorber, hasta una tercera parte de su peso. Al producirse en el cabello una absorción de agua, puede producirse en éste una alteración de las demás características tales como su longitud, diámetro y forma.

- Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del cabello está determinada por su estructura y composición química. La

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

resistencia del pelo puede verse alterada por la acción de determinados agentes químicos como ocurre en el caso de los cabellos decolorados. La tensión ejercida sobre el cabello está relacionada directamente con el contenido de azufre en éste y antes de romperse el cabello se produce en él una serie de transformaciones en su queratina. También es muy resistente al calor, resistiendo temperaturas superiores a 140º C de calor seco y de calor húmedo hasta 220º C (siendo de vital importancia tenerlo en cuenta en los cambios de forma del cabello). Por último, la gran cantidad de azufre y su estructura compacta de la queratina la hace muy resistente a los ataques de microorganismos.

- Plasticidad: Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas formas al cabello sin que éste recupere inmediatamente su forma natural. Cuando mojamos el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y se moldea éste con mayor facilidad.

- Elasticidad: Es la propiedad más importante del cabello y puede variar su forma, longitud y diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo a su forma original cuando cesa ésta.


  Esta propiedad está relacionada con la mayor o menor unión entre las moléculas de la queratina, pudiendo verse afectada por algunos factores tales como la humedad, la temperatura, la radiación ultravioleta y algunas sustancias químicas. La elasticidad puede llegar hasta una tercera parte de la longitud del cabello.

- Propiedades eléctricas: Esta propiedad se produce por fricción (cepillado, peinado, etc.) Es debido a la presencia de cargas electrostáticas, impidiendo éstas el normal peinado y cepillado del cabello. Se pueden reducir estas cargas de dos formas:

  - Mojando el cabello.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Recubriendo el cabello mediante una película grasa, bien procedente del propio sebo o de un cosmético de tipo graso.



Composición química

El cabello está compuesto por: Proteínas, lípidos, oligoelementos, agua, pigmentos y otras sustancias.

- 28% de proteínas.
- 2% de lípidos.
- 70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.).

Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del cabello y de las uñas tienen mayor contenido en azufre, que la de la piel. Podemos diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda. La queratina dura presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda se observa en la médula del pelo. La ruptura de la

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

queratina se debe a la acción de álcalis fuertes y reductores, en esto se basa el proceso de cambio de forma permanente.

Ciclo

El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos. Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo. Cada folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros folículos que hay alrededor.

El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en personas mayores. En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases:

- Fase Anágena: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en esta fase es más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente. Representa esta fase al 85% de los cabellos.

- Fase Catágena: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila cesando la actividad de las células de 6 la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico. Representa el 1% de los cabellos.

- Fase Telógena: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses aproximadamente. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo. Representa el 14% de los cabellos.

Tipos de cabello

Podemos distinguir tres tipos de cabello:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Lanugo: Es el primer cabello que se forma en la vida uterina; alrededor de la semana veinte al veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.



- Vello: La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa pigmentación y corto (menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo en la mayor parte de las zonas corporales donde se encontraba éste. No existe este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello Terminal, ni en la zona plantar.



- Pelo Terminal: Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como el cuero cabelludo, cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados, medulados, gruesos, resistentes y relativamente largos. Son los primeros cabellos terminales elaborados en el folículo piloso. En la adolescencia se produce el llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la aparición de andrógenos de origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o pelo sexual secundario

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

que sustituye al vello de las axilas, la zona púbica, abdomen, tronco y barba en los varones. En el cuero cabelludo se puede producir una atrofia del pelo Terminal y convertirse en vello.

Clases de cabello

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.

Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:

- Estructurales.

El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física:

- Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
- Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.
- Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la superficie de la piel. En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

- Según la emulsión epicutánea.

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea, que presenta en:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y aterciopelado.
- Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.
- Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

- Según su resistencia.

Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y personas que tienen la piel fina.

Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está asociado a una piel gruesa.

Las características o determinación del cabello varían de acuerdo con la raza, el sexo, la edad, la zona cutánea y las particularidades propias de cada individuo.

Distribución

Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y de la herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada varía según el color de cabello de esa persona. Así: Una cabellera rubia tendrá un promedio de 50.000 pelos, una cabellera morena tendrá un promedio de 100.000 pelos y una cabellera pelirroja entre 80.000 y 90.000. Los pelos se encuentran localizados en gran número por toda la superficie corporal, excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Longitud



El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de 10 a 20 cm por año.

Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado este tiempo el cabello cae y otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no excede de un metro aproximadamente.

El ritmo de crecimiento de cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y después es más lento.

En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y algunas enfermedades o embarazo puede retardar su crecimiento.

Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:

- Factores genéticos.
- Factores hormonales.
- Factores de nutrición.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.).
- Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.).

La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata, pero que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el cuerpo podrían clasificarse según sus características de longitud en:

- Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la axila y del pubis.
- Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las orejas.
- Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las extremidades

Color

El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo (feomelanina).

La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural de su pelo. En alguna forma también es cierto que mientras más claro sea un pelo menos melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que alguien con pelo rubio o rojo.

El color del pelo es una característica individual, que está determinada genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la coloración de los ojos o la pigmentación cutánea.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

El color que presenta el pelo es debido a la eumelanina y feomelanina. La disposición y cantidad de estas melaninas proporcionan las diferentes tonalidades de pelo, por lo que el color del cabello se debe a la presencia de gránulos de melanina elaborados del bulbo capilar y distribuido en los queratinocitos del tallo, de forma similar a lo que ocurre en la epidermis. En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante dependerá de las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su distribución en el córtex.

Existen tres tipos de melaninas:



- Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.
- Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
- Tricocromo: De color rojizo.

Sobre la melanina influyen varios factores:

- La herencia: Raza y características que heredamos de los padres.
- Las hormonas: MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del color del cabello, mientras que la piel se oscurece.
- La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco, hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el cabello comienza a volverse blanco (canicie).
- Otros factores: Ciertos medicamentos, la falta de nutrición, trastornos metabólicos, emocionales, etc.

Forma/implantación

La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero cabelludo. En el cabello nos podemos encontrar los denominados" remolinos", diferentes líneas de implantación y distintas direcciones de las raíces.

En la zona donde hay remolinos el cabello nace con más fuerza en la "raíces" y se dirige hacia una dirección determinada. No se puede eliminar, pero en cambio si se puede disimular aplicando la técnica adecuada en el corte y el peinado. La línea de implantación es distinta en cada persona y no se puede eliminar, sólo adaptarla por el peinado adecuado.

El cabello puede tener en su raíz más o menos fuerza, esto le da una caída natural característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al conjunto de la cabellera. Se pueden encontrar diferentes líneas de implantación de cabello en la parte delantera como en la nuca. Aquí pueden ser en pico, dos puntas, tres puntas, cuadrado y redondo.

Calidad

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Se determinará la calidad el cabello a través del tacto y la vista. La calidad del cabello depende sobre todo de la herencia capilar y además de unos cuidados alimenticios y estéticos.

5.2. HIRSUTISMO

Esta patología, conocida como hirsutismo, suele aparecer en la etapa de la primera menstruación, manteniéndose durante toda la vida reproductiva en distinta intensidad, dependiendo de cada persona. También puede aparecer después de la menopausia, aunque son pocos los casos.

El hirsutismo es un trastorno hormonal que se presenta en mujeres, en el que hay un aumento de secreción de los andrógenos, de la testosterona, y/o modificación en los receptores de dicha hormona, generando crecimiento excesivo de vello con características masculinas. Puede darse en diferentes zonas del cuerpo, como mentón, pecho, mama, panza, abdomen, muslos, espalda y antebrazos. Entre un 5 y un 10% de las mujeres tiene hirsutismo.

Es importante diferenciar entre hirsutismo e hipertricosis: El primero es el crecimiento excesivo del vello terminal, con característica masculina, y hormonalmente dependiente; el segundo es genético, el vello que crece es fino, se da en distintas cantidades, sin características masculinas, y no tiene tratamiento.

El hirsutismo, en general, aparece en la etapa previa a la primera menstruación; en estos casos, el síntoma acompaña a la mujer toda la vida. También hay casos de mujeres que desarrollan hirsutismo luego de la menopausia; son menos frecuentes, pero pueden suceder. Los casos pediátricos son pocos y deben estudiarse, ya que puede haber cambios en el desarrollo y el estímulo hormonal del paciente.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

El cuadro de hirsutismo, dependiendo de la persona, puede ser reversible o no. Muchas veces sucede que el tratamiento se suspende, como por ejemplo en el embarazo, y el vello puede volver a crecer. Esto dependerá de la etapa de la vida de la mujer, la edad y el tipo de tratamiento utilizado, haciendo que la forma y la severidad del crecimiento del vello varíe.

Se dan casos de mujeres muy angustiadas por el vello; es algo que depende de la intensidad y de la zona en la que se produzca. Hay mujeres que lo manejan con tratamientos locales como la depilación, pero cuando aparece en zonas muy visibles, como el mentón, a nivel personal o social puede molestar mucho y acarrear consecuencias psicológicas.

A. Las causas del hirsutismo.

Las causas por las que una mujer tiene mayor producción de andrógenos pueden ser ováricas, adrenales, idiopáticas y tumorales.


- En el primer caso, aparece una alteración hormonal de los andrógenos en el ovario; la patología más común de estos casos es el Síndrome del ovario poliquístico.
- Las causas adrenales se dan porque las glándulas suprarrenales, en donde se producen los andrógenos, están dañadas o alteradas como consecuencia de una patología con el nombre de hiperplasia suprarrenal congénita.
- Por otro lado, están las causas idiopáticas, es decir, que no existen alteraciones en el cuerpo: Cuando se hacen los estudios no se encuentra ningún cambio o alteración.

Del total de los casos, un 60% corresponden a causas ováricas, 25% a las tumorales, 10% a las idiopáticas y 2% a las adrenales. El diagnóstico del hirsutismo es clínico y

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

bioquímico; se mide la severidad del caso (según textura y grosor del vello) y los niveles de andrógenos.

El incremento de la respuesta a los andrógenos puede observarse no solo en el bulbo piloso: Con un aumento de la cantidad de vello, sino con u aumento en la producción de sebo por la piel. Esta masculinización también puede traer consigo la ausencia de la menstruación, el aumento de masa muscular, agravamiento de la voz, acné, alopecia y/o aumento anormal del clítoris. Esto se conoce con el nombre de virilismo.



B. La entrevista.

Cuando una persona llega con esta patología, es importante realizarle una serie de pregunta:

- Cada cuánto se depila, es importante verla cuando pasaron por lo menos 15 días sin que se depile.
- Es imprescindible preguntar: Velocidad de progresión, si se encuentra solo o con otros signos de vitrificación, etc.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- El momento de la aparición: Si se dio de forma precoz, si sufre seborrea, acné, irregularidad menstrual, etc.

C. El tratamiento.

El tratamiento de hirsutismo es sintomático y estético. Aunque sea exclusivo del vello, el tratamiento es hormonal. La primera línea de tratamiento es el uso de anticonceptivos ya que éste, a través de los estrógenos, aumenta la proteína que transporta la testosterona, haciendo que se una a la proteína y disminuyendo su disponibilidad en la piel para generar vello.

Quienes realicen el tratamiento deben tener en cuenta que el ciclo de vida del vello es largo (entre seis y doce meses), por lo que se debe tener paciencia para ver una respuesta. Los anticonceptivos suelen tener una buena respuesta, pero no total. En complemento pueden utilizarse antiandrógenos: Medicamentos que se utilizan para otras enfermedades, pero cuyo mecanismo altera la vía de los andrógenos. Por otro lado, la depilación definitiva también colabora con el tratamiento de hirsutismo. El uso de cada uno dependerá del caso.

El tratamiento es de control, es decir, no elimina el hirsutismo. Se tratan los síntomas que van apareciendo en la mujer; es por eso por lo que es un tratamiento sintomático: Controla, pero no cura.

5.3. HIPERTRICOSIS

La hipertricosis, o síndrome del hombre lobo, es una enfermedad muy poco frecuente, que es destacada por la existencia de un exceso de vello. Las personas que la padecen están cubiertas completamente, incluso en las palmas de las manos y de los pies, por un vello lanugo largo, que puede llegar hasta los 25 centímetros.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Tipos de hipertricosis:



- **Lanuginosa:** El cabello, muy fino y sedoso, crece de manera uniforme en todo el cuerpo, excepto en las palmas y plantas de los pies. Lo más frecuente es que se adquiera por vía genética, aunque también puede presentarse después del nacimiento. En algunos casos con el tiempo se reduce la cantidad de pelo, aunque nunca llega a desaparecer.

- **Congénita:** También conocida como el síndrome del hombre lobo, es congénita y está ligada al cromosoma X. En este caso el pelo es grueso, especialmente en la cara.

- **Lumbosacral:** Recibe el nombre de cola de fauno, ya que el pelo crece exclusivamente en la zona lumbosacra. También se nace con ella.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Irritativa:** Se adquiere como consecuencia de un trabajo frecuente y repetitivo al que se somete una parte determinada del cuerpo (pasar mucho tiempo de rodillas, etc.).

- **Nevus:** La hipertricosis puede estar asociada a la presencia de un nevus, en cuyo caso suele ser indicativo de que probablemente éste no se transformará en un melanoma.



El único tratamiento posible para la hipertricosis es el afeitado o la depilación, aunque ello implica que el pelo volverá a crecer. No obstante, para que no crezca de nuevo, se puede recurrir a técnicas de depilación por láser (depilación permanente).

La hipertricosis no presenta alteraciones hormonales, no es un andrógeno dependiente y la localización del vello es difusa, mientras que el hirsutismo es un andrógeno dependiente, está asociado con la seborrea, el acné, la alopecia, etc., tiene alteraciones en las hormonas sexuales y la calidad y cantidad del vello aumenta.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Para que el vello se extienda por otras zonas la cantidad del mismo debe ser abundante, además de manifestarse en la cara, el tórax, la parte inferior del abdomen, la espalda, glúteos, muslos, axilas, cuello y senos.

Para determinar la presencia de dichas patologías se deberán medir los niveles hormonales mediante la testosterona libre o total, el DHEA-S (sulfato de dehidroepiandrosterona) y las hormonas folículo, estimulantes (FSH) y luteinizantes (LH).

¿Cuál es la solución para liberarse del exceso de vello?

Tras un diagnóstico de hipertricosis o hirsutismo se pueden llevar a cabo tratamientos depilatorios como el rasuramiento, cremas depilatorias, depilación con cera, láser o IPL; o los decolorantes de vello.

Si presenta exceso de andrógenos es necesario realizarse un tratamiento como los anticonceptivos orales, medicamentos antiandrógenos u otros medicamentos, además se recomienda:

- Comer alimentos con antioxidantes.
- Evitar los alimentos refinados.
- Comer menos carnes rojas.
- Aumentar el consumo de pescado.
- Utilizar aceites saludables de oliva o vegetal.
- Evitar el alcohol y el tabaco.
- Beber mucha agua.


Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Hacer mínimo 30 minutos de ejercicio diario.

5.4. MÉTODOS DE DEPILACIÓN Y EPILACIÓN

Las técnicas de depilación y epilación son muy diferentes, depilación, consiste en el procedimiento mediante el cual se elimina el vello de la piel de manera superficial, es decir, se corta el pelo en la base sin eliminar su raíz y con la epilación, nos deshacemos del vello de la superficie corporal eliminando la raíz del mismo.

Aunque utilicemos la palabra depilación para referirnos a ambas prácticas, como podemos ver, no son lo mismo.



Métodos de Depilación

Crema Depilatoria

Las cremas depilatorias provocan la rotura de la estructura de la queratina presente en el vello, convirtiendo este en miles de pequeñas partículas que eliminaremos arrastrándolas junto con la crema depilatoria, normalmente mediante el uso de una espátula de plástico o simplemente con agua.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Aunque muchas de ellas están fabricadas con químicos que se encargan de la destrucción del vello, cada vez son más las cremas depilatorias que están elaboradas a base de componentes naturales y que resultan igual de efectivas.

Las grandes ventajas de este método de depilación son varias: Es completamente indoloro, sencillo y rápido de llevar a cabo en nuestra propia casa. Además, se trata de uno de los métodos de depilación más económicos del mercado.



Los inconvenientes son que la duración del mismo es bastante corta, ya que no actúa sobre el folículo piloso, y que debemos ser cuidadosos con el tiempo que dejamos actuar la crema, ya que, si excedemos el tiempo recomendado por el fabricante, pueden aparecer irritaciones o quemazones en la piel.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Es importante hidratar muy bien la zona después de someternos a este tipo de depilación, sobre todo si la fórmula de la crema incluye componentes químicos que puedan resecar la piel en exceso.

Maquinilla de Afeitar

El uso de la maquinilla de afeitar nos permitirá despedirnos del vello cortando el mismo en el punto en el que asoma a nuestra piel.

Es recomendable que utilicemos espuma especial para depilación si nos decantamos por este método de eliminación del vello, ya que de este modo minimizaremos el riesgo de aparición de los famosos “pelitos encarnados”, algo tan molesto cuando nos depilamos con cuchilla.

Se trata, sin duda, del método de depilación más fácil y rápido de realizar. Sin embargo, como desventajas tiene el breve período de tiempo en el que se permanece sin vello, por lo que depilarse con cuchilla puede convertirse en algo tedioso al tener que repetir la depilación cada dos días aproximadamente, y que, al pasar la cuchilla sobre la piel para eliminar el vello, también estamos causando un pequeño daño en la capa superficial de la misma que hace que a la larga se deteriore.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Esponja Depilatoria

La eliminación del vello mediante el uso de esponjas depilatorias se produce mediante fricción. Estas están formadas por microcristales de silicio que, al contacto con la piel por medio de movimientos circulares y repetitivos, lo rasuran.

La gran virtud de este tipo de depilación es que no generan ningún residuo, como la crema depilatoria o la cuchilla, si utilizamos esta última junto con espuma de depilar, ya que bastaría con pasarla sobre la piel húmeda para deshacernos del vello superficial.

Al igual que ocurre con los métodos de depilación anteriores, al cortar el pelo, pero no actuar sobre la raíz del mismo, la duración de una piel libre de vello será escasa.



Métodos de Epilación

Pinzas de Depilar

Este método de depilación es muy efectivo para pequeñas zonas como las cejas, pero no resulta práctico para zonas más extensas como axilas, pubis o piernas, ya que

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

supondría un proceso eterno y doloroso al tener que arrancar de raíz, y uno por uno, la cantidad de vello propia de estas zonas.

Es un buen método para la eliminación del vello de las cejas ya que permite ir viendo los resultados que vamos obteniendo en la forma de la ceja poco a poco, además de ser una técnica cuyos resultados perduran en el tiempo al haber eliminado el vello de raíz.



Epilación con Hilo



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Con el uso de un hilo de algodón o seda agarrado con ambas manos en forma de lazo (de forma que quede enroscado en la parte central) y que se hace girar sobre la piel, se agarra el vello de la zona y se extrae de raíz.

Su principal ventaja es que consigue eliminar hasta los pelos más finos y pequeños, como los del labio superior, o aquellos que aún no ha terminado de crecer por completo.

No obstante, es un método que puede resultar doloroso, sobre todo si no se está habituado a este tipo de depilación.

Un inconveniente frente a la epilación con pinzas es que este método requiere de ir a un centro de estética especializado en esta práctica, por lo que su supondrá un desembolso económico periódico.

Máquina de Epilación

Se trata de dispositivos eléctricos con cabezales rotatorios que, mediante su unión, logran arrancar el vello de raíz.

Su mayor pro es que, a pesar de suponer un desembolso inicial más o menos considerable, resulta uno de los métodos de epilación más económicos a largo plazo. También debemos tener en cuenta la comodidad que supone poder eliminar el vello en tu propia casa sin tener que desplazarte hasta un centro de estética.

Además, este tipo de dispositivos ha mejorado sobremanera en los últimos años, y hoy día se pueden encontrar en el mercado máquinas de epilación que incluyen cabezales para zonas específicas como las ingles, apliques con cepillos exfoliantes, o incluso que proporcionan frío para adormecer la zona.

Lo malo de este tipo de epilación es que puede llegar a resultar doloroso si se lleva a cabo en zonas sensibles como las ingles, el pubis o las axilas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Cera caliente

La cera caliente es una resina que, al derretirse, consigue atrapar el vello de nuestra piel. Después, al enfriarse y secarse sobre la piel, mediante un tirón seco, se consigue arrancar el vello que ha quedado sujeto en el producto.

La eficacia de este método se ve duplicada, ya que el calor de la cera favorece la apertura de los poros de nuestra piel, facilitando la eliminación del vello.

Como inconvenientes contamos con el hecho de tener que acudir a un centro de estética para someternos a este tipo de epilación. También, puede que a ciertas personas les resulte molesta la sensación de la cera caliente sobre la piel, o aguantar el tirón que este método conlleva.

Otro de los motivos por los que muchas personas descartan esta clase de epilación, es la aparición de pelos enquistados. Para impedir que esto ocurra, o que pase lo menos posible, lo ideal es exfoliar la piel el día antes de la eliminación del vello con cera.



Cera fría

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Su composición es muy similar a la de la cera caliente, salvo que esta se encuentra impregnada en bandas de papel especial, que se calientan por fricción al frotar las bandas con nuestras manos.

Es un método cómodo de utilizar, ya que lo podemos realizar en nuestra propia casa debido a que no requiere de formación alguna para llevarse a cabo, ni corremos el riesgo de quemarnos como podría ocurrir si decidiésemos depilarnos en casa con cera caliente. El mayor hándicap de este método es que esta clase de cera resulta menos eficaz que la cera caliente al tener menos agarre, y resulta complicado eliminar los pelitos más cortos.

Cera tibia

Es un tipo de epilación a caballo entre la cera fría y la caliente. En este caso, la cera se aplica por medio de un roll on en la zona en la que queramos deshacernos del vello, que quedará atrapado por esta y que eliminaremos con una banda depilatoria a la que se adherirá la cera al frotar la misma sobre la zona.

Es la opción perfecta para las personas sensibles al calor de la cera caliente. Además, resulta más efectiva que la cera fría.

Aunque suele llevarse a cabo en centros de estética, también se venden las máquinas que se utilizan para calentar los cartuchos de cera, los recambios y las bandas, por lo que, si lo deseamos, podemos realizar en casa esta clase de epilación.

Epilación Láser

Este es uno de los procesos de epilación que cuenta con mayor número de adeptos en la actualidad al tratarse de un método cuyos resultados son prácticamente definitivos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Consiste en la aplicación de luz coherente monocromática sobre la piel, lo que consigue erradicar el vello de la zona al eliminar el folículo piloso.

Los mayores inconvenientes que presenta este tratamiento son su elevado precio y el tiempo que se tarda en finalizar el mismo, ya que se necesita un número determinado de sesiones (que variará en función de la persona y la zona en que se realice) para que sea efectivo. Además, entre una sesión y otra debe dejarse pasar un mínimo de un mes, lo que provocará que el tratamiento se alargue en el tiempo.

Es preferible evitar el verano para someterse a este método de epilación, ya durante los días posteriores a cada sesión, es recomendable evitar el sol en la zona.

Epilación con Luz Pulsada (IPL)

Hablamos de un método muy similar al anterior, pero en el que varía el tipo de luz, que en este caso se trata de luz pulsada de banda ancha.

Al igual que ocurre con la epilación láser, la luz emitida llega a través del pelo hasta el folículo piloso, causando en éste daños que paralizan el crecimiento del vello de nuevo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 5

Hirsutismo, hipertricosis y depilación

