

Let  $S = \{a, b, c, d, e, f\}$  be a sample space for an experiment and let  $E = \{a, b, c\}$ ,  $F = \{c, d, e\}$ , and  $G = \{a, b, f\}$ . If the probability of  $G$  is 0.62 and the probability of  $E \cup F$  is 0.78, then what is the probability of  $GE^c$  ?

- (a) 0.22
- (b) 0.78
- (c) 0.43
- (d) 0.57
- (e) 0.4
- (f) 0.6
- (g) 0.97
- (h) 0.5
- (i) 1
- (j) 0
- (k) None of these

Let  $S = \{a, b, c, d, e, f\}$  be a sample space for an experiment and let  $E = \{a, b, c\}$ ,  $F = \{c, d, e\}$ , and  $G = \{a, b, f\}$ . If the probability of  $G$  is 0.63 and the probability of  $E \cup F$  is 0.77, then what is the probability of  $GE^c$  ?

- (a) 0.23
- (b) 0.77
- (c) 0.44
- (d) 0.56
- (e) 0.4
- (f) 0.6
- (g) 0.96
- (h) 0.5
- (i) 1
- (j) 0
- (k) None of these

Let  $S = \{a, b, c, d, e, f\}$  be a sample space for an experiment and let  $E = \{a, b, c\}$ ,  $F = \{c, d, e\}$ , and  $G = \{a, b, f\}$ . If the probability of  $G$  is 0.6 and the probability of  $E \cup F$  is 0.82, then what is the probability of  $GE^c$  ?

- (a) 0.18
- (b) 0.82
- (c) 0.45
- (d) 0.55
- (e) 0.42
- (f) 0.58
- (g) 0.97
- (h) 0.5
- (i) 1
- (j) 0
- (k) None of these

Let  $S = \{a, b, c, d, e, f\}$  be a sample space for an experiment and let  $E = \{a, b, c\}$ ,  $F = \{c, d, e\}$ , and  $G = \{a, b, f\}$ . If the probability of  $G$  is 0.61 and the probability of  $E \cup F$  is 0.81, then what is the probability of  $GE^c$  ?

- (a) 0.19
- (b) 0.81
- (c) 0.49
- (d) 0.51
- (e) 0.42
- (f) 0.58
- (g) 0.93
- (h) 0.5
- (i) 1
- (j) 0
- (k) None of these

**Solution:**  $P(GE^c) = P(\{f\}) = P((E \cup F)^c) = 1 - P(E \cup F)$ .