

- ◆ **Manutenção** – entre 4 e 6 gotas por dia para as pessoas mais velhas (com mais de 60 anos). Para as mais jovens, 4 gotas duas vezes por semana.
- ◆ **Malária** – para a malária, administre uma dose de 15 gotas; aguarde uma hora e administre outra dose de 15 gotas. Depois utilize doses de 6 gotas de hora em hora até o paciente recuperar.
- ◆ **Prevenção da malária e do cancro** – utilize quatro gotas por dia durante toda a vida.
- ◆ **Mal-estar ligeiro** – utilize 4 gotas, 4 vezes por dia.
- ◆ **Sinusite e problemas do nariz:**
 1. prepare uma dose de 4 gotas em meia copo de água. Deitado de costas, aplique várias gotas em cada narina com algumas horas de intervalo até o incómodo passar.
 2. Em alternativa, utilize um litro de água com 32 gotas de MMS ativado. Pouse a cabeça de lado sobre o lavatório e, recorrendo a um saco de água quente, utilize a mangueira para dirigir a água para a narina que estiver por cima e deixe-a fluir e ser expelida pela narina que estiver por baixo. Depois, pouse a cabeça sobre o lado contrário e repita este procedimento. Poderá fazer isto 4 ou 5 vezes por dia até a congestão dos seios perinasais tiver passado.
- ◆ **Pequenas indisposições** – utilize 6 gotas, duas vezes por dia.
- ◆ **Úlceras e erupções cutâneas** – utilize 20 gotas de MMS ativado e acrescente um litro de água. (Ou seja, 10 gotas de MMS ativado por 30 ml de água – a mesma potência que é utilizada em todos os pulverizadores corporais.) Pulverize sobre a região afetada ou aplique-a com os dedos. Repita 4 vezes por dia ou de hora em hora, se necessário. Siga também o [Protocolo 1000](#).

- ◆ **Dores de garganta** – gargareje com uma dose de 6 gotas diluída em meio copo de água a cada duas horas. Tome doses de 3 gotas de hora em hora até os sintomas passarem. (Protocolo 1000)
- ◆ **Feridas do couro cabeludo** – utilize uma dose de 10 gotas e 2 colheres de sopa de água (10 gotas ativadas por 30 ml de água, ou seja, a mesma potência que é utilizada em todos os pulverizadores corporais). Pulverize ou aplique-a com os dedos sobre as feridas 4 vezes por dia.
- ◆ **Infeção por estafilococos (SARM - *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina)** – use 5 ou 6 gotas e ative num recipiente suficientemente grande para conter toda a área infetada. Não utilize água, só os gases, mas nunca durante mais de 5 minutos. Dez minutos de exposição provocam queimaduras graves. Posicione o corpo de modo a que o líquido não verta – segure no recipiente na parte inferior ou lateral do corpo. A infeção por estafilococos deve ser eliminada após um ou dois tratamentos. (Se utilizar um recipiente de vidro transparente, será capaz de ver os estafilococos infecciosos a serem destruídos.)
- ◆ **Dores de dentes e afeções da boca** – prepare uma dose de 10 gotas em meio copo de água. Escove os dentes e as gengivas de hora em hora até que a dor de dentes tenha desaparecido e depois duas vezes por dia até que a boca e as gengivas se apresentem completamente saudáveis.
- ◆ **Tratamento completo da boca** – o vapor de MMS (dióxido de cloro) é o mais eficiente de todos os tratamentos com MMS. Utilize um copo de shot ou outro recipiente de vidro suficientemente pequeno para poder ser inserido dentro da boca, para que possa colocá-la à volta do copo. Utilize 3 a 6 gotas de MMS ativado com 50% de ácido cítrico. Após esperar 20 segundos, coloque a boca à volta do recipiente, de modo a que os vapores de MMS entrem dentro da boca. Não inspire o vapor; permita apenas que ele entre dentro da boca. O tratamento poderá durar

entre 2 a 5 minutos. Para aceder a informações mais detalhadas, por favor consulte o [Capítulo 13 – Protocolos de MMS](#).

- ◆ [Outras doenças e distúrbios de ordem física](#) – é claro que neste livro não é possível abordar todas as doenças e distúrbios físicos mas por favor utilize os problemas referidos neste guia de consulta como ponto de referência para tratar o seu caso específico. Siga também as outras instruções referidas neste livro.
