

**Por norma, não inicie o tratamento com o [Protocolo 3000](#)**, embora este seja aconselhável para um tratamento ligeiro com MMS.

Poderá também acrescentar as seguintes medidas:

- ♦ **Duche vaginal:** use dois copos de água, ou um litro, com 8 gotas por copo (1 gota por cada 30 ml, ativado como de costume).
- ♦ **Spray para a pele:** utilize 10 gotas por 30 ml (40 gotas para meio copo de água). Pulverize quaisquer problemas de pele de hora em hora, enquanto também toma MMS oralmente.

**Nunca** avance para o protocolo seguinte se o paciente estiver a melhorar.

## AVISO

**Não se esqueça: sempre que o paciente pareça piorar ou reagir ao MMS com diarreia, vômitos, náusea ou fadiga extrema, reduza a dose ou então suspenda o tratamento até a reação desaparecer. Depois recomece o tratamento com uma dose mais pequena. Nunca considere que não faz mal continuar a administrar o MMS quando a pessoa se sente pior. Pare e espere até que ela regresse ao estado em que estava quando iniciou o tratamento e recomece o tratamento com MMS nesse ponto.**

## Algumas Situações Comuns

- ♦ **Asma, problemas cardíacos, diabetes, epilepsia** – Protocolo 1000
- ♦ **Problemas graves** – [Protocolo 1000](#)
- ♦ **Cancro** – Protocolo 2000, que consiste em tomar MMS1 todas as horas, 10 horas por dia. Cada dose deve levar o máximo de gotas por hora que for capaz de suportar sem sentir náusea, diarreia ou fadiga extrema. Simultaneamente, tome MMS2 a cada 2 horas até se sentir bem. Consulte o [Protocolo 2000](#) no Capítulo 13. Em casos em que o cancro está numa fase particularmente crítica, acrescente o Protocolo 3000.