

Leszállók és felszállók is voltak

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon egy vonat kalauza minden állomáson feljegyezte, hogy hányan szálltak fel a vonatra, illetve hányan szálltak le. (Budapesten biztos nincs leszálló, Székesfehérváron biztos nincs felszálló, aki leszállt, az nem száll vissza.)

Készíts programot, amely megadja azon állomások számát, ahol voltak leszállók és felszállók is!

Bemenet

A standard bemenet első sorában az állomások száma van ($1 \leq \text{állomásszám} \leq 1000$). A következő N sorban az egyes állomásokon leszállók ($0 \leq \text{leszállók} \leq 800$) és felszállók ($0 \leq \text{felszállók} \leq 800$) száma van, egy szóközzel elválasztva.

Kimenet

A standard kimenet első sorába egyetlen egész számot kell írni, azon állomások számát, ahol voltak leszállók és felszállók is!

Példa

Bemenet	Kimenet
6	2
0 15	
10 30	
0 32	
48 0	
19 26	
26 0	

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemenet hossza ≤ 500 , a leszállók és felszállók száma ≤ 400 .