

1

Convert the following loop to a form where the loop indexes are each incremented by 1:


```
for(i=50;i>=10;i=i-7)
    X[i,i+1]=0;
```


```
for(i=0;i<=5;i=i+1)
    X[i*7+15,i*7+16]=0;
```

2

```
a) for (i=1; i<30; i++)  
    for (j=i+2; j<40-i; j++)  
        X[i,j]=0;  
  
b) for (i=10; i<=1000;i++)  
    for (j=i; j<i+10; j++)  
        X[i,j]=0;  
  
c) for (i=1; i<100; i++)  
    for (j=0; j<100+i; j++)  
        for (k=i+j; k<100-i-j; k++)  
            X[i,j,k]=0;
```

1. Draw the iteration spaces for (a) and (b).





2. Write the constraints in matrix form (i.e., give the values of the vectors  $i$  and  $b$  and the matrix  $B$ .)

a.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -29 \\ -2 \\ 39 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 \\ 1000 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 99 \\ 0 \\ 99 \\ 0 \\ 99 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Use the Fourier-Motzkin elimination algorithm to eliminate  $i$  from each of the sets of constraints obtained in the exercise (2).

a.

$$L_i = 1$$

$$U_i = 29$$

$$L_j = i + 2, 3$$

$$U_j = 39 - i, 38$$

b.

$$L_i = 10$$

$$U_i = 1000$$

$$L_j = i, 10$$

$$U_j = i + 9, 1009$$

c.

$$L_i = 1$$

$$U_i = 99$$

$$L_j = 0$$

$$U_j = 99 + i, 198$$

$$L_k = i + j, 1$$

$$U_k = 99 - i - j, 98$$

4. For each of the three loop nests, rewrite the code so the axis  $i$  is replaced by the major diagonal, i.e., use loop index variable  $m = j - i$ . The new axis should correspond to the outermost loop.

Transform constants using  $m = j - i$ ,  $j = m + i$ ,  $i = j - m$ .

a.

$$i \geq 1$$

$$i \leq 29$$

$$j \geq 3$$

$$j \leq 38$$

Transform constants:

$$m \geq j - 29$$

$$m \leq j - 1$$

$$j \geq 3$$

$$j \leq 38$$

```
for (j=3; j<=38;j++)  
  for (m=j-29; m<j-1; m++)  
    X[j-m,j]=0;
```

b.

$$i \geq 10$$

$$i \leq 1000$$

$$j \geq i$$

$$j \leq i + 9$$

Transform constants:

$$j - m \geq 9$$

$$j - m \leq 1000$$

$$j \geq j - m$$

$$j \leq j - m + 9$$

Which can be simplified to:

$$j \geq 9 + m$$

$$j \leq 1000 + m$$
$$m \geq 0$$
$$m \leq 10$$

```
for (m=0; m<=9;m++)  
  for (j=9+m; j<1000+m; j++)  
    X[j-m,j]=0;
```

c.

$$i \geq 1$$
$$i \leq 99$$
$$j \geq 0$$
$$j \leq 100 + i$$
$$k \geq i + j$$
$$k \leq 100 - i - j$$

Transform constants:

$$j - m \geq 1$$
$$j - m \leq 99$$
$$j \geq 0$$
$$j \leq 100 + j - m$$
$$k \geq i + j$$
$$k \leq 100 - j + m - j$$

Which can be simplified to:

$$j - m \geq 1$$
$$j - m \leq 99$$
$$j \geq 0$$
$$j \leq 100 + j - m$$
$$k \geq i + j$$
$$k \leq 100 - 2j + m$$



```
for (i=1; i<100; i++)  
    for (j=0; j<100+i; j++)  
        for (k=i+j; k<100-i-j; k++)  
            X[i,j,k]=0;
```