



아동학대 (Child Maltreatment= Child abuse & Neglect)							
정의	보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나, 정상적인 발달을 저지하는 모든 행위						
역학	- 2020년) 아동학대 의심 사례 매일 107건, 하지만 빙산의 일각 (해외의 1/10, 발견 신고 되지 않은 것!) - 2014년 아동학대에 대한 특례법 제정 이후 신고 크게 증가 신고는 가파르게 증가하고 있다! (= 신고율이 떨어짐) - 대부분 가족 내에서 발생 , 대부분 부모 (부>모) → 주위에서 관심을 갖지 않으면 발견 어려움 m/c : 중복학대 유형별 비율: 정서 학대 (40%) > 신체 학대 (37%) > 방임 (20%) > 성학대 (3%)						
유형	① 신체학대: 아동을 손이나 도구로 때리거나 가혹행위를 시켜 신체에 손상을 입히는 행위 ② 정서학대: 언어적 폭력과 모욕, 정서적 위협, 감금 등 아동의 정신건강발달에 해를 끼치는 행위 ③ 성학대: 성인이 자신의 성적 충족을 목적으로 아동에게 하는 모든 성적 행위 ④ 방임: 아동을 비위생적인 환경에 노출 교육, 의료 등 아동에게 필요한 것들을 주지 않고 방치하는 행위 • 신체적/의료적 방임, 정서적 방임, 교육 방임, 유기 (부모로서 당연히 제공해야 할 신체, 의료적 X)						
신고	아동학대 신고는 112, 신고자의 신원보호 ok [JB] 익명으로도 신고 가능하다 (가명조서) - 의료인의 신고 의무 : 직무를 수행하며 아동학대 확실, 의심 되면 아동보호 전문기관, 수사기관 신고 • 아동학대범죄 처벌에 관한 특례법 제 10조: 정당한 사유없이 신고하지 않으면 과태료 1000만원 • 우리나라 현실: 의료인 신고 비율이 굉장히 낮음 (전체 신고자의 0.9%) 그런데 의료인의 신고 비율은 적다ㅠㅠ - 신고자 보호: 수사/재판 신고자 인적 사항 생략(가명), 신고자 신변안전조치 신고의무자에 의한 신고비율 28.2% - 신고자 중 의료인/의료기사 0.9%						
아보전	- 아동보호 전문기관 [JB] 2001년 10월 설립 피해자 보호/ 가해자 조치/ 심리,상담: 원가정으로 회복할 수 있도록 - 기존: 아동학대 판정, 아동학대 피해자 보호, 가해자에 대한 조치 취하는 법적 기관 (경찰이랑 같이 출동은) - 정인이 사건 후 개정 (조사-보호 이원화): 신고 후 조사 [공무원/경찰] ↔ 보호 [아보전] 담당공무원						
특례법 (2014년)	- 아동학대치사죄 및 중상해 죄 신설: 최고 무기징역 [20.10] 과실치사가 아니라 살인죄, 살해죄가 적용됨 - 담당 검사: 가해자를 대상으로 친권 제한 요청 가능 (담당 검사가 분리시킬 수!) - 신고 접수 사법경찰관리: 지체 없이 현장 출동 [20.10] 이전부터 과태료 법은 있었으나, 부과된 적 X - 정당한 사유 없이 신고하지 않으면 과태료 500만원 → (2021년) 1000만원으로 상향 500만원 ▶ 1000만원						
처벌법 개정안: 신고자 가명 + 공익신고자 신변 보호 아동학대 선별도구 Checklist							
FIND ★★	Finding instrument for non-accidental deeds - 모든 소아 외상환자에서 아동학대를 감별 - 아래 항목 중 2가지 이상 시 신고 권고, 1개여도 아동학대 의심되면... <div><div>7. 연령에 비해 너무 작음 : 질환 먼저 의심 (내과, 소아과적) 8. 다쳤는데 관심 X, 부모 오면 아이 경직</div><table><tr><th>병력</th><th>신체검사</th><th>인상</th></tr><tr><td>1. 의료기관 방문 지연 2. 보호자, 환자의 진술 변함/다름 3. 연령, 발달단계 불가능한 손상</td><td>4. 병력과 신체검사 소견 불일치 5. 신체검사에서 학대 의심 소견 6. 2세 미만 머리손상, 장골 골절</td><td>7. 환자 의복,청결,영양 불량 8. 환자-보호자 관계 부적절</td></tr></table></div>	병력	신체검사	인상	1. 의료기관 방문 지연 2. 보호자, 환자의 진술 변함/다름 3. 연령, 발달단계 불가능한 손상	4. 병력과 신체검사 소견 불일치 5. 신체검사에서 학대 의심 소견 6. 2세 미만 머리손상, 장골 골절	7. 환자 의복,청결,영양 불량 8. 환자-보호자 관계 부적절
병력	신체검사	인상					
1. 의료기관 방문 지연 2. 보호자, 환자의 진술 변함/다름 3. 연령, 발달단계 불가능한 손상	4. 병력과 신체검사 소견 불일치 5. 신체검사에서 학대 의심 소견 6. 2세 미만 머리손상, 장골 골절	7. 환자 의복,청결,영양 불량 8. 환자-보호자 관계 부적절					
신체검사에서 학대 의심 소견							
특정한 명, 상처	<div><div>바늘로 찌른 모양</div><div>줄 모양</div><div>줄이나 채찍 모양</div><div>Bite mark: 이빨 자국</div><div>줄로 묶을 조른 자국</div><div>특정모양의 도구</div></div>						
★ 명이 생기는 위치, 나이	★★ Bruise, TEN-4 (위치 & 나이): 4살 미만에서 TEN 부위의 명 or 4개월 미만 ANY 명 • 위치: Torso (몸통; 팔다리 제외한 몸통), Ear (귀), Neck (목), 4 (4살/4개월) • 4개월 미만: 뒤집기도 안되는 아이에서 명 → 아동 학대 의심 • 병력, 색깔, 숫자가 중요한 것이 아님 아가들은 키를때 텐텐먹음 근데 죽음-4 -> 아동학대						
Sentinel Injury 파수 손상	- 정의: 경미하지만 이상한 명과 상처 → 신체 학대의 초기 징후 (warning sign) - 의심소견: 9개월 미만, 발생 원인 불명한 , 육안으로 관찰되는 경미한 손상 (명>입안 손상>기타) - 학대로 확인된 아이들 27.5%에서 파수손상 과거력 0 [20.11] 보호자가 손상기전 설명 못함 (ex) 8개월, 허벅지 안쪽 부분의 명, 흉골 부위의 명 (cf) 정상적인 경미한 명 : 움직일 수(9개월 ↑), 주로 돌출부(이마, 무릎/정강이), 일정한 모양 없음						

=> **기어다니지 못하는** 아이에게 생기는 경미한 상처 => 신체 학대의 초기 징후

<p>Immersion burn 침수 화상</p>	<p>아이를 뜨거운 물에 담겨 발생한, 고의적인 화상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장갑 & 양말: 어떤 선 밑으로 다 화상을 입음 - 도넛 모양 화상: 엉덩이가 바닥에 닿아, 엉덩이만 멀쩡 <p>(cf) 열탕 화상: 화살표(쏟으면 위쪽 넓음), 위성병변(물 틈)</p>	 <p>침수화상 발생부위 Glove and stocking pattern "Donut-shaped" burn</p>
<p>#6. 2세 미만의 머리손상, 장골 골절</p>	<p>1) 매우 드물거나 불가능한 골절: 다발성 두개골 골절, 다발성 늑골 골절@ Shaken baby syn</p> <p>2) 골절의 형태: 팔다리의 나선형 골절, metaphyseal corner fracture 골간단 모서리 골절</p> <p>3) 오래된 골절 + 보호자가 언제 다쳤는지 모름: 골절 부위 callus(가골) 형성</p> <p>4) 골절이 드문 부위의 골절: scapula 날개뼈 (특히 잘 걸지 못하는 아이)</p>	
<p>학대 의심 골절</p>	<p>다발성 늑골 골절 특히 posteromedial rib 부러짐 (원래 소아 rib 부드러운데)</p> <p>나선형 골절: 비틀어서</p>   <p>아이를 잡고 흔들어서 발생</p> 	
<p>metaphyseal corner Fx = bucket handle : 아동학대의 아주 특징적 소견 !!</p>	<p>골간단 모서리 골절 metaphyseal corner fracture: 약한 metaphysis가 반복적 충격에 부서짐</p> <p>bucket handle fracture</p> <p>양쪽에 생기면 이렇게 bucket</p>  <p>Metaphysis쪽에 뺏가루가 부슬부슬한 소견</p>  	
<p>epi-dura나 dura밖->dura는 딱딱해서 CT상 블록</p> <p>SDH 경막하 출혈</p>	<p>- Abusive head trauma = shaken baby syndrome 흔들린 아이 증후군</p> <p>- Dura, 막 사이 약한 정맥: 말랑말랑하여 반복적인 충격이나 흔들림에 의해 터짐</p> <p>- cf. EDH 경막 외 출혈: 단단한 동맥, 한번의 큰 충격으로 터짐 (때리면)</p> <p>★특히 양측 + multistage SDH: 검은 부위(old chronic) & 흰 부위(acute)</p> <p>16] 병력과 신체검사 소견 불일치; 넘어졌다고 했는데 SDH</p>	
<p>Shaken baby syn</p> <p>1) SDH: dura, 막 사이 bridging v</p> <p>2) multiple rib Fx: posteromedial</p> <p>3) 망막 출혈</p>	<p>multiple layer에 생긴 multiple hemorrhage</p> <p>Retinal a. 출혈, 흔들린 아이 증후군 의심</p>	<p>cf) EDH: 외력에 의해 부딪히면 skull Fx가 생겨 안쪽 dura에 영양을 공급하는 middle meningeal a가 rupture</p>
<p>Retinal hemorrhage 망막 출혈</p>	 	