

Határozatlan integrál

A parciális törtekre bontás módszere



A gyakorlat célja

Ennek a gyakorlatnak az elsődleges célja, hogy a parciális törtekre bontás tételének segítségével úgynevezett racionális törtfüggvényeknek is meg tudjuk határozni a primitív függvényeit. Ezt követően trigonometrikus, illetve exponenciális függvények racionális kifejezéseinek integrálására tanulunk majd néhány módszert.



Felhasznált elméleti anyag

A feladatok megoldásához szükséges elméleti állítások:

1. Racionális törtfüggvények integrálása ([Kalkulus előadásjegyzet](#) 9.4.1 fejezetete)
2. A parciális törtekre bontás módszere
3. Trigonometrikus, illetve exponenciális függvények racionális kifejezéseinek integrálása ([Kalkulus előadásjegyzet](#) 9.4.2 fejezetete)



További tudnivalók

Az alábbiakban a feladatlapon található legfontosabb példák részletes megoldása található. A meg nem oldott feladatok házi feladatnak tekintendők. Az egyes feladatoknál található útmutatók hasznos információkat, módszereket tartalmaznak. Kérlek benneteket, hogy azokat is olvassátok el figyelmesen.



Korábbi előismeretek

1. [Polinomok, maradékos osztás a \$\mathbb{R}\[x\]\$ polinomgyűrűben \(polinomosztás\)](#) (ezekről Diszkrét matematikából volt szó)
2. [Teljes négyzetté kiegészítés](#)



Racionális törtfüggvények és a parciális törtekre bontás módszere

1. Definíció. Azt mondjuk, hogy az f valós függvény **racionális törtfüggvény**, ha léteznek olyan P és Q valós polinomok, hogy

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (x \in \mathbb{R}, Q(x) \neq 0)$$

teljesül.

1. Tétel. Legyen f egy racionális törtfüggvény. Ekkor az f függvénynek létezik F primitív függvénye, továbbá ez az F függvény elemi függvény.

A továbbiakban a Q polinom gyökeitől függően három különböző esetet kell megkülönböztetnünk.

Ha a Q polinomnak csak egyszeres multiplicitású, valós gyökei vannak

Ha

$$Q(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

akkor

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x - x_1) \cdots (x - x_n)} = \frac{A_1}{(x - x_1)} + \cdots + \frac{A_n}{x - x_n},$$

ahol az A_1, \dots, A_n együtthatók egyértelműen meg vannak határozva. Ezeket a konkrét feladatokban az együtthatók egyeztetésével lehet meghatározni.

Ha a Q polinomnak csak valós gyökei vannak, de a gyökök között vannak többszörös multiplicitásúak is

Ha a Q polinom

$$Q(x) = (x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_k)^{\alpha_k},$$

alakú, ahol $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$. Ebben az esetben

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{P(x)}{(x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_k)^{\alpha_k}} \\ &= \frac{A_{11}}{(x - x_1)} + \frac{A_{12}}{(x - x_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1\alpha_1}}{(x - x_1)^{\alpha_1}} \\ &\quad + \frac{A_{21}}{(x - x_2)} + \frac{A_{22}}{(x - x_2)^2} + \cdots + \frac{A_{2\alpha_2}}{(x - x_2)^{\alpha_2}} \\ &\quad + \cdots + \frac{A_{k1}}{(x - x_k)} + \frac{A_{k2}}{(x - x_k)^2} + \cdots + \frac{A_{k\alpha_k}}{(x - x_k)^{\alpha_k}}. \end{aligned}$$

Az előállításban szereplő $A_{i\alpha_i}$, $i = 1, \dots, k$ valós számokat ebben az esetben is az együtthatók egyeztetésével tudjuk meghatározni.

Ha a Q polinomnak van komplex gyöke is

Ekkor, ha például $z \in \mathbb{C}$ gyöke a Q polinomnak, akkor \bar{z} is gyöke Q -nak, vagyis a komplex gyökök a konjugáltjaikkal együtt lépnek fel. Ezen az eseten belül még további két esetet kell megkülönböztetnünk.

a) eset Ha a Q polinomnak **többszörös valós** és **egyszeres komplex** gyöktényezői vannak, azaz,

$$Q(x) = (x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_k)^{\alpha_k} (x^2 + b_1x + c_1) \cdots (x^2 + b_sx + c_s),$$

akkor

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^{\alpha_1} \frac{A_{1\alpha_1}}{(x - x_1)^i} + \cdots + \sum_{j=1}^{\alpha_r} \frac{A_{rj}}{(x - x_r)^j} + \sum_{k=1}^s \frac{B_kx + C_k}{x^2 + b_kx + c_k}.$$

b) eset Ha a Q polinomnak **többszörös valós** és **többszörös komplex** gyöktényezői vannak, azaz,

$$Q(x) = (x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_k)^{\alpha_k} (x^2 + b_1x + c_1)^{\beta_1} \cdots (x^2 + b_sx + c_s)^{\beta_s},$$

akkor

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^{\alpha_1} \frac{A_{1\alpha_1}}{(x-x_1)^i} + \dots + \sum_{j=1}^{\alpha_r} \frac{A_{rj}}{(x-x_r)^j} + \sum_{k=1}^{\beta_1} \frac{B_{1k}x + C_{1k}}{(x^2 + b_1x + c_1)^k} + \dots + \sum_{l=1}^{\beta_s} \frac{B_{sl}x + C_{sl}}{(x^2 + b_sx + c_s)^l}$$

Az $\int R(\sin(x), \cos(x))dx$ alakú integrálok

A sinus és cosinus függvények tetszőleges $R(\sin(x), \cos(x))$ racionális kifejezése esetén a

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = g^{-1}(x) \quad g(t) = 2\arctg(t)$$

helyettesítés mindig célravezető. Ezen helyettesítés elvégzése után ugyanis,

$$g'(t) = \frac{2}{1+t^2} \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{és} \quad \cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

amiből azt látjuk, hogy ezzel a helyettesítéssel az integrandus egy racionális törtfüggvénybe megy át.

Az $\int R(e^x)dx$ alakú integrálok

Abban az esetben, ha az integrandus az exponenciális függvény egy racionális törtfüggvénye, a

$$t = e^x = g^{-1}(x) \quad x = \ln(t) = g(t) \quad g'(t) = \frac{1}{t}$$

helyettesítéssel az integrandus t -nek racionális törtfüggvényébe megy át.

Az $\int R(x, \sqrt[n]{ax+b})dx$ alakú integrálok

Ha az integrandus x -nek és $\sqrt[n]{ax+b}$ -nek racionális törtfüggvénye, akkor az

$$t = \sqrt[n]{ax+b} \quad x = \frac{t^n - b}{a} = g(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{n}{a}t^{n-1}$$

helyettesítéssel az integrandus racionális törtfüggvénné alakítható.

1. Feladat. Legyenek A, α, β olyan valós számok, hogy $A, \alpha \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$ pedig legyen tetszőleges. Határozzuk meg az alábbi függvények primitív függvényeit.

(i)

$$\int \frac{A}{(\alpha x + \beta)^n} dx$$

Megoldás. Attól függően, hogy a feladatokban szereplő $n \in \mathbb{N}$ eggyel egyezik meg, illetve egytől különböző, két esetet kell megkülönböztetnünk.

ha $n = 1$, akkor vegyük észre, hogy az integrandus „majdnem” $\frac{f'}{f}$ alakú, ezért

$$\int \frac{A}{\alpha x + \beta} dx = \frac{A}{\alpha} \int \frac{\alpha}{\alpha x + \beta} dx = \frac{A}{\alpha} \ln(|\alpha x + \beta|) + C.$$

ha $n \neq 1$, akkor vegyük észre, hogy az integrandus „majdnem” $f^\alpha \cdot f'$ alakú, így

$$\int \frac{A}{(\alpha x + \beta)^n} dx = \int A \cdot (\alpha x + \beta)^{-n} dx = \frac{A}{\alpha} \int \alpha \cdot (\alpha x + \beta)^{-n} dx = \frac{A}{\alpha} \frac{(\alpha x + \beta)^{-n+1}}{-n+1} + C.$$

□

(ii)

$$\int \frac{Ax}{(\alpha x + \beta)^n} dx$$

Megoldás. Ahhoz, hogy az integrandusnak meg tudjuk határozni a primitív függvényét, először el kell végeznünk egy polinomosztást. Ekkor

$$\frac{Ax}{(\alpha x + \beta)^n} = \frac{A}{\alpha} \frac{\alpha x}{(\alpha x + \beta)^n} = \frac{A}{\alpha} \frac{\alpha x + \beta - \beta}{(\alpha x + \beta)^n} = \frac{A}{\alpha} \cdot \frac{1}{(\alpha x + \beta)^{n-1}} - \frac{A\beta}{\alpha} \cdot \frac{1}{(\alpha x + \beta)^n}.$$

Figyeljük meg, hogy a fenti felbontás már olyan, amit az előző példa fényében már tudunk integrálni. □

(iii)

$$\int \frac{1}{x^2 + \alpha^2} dx$$

Megoldás. A megoldás során azt fogjuk majd használni, hogy

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctg(x).$$

Ehhez először alakítsuk át a nevezőt

$$\int \frac{1}{x^2 + \alpha^2} dx = \int \frac{1}{\alpha^2 \left(\frac{x^2}{\alpha^2} + 1 \right)} dx = \frac{1}{\alpha^2} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{\alpha} \right)^2 + 1} dx$$

Legyen

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + \alpha^2} \quad t = \frac{x}{\alpha} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = g(t) = \alpha t.$$

Ebben az esetben $g'(t) = \alpha$, ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 + \alpha^2} dx &= \int \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{x}{\alpha} \right)^2 + 1} dx = \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} \cdot \alpha dt \Big|_{t=\frac{x}{\alpha}} = \int \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} dt \Big|_{t=\frac{x}{\alpha}} \\ &= \frac{1}{\alpha} \arctg(t) \Big|_{t=\frac{x}{\alpha}} + C = \frac{1}{\alpha} \arctg\left(\frac{x}{\alpha}\right) + C. \end{aligned}$$

□

(iv)

$$\int \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 x^2} dx$$

Megoldás. Hasonlóan, mint az előző példa esetében, először itt is alakítsuk át az integrandust.

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 x^2} = \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\frac{\beta^2 x}{\alpha^2} + 1} = \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\beta x}{\alpha}\right)^2 + 1}.$$

Legyen

$$f(x) = \frac{1}{\beta^2 x^2 + \alpha^2} \quad t = \frac{\beta x}{\alpha} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = g(t) = \frac{\alpha}{\beta} t.$$

Ebben az esetben $g'(t) = \frac{\alpha}{\beta}$, ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\beta^2 x^2 + \alpha^2} dx &= \int \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\beta x}{\alpha}\right)^2 + 1} dx = \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} \cdot \frac{\alpha}{\beta} dt \Big|_{t=\frac{\beta x}{\alpha}} = \int \frac{1}{\alpha\beta} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} dt \Big|_{t=\frac{\beta x}{\alpha}} \\ &= \frac{1}{\alpha\beta} \operatorname{arctg}(t) \Big|_{t=\frac{\beta x}{\alpha}} + C = \frac{1}{\alpha\beta} \operatorname{arctg}\left(\frac{\beta x}{\alpha}\right) + C. \end{aligned}$$

□

2. Feladat. A parciális törtekre bontás tételének felhasználásával határozzuk meg az alábbi függvények primitív függvényeit.

(i)

$$\int \frac{4}{3x-5} dx,$$

Megoldás.

$$\int \frac{4}{3x-5} dx = \frac{4}{3} \int \frac{3}{3x-5} dx = \frac{4}{3} \cdot \ln(|3x-5|) + C.$$

□

(ii)

$$\int \frac{5}{2-3x} dx$$

Megoldás.

$$\int \frac{5}{2-3x} dx = -\frac{5}{3} \int \frac{-3}{2-3x} dx = -\frac{5}{3} \ln(|2-3x|) + C.$$

□

(iii)

$$\int \frac{5}{(2x-4)^6} dx$$

Megoldás.

$$\int \frac{5}{(2x-4)^6} dx = \int 5 \cdot (2x-4)^{-6} dx = \frac{5}{2} \int 2 \cdot (2x-4)^{-6} dx = \frac{5}{2} \frac{(2x-4)^{-5}}{-5} + C.$$

□

(iv)

$$\int \frac{14}{(6-4x)^7} dx$$

Megoldás.

$$\int \frac{14}{(6-4x)^7} dx = -\frac{14}{4} \cdot \int (-4) \cdot (6-4x)^{-7} dx = -\frac{14}{4} \cdot \frac{(6-4x)^{-6}}{-6} + C.$$

□

(v)

$$\int \frac{x}{(2x+3)^4} dx,$$

Először végezzünk el egy polinomosztást

$$\frac{x}{(2x+3)^4} = \frac{1}{2} \frac{2x}{(2x+3)^4} = \frac{1}{2} \frac{(2x+3) - 3}{(2x+3)^4} = \frac{1}{2(2x+3)^3} - \frac{3}{2(2x+3)^4}.$$

Ennek az összegnek már mindkét tagját tudjuk integrálni, így

$$\int \frac{x}{(2x+3)^4} dx = \int \frac{1}{2(2x+3)^3} - \frac{3}{2(2x+3)^4} dx = \frac{1}{4(2x+3)^3} - \frac{1}{8(2x+3)^2} + C.$$

(vi)

$$\int \frac{5x}{(3x-4)^6} dx$$

Megoldás. *Hasonlóan, mint az előző feladat esetében*

$$\frac{5x}{(3x-4)^6} = \frac{5}{3(3x-4)^5} + \frac{20}{3(3x-4)^6},$$

így,

$$\int \frac{5x}{(3x-4)^6} dx = \int \frac{5}{3(3x-4)^5} + \frac{20}{3(3x-4)^6} dx = -\frac{5}{36(3x-4)^4} - \frac{4}{9(3x-4)^5} + C.$$

□

(vii)

$$\int \frac{2}{x+3} dx,$$

(viii)

$$\int \frac{5}{(x+1)^2} dx,$$

(ix)

$$\int \frac{x^2}{x+1} dx,$$

Megoldás. Mivel az integrandus nem egy valódi racionális törtfüggvény, ezért először a polinomosztást kell elvégeznünk.

$$\frac{x^2}{x+1} = \frac{(x^2-1)+1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)+1}{x+1} = \frac{1}{x+1} + x - 1,$$

ezt felhasználva,

$$\int \frac{x^2}{x+1} dx = \ln(|x+1|) + \frac{x^2}{2} - x + C.$$

□

(x)

$$\int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx,$$

(xi)

$$\int \frac{x+2}{x^2-1} dx,$$

Megoldás. A nevezőben szereplő $Q(x) = x^2 - 1$ másodfokú polinomnak kell először meghatároznunk a gyökeket.

$$\begin{aligned} Q(x) &= 0 \\ x^2 - 1 &= 0 \\ x &= \pm 1, \end{aligned}$$

azaz, a Q polinomnak két darab, egyszeres multiplicitású, valós gyöke van, mégpedig $x_1 = 1$ és $x_2 = -1$. Így a Q polinom gyöktényezői alakja

$$Q(x) = x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

Így, keresendők azok (az egyértelműen meghatározott) A, B valós számok, melyekre

$$\frac{x+2}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}.$$

Ezeket egy együtthatókat úgy tudjuk meghatározni, hogy közös nevezőre hozunk és egyeztetjük mindkét oldalon az együtthatókat.

$$\frac{x+2}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{(x-1)B + (x+1)A}{(x-1)(x+1)} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}),$$

vagyis

$$\begin{aligned} A + B &= 1 \\ A - B &= 2. \end{aligned}$$

Ennek az inhomogén lineáris egyenletrendszernek létezik egy egyértelműen meghatározott megoldása, mégpedig

$$A = \frac{3}{2} \quad B = -\frac{1}{2},$$

ezért

$$\frac{x+2}{x^2-1} = \frac{3}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1},$$

amiből azt kapjuk, hogy

$$\int \frac{x+2}{x^2-1} dx = \int \frac{3}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} dx = \frac{3}{2} \ln(|x-1|) - \frac{1}{2} \ln(|x+1|) + C.$$

□

(xii)

$$\int \frac{3x-4}{x^2-x-6} dx,$$

Megoldás. A nevezőben szereplő $Q(x) = x^2 - x - 6$ másodfokú polinomnak kell először meghatároznunk a gyökeit.

$$\begin{aligned} Q(x) &= 0 \\ x^2 - x - 6 &= 0 \\ x_1 &= 3, \\ x_2 &= -2 \end{aligned}$$

azaz, a Q polinomnak két darab, egyszeres multiplicitású, valós gyöke van, mégpedig $x_1 = 3$ és $x_2 = -2$. Így a Q polinom gyöktényezős alakja

$$Q(x) = x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2).$$

Így, keresendők azok (az egyértelműen meghatározott) A, B valós számok, melyekre

$$\frac{3x-4}{x^2-x-6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}.$$

Ezeket egy együtthatókat úgy tudjuk meghatározni, hogy közös nevezőre hozunk és egyeztetjük mindkét oldalon az együtthatókat.

$$\frac{3x-4}{x^2-x-6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2} = \frac{(x-3)B + (x+2)A}{(x-3)(x+2)} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{3, -2\}),$$

vagyis

$$\begin{aligned} A + B &= 3 \\ 2A - 3B &= 4. \end{aligned}$$

Ennek az inhomogén lineáris egyenletrendszernek létezik egy egyértelműen meghatározott megoldása, mégpedig

$$A = 1 \quad B = 2,$$

ezért

$$\frac{3x-4}{x^2-x-6} = \frac{1}{x-3} + 2\frac{1}{x+2}.$$

amiből azt kapjuk, hogy

$$\int \frac{3x-4}{x^2-x-6} dx = \int \frac{1}{x-3} + 2\frac{1}{x+2} dx = \ln(|x-3|) + 2\ln(|x+2|) + C.$$

□

3. Feladat. A parciális törtekre bontás tételének felhasználásával határozzuk meg az alábbi függvények primitív függvényeit.

(i)

$$\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx,$$

Megoldás. A nevezőben szereplő $Q(x) = (x-3)(x+2)^2$ harmadfokú polinomnak kell először meghatároznunk a gyökeit.

$$\begin{aligned} Q(x) &= 0 \\ (x-3)(x+2)^2 &= 0 \\ x_1 &= 3, \\ x_2 &= -2 \end{aligned}$$

azaz, a Q polinomnak két darab valós gyöke van, mégpedig $x_1 = 3$ és $x_2 = -2$. Az x_1 egyszeres, míg az x_2 egy kétszeres multiplicitású gyök. Így a Q polinom gyöktényezői alakja

$$Q(x) = x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)^2.$$

Így, keresendők azok (az egyértelműen meghatározott) A , B és C valós számok, melyekre

$$\frac{x^2}{(x - 3)(x + 2)^2} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{(x + 2)^2}.$$

Ezeket egy együtthatókat úgy tudjuk meghatározni, hogy közös nevezőre hozunk és egyeztetjük mindkét oldalon az együtthatókat.

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{(x - 3)(x + 2)^2} &= \frac{A(x + 2)^2 + B(x - 3)(x + 2) + C(x - 3)}{(x - 3)(x + 2)^2} \\ &= \frac{(A + B)x^2 + (4A - B + C)x + (4A - 6B + C)x + (4A - 6B - 3C)}{(x - 3)(x + 2)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{3, -2\}), \end{aligned}$$

vagyis

$$\begin{aligned} A + B &= 1 \\ 4A - B + C &= 0 \\ 4A - 6B - 3C &= 0 \end{aligned}$$

Ennek az inhomogén lineáris egyenletrendszernek létezik egy egyértelműen meghatározott megoldása, mégpedig

$$A = \frac{9}{25} \quad B = \frac{16}{25} \quad \text{és} \quad C = -\frac{4}{5}$$

ezért

$$\frac{x^2}{(x - 3)(x + 2)^2} = \frac{16}{25(x + 2)} - \frac{4}{5(x + 2)^2} + \frac{9}{25(x - 3)}.$$

amiből azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{(x - 3)(x + 2)^2} dx &= \int \frac{16}{25(x + 2)} - \frac{4}{5(x + 2)^2} + \frac{9}{25(x - 3)} dx \\ &= \frac{16 \ln(|x + 2|)}{25} + \frac{9 \ln(|x - 3|)}{25} + \frac{4}{5(x + 2)} + C. \end{aligned}$$

□

(ii)

$$\int \frac{1}{x^3 + 1} dx,$$

Útmutatás. Használjuk, hogy

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{3(x + 1)} - \frac{x - 2}{3(x^2 - x + 1)},$$

amiből

$$\int \frac{1}{x^3 + 1} dx = \int \frac{1}{3(x + 1)} - \frac{x - 2}{3(x^2 - x + 1)} dx = \frac{\ln(|x + 1|)}{3} - \frac{\frac{\ln(|x^2 - x + 1|)}{2} - \sqrt{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right)}{3} + C.$$

□

(iii)

$$\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx,$$

Megoldás. Tekintsük az

$$\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx$$

határozatlan integrált. Az előzőek szerint, keresendők azok A és B valós számok, melyekre

$$\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+5}$$

teljesül. Közös nevezőre hozva,

$$\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} = \frac{A(x+5) + B(x-2)}{(x-2)(x+5)},$$

azaz,

$$2x+3 = A(x+5) + B(x-2)$$

kell, hogy teljesüljön, minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{2, -5\}$ esetén. Ez csak úgy lehetséges, ha A és B megoldása az alábbi egyenletrendszernek,

$$\begin{cases} A+B=2 \\ 5A-2B=3 \end{cases}$$

Ennek az egyenlet megoldása $A=1$ és $B=1$, ezért

$$\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} = \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x-2}$$

Mindebből,

$$\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx = \int \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x-2} dx = \ln(|x+5|) + \ln(|x-2|) + C.$$

adódik. □

(iv)

$$\int \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx,$$

Útmutatás. Használjuk, hogy

$$\frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} = -\frac{3}{2(x+3)} + \frac{2}{x+2} - \frac{1}{2(x+1)},$$

ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx &= \int -\frac{3}{2(x+3)} + \frac{2}{x+2} - \frac{1}{2(x+1)} dx \\ &= -\frac{3 \ln(|x+3|)}{2} + 2 \ln(|x+2|) - \frac{\ln(|x+1|)}{2} + C. \end{aligned}$$

□

(v)

$$\int \frac{1}{x^2 - x + 2} dx,$$

Ebben az esetben a nevezőben lévő polinomnak mindkét gyöke komplex szám, ugyanis

$$x^2 - x + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{7}i}{2},$$

így a nevezőt először **teljes négyzetté** fogjuk alakítani.

$$x^2 - x + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4},$$

így

$$\frac{1}{x^2 - x + 2} = \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}} = \frac{1}{\frac{7}{4} \cdot \left(\frac{4}{7} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 1\right)} = \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{7}} \left(x - \frac{1}{2}\right)\right)^2 + 1}.$$

Figyeljük meg, hogy az utolsó kifejezést már tudjuk integrálni, ha alkalmazzuk a

$$t = g^{-1}(x) = \frac{2}{\sqrt{7}} \left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{2x - 1}{\sqrt{7}}$$

helyettesítést. Ezért

$$\int \frac{1}{x^2 - x + 2} dx = \int \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{7}} \left(x - \frac{1}{2}\right)\right)^2 + 1} dx = \frac{2 \operatorname{arctg} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{7}}\right)}{\sqrt{7}} + C.$$

(vi)

$$\int \frac{1}{(x-2)(x+4)} dx,$$

Megoldás. Tekintsük az

$$\int \frac{1}{(x-2)(x+4)} dx$$

határozatlan integrált. Az előzőek szerint, keresendők azok A és B valós számok, melyekre

$$\frac{1}{(x-2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+4}$$

teljesül. Közös nevezőre hozva,

$$\frac{1}{(x-2)(x+4)} = \frac{A(x+4) + B(x-2)}{(x-2)(x+4)},$$

azaz,

$$1 = A(x+4) + B(x-2)$$

kell, hogy teljesüljön, minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{2, -4\}$ esetén. Ez csak úgy lehetséges, ha A és B megoldása az alábbi egyenletrendszernek,

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A - 2B = 1 \end{cases}$$

Ennek az egyenlet megoldása $A = \frac{1}{6}$ és $B = -\frac{1}{6}$, ezért

$$\frac{1}{(x-2)(x+4)} = \frac{1}{6(x-2)} - \frac{1}{6(x+4)}$$

Mindebből,

$$\int \frac{1}{(x-2)(x+4)} dx = \int \frac{1}{6(x-2)} - \frac{1}{6(x+4)} dx = \frac{1}{6} \ln(|x-2|) - \frac{1}{6} \ln(|x+4|) + C.$$

adódik. □

(vii)

$$\int \frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} dx,$$

Megoldás. Tekintsük az

$$\int \frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} dx$$

határozatlan integrált. Ebben az esetben a nevezőben lévő harmadfokú polinomnak egyetlen, háromszoros multiplicitású gyöke van, mégpedig az $x_1 = -2$. Ezért most keresendők azok A , B és C valós számok, melyekre

$$\frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{(x+2)^3}$$

teljesül. Közös nevezőre hozva,

$$\frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} = \frac{A(x+2)^2 + B(x+2) + C}{(x+2)^3},$$

azaz,

$$1 = Ax^2 + (4A + B)x + (4A + 2B + C)$$

kell, hogy teljesüljön, minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -5\}$ esetén. Ez csak úgy lehetséges, ha A és B megoldása az alábbi egyenletrendszernek,

$$\begin{cases} A = 3 \\ 4A + B = 4 \\ 4A + 2B + C = -6 \end{cases}$$

Ennek az egyenletnek a megoldása $A = 3$, $B = -8$ és $C = 2$, ezért

$$\frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} = \frac{3}{x+2} - \frac{8}{(x+2)^2} - \frac{2}{(x+2)^3}$$

Mindebből,

$$\int \frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} dx = \int \frac{3}{x+2} - \frac{8}{(x+2)^2} - \frac{2}{(x+2)^3} dx = 3 \ln(|x+2|) + \frac{8}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2} + C.$$

adódik. □

(viii)

$$\int \frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} dx,$$

Megoldás. Tekintsük az

$$\int \frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} dx$$

határozatlan integrált. Ebben az esetben a nevezőben lévő harmadfokú polinomnak egyetlen, egyszeres multiplicitású gyöke van (az $x_1 = 1$), és egy további, kétszeres multiplicitású valós gyöke ($x_2 = 3$).

Ezért most keresendők azok A , B és C valós számok, melyekre

$$\frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-3)} + \frac{C}{(x-3)^2}$$

teljesül. Közös nevezőre hozva,

$$\frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} = \frac{A(x-3)^2 + B(x-1)(x-3) + C(x-1)}{(x-1)(x-3)^2},$$

azaz,

$$5x-3 = (A+B)x^2 + (-6A-4B+C)x + (9A+3B-C)$$

kell, hogy teljesüljön, minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$ esetén. Ez csak úgy lehetséges, ha A és B megoldása az alábbi egyenletrendszernek,

$$\begin{cases} (A+B) = 0 \\ -6A-4B+C = 5 \\ 9A+3B-C = -3 \end{cases}$$

Ennek az egyenletnek a megoldása $A = 1$, $B = -1$ és $C = 6$, ezért

$$\frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} = \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x-3)} + \frac{6}{(x-3)^2}$$

Mindebből,

$$\int \frac{5x-3}{(x-1)(x-3)^2} dx = \int \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x-3)} + \frac{6}{(x-3)^2} dx$$

$$\frac{\ln(|x-1|)}{2} - \frac{\ln(|x-3|)}{2} - \frac{6}{x-3} + C$$

adódik. □

(ix)

$$\int \frac{5}{x(x^2+4)} dx,$$

Megoldás. Tekintsük az

$$\int \frac{5}{x(x^2+4)} dx$$

határozatlan integrált. Ebben az esetben a nevezőben lévő harmadfokú polinomnak egyetlen, egyszeres multiplicitású gyöke van (az $x_1 = 0$), és két egyszeres multiplicitású komplex gyöke ($x_2 = \pm 2i$).

Ezért most keresendők azok A , B és C valós számok, melyekre

$$\frac{5}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

teljesül. Közös nevezőre hozva,

$$\frac{5}{x(x^2+4)} = \frac{A(x^2+4) + (Bx+C)x}{x(x^2+4)},$$

azaz,

$$5 = (A+B)x^2 + Cx + 4A$$

kell, hogy teljesüljön, minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén. Ez csak úgy lehetséges, ha A , B és C megoldása az alábbi egyenletrendszernek,

$$\begin{cases} (A + B) &= 0 \\ C &= 0 \\ 4A &= 5 \end{cases}$$

Ennek az egyenletnek a megoldása $A = \frac{5}{4}$, $B = -\frac{5}{4}$ és $C = 0$, ezért

$$\frac{5}{x(x^2 + 4)} = \frac{5}{4} \frac{1}{x} - \frac{5}{4} \frac{x}{x^2 + 4}$$

Mindebből,

$$\int \frac{5}{x(x^2 + 4)} dx = \int \frac{5}{4} \frac{1}{x} - \frac{5}{4} \frac{x}{x^2 + 4} dx = \frac{5 \ln(|x|)}{4} - \frac{5 \ln(|x^2 + 4|)}{8} + C$$

adódik. □

(x)

$$\int \frac{14}{(x-3)(x+2)(x-4)} dx,$$

Megoldás. Használjuk azt, hogy

$$\frac{14}{(x-3)(x+2)(x-4)} = \frac{7}{15(x+2)} - \frac{14}{5(x-3)} + \frac{7}{3(x-4)},$$

ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{14}{(x-3)(x+2)(x-4)} dx &= \int \frac{7}{15(x+2)} - \frac{14}{5(x-3)} + \frac{7}{3(x-4)} dx \\ &= \frac{7 \ln(|x+2|)}{15} - \frac{14 \ln(|x-3|)}{5} + \frac{7 \ln(|x-4|)}{3} + C. \end{aligned}$$

□

(xi)

$$\int \frac{2x^2}{x^4 - 1} dx$$

Megoldás. Használjuk egyfelől azt, hogy

$$x^4 - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1,2} = \pm 1 \quad \text{és} \quad x_{3,4} = \pm i,$$

ezért a nevező gyöktényezős alakja

$$x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1).$$

Így, ebben az esetben keresendők azok az egyértelműen meghatározott A, B, C és D valós számok, melyekre

$$\frac{2x^2}{x^4 - 1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1},$$

közös nevezőre hozva azt kapjuk, hogy

$$\frac{2x^2}{x^4 - 1} = \frac{A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)(x+1)}{x^4 - 1}$$

teljesül minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ esetén, azaz,

$$\begin{cases} A + B + C &= 0 \\ A - B + C + D &= 2 \\ A + B - C &= 0 \\ A - B - C - D &= 0 \end{cases}$$

Ennek az egyenletnek az egyértelműen meghatározott megoldása $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, C = 0$ és $D = 1$, ezért

$$\frac{2x^2}{x^4 - 1} = \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)},$$


amiből azt kapjuk, hogy

$$\int \frac{2x^2}{x^4 - 1} dx = \int \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)} dx$$

$$\arctg(x) - \frac{1}{2} \ln(|x+1|) + \frac{1}{2} \ln(|x-1|) + C.$$

□

4. Feladat. A $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = g^{-1}(x)$ helyettesítés alkalmazásával határozzuk meg a következő függvények primitív függvényeit.

 **Miért vezet célra a $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = g^{-1}(x)$ helyettesítés?**

Legyen

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = g^{-1}(x).$$

Ekkor

$$x = 2\arctg(t) = g(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{2}{t^2 + 1}.$$

Egyelőre nem világos azonban, hogy mennyivel egyenlő $\sin(2\arctg(t))$, illetve $\cos(2\arctg(t))$. Ehhez idézzünk fel néhány trigonometrikus azonosságot.

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sin\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}}{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}} \cdot \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1} \stackrel{t=\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{=} \frac{2t}{t^2 + 1} \end{aligned}$$

hasonlóan

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \cos\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}}{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}} \cdot \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \stackrel{t=\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{=} \frac{1 - t^2}{t^2 + 1}, \end{aligned}$$

ami mutatja, hogy ha egy $R(\sin(x), \cos(x))$ alakú kifejezésben elvégezzük a fenti helyettesítést, akkor egy racionális törtfüggvényt kapunk.

(i)

$$\int \frac{1 + \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx$$

Megoldás. Alkalmazzuk a fenti helyettesítést, azaz, legyen

$$t = \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) = g^{-1}(x),$$

vagyis,

$$x = 2 \arctg(t) = g(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{2}{t^2 + 1}.$$

Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx &= \int f(x) dx \\ &= \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{1 + \frac{2t}{t^2 + 1}}{1 + \frac{1 - t^2}{t^2 + 1}} \cdot \frac{2}{t^2 + 1} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2 + 1} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int 1 + \frac{2t}{t^2 + 1} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= t + \ln(|t^2 + 1|) + C \Big|_{t=\operatorname{tg}(\frac{x}{2})} + C \\ &= \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) + \ln \left(\left| \operatorname{tg}^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 1 \right| \right) + C. \end{aligned}$$

□

(ii)

$$\int \frac{1}{1 + \cos(x)} dx$$

Megoldás. Alkalmazzuk a fenti helyettesítést, azaz, legyen

$$t = \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) = g^{-1}(x),$$

vagyis,

$$x = 2 \arctg(t) = g(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{2}{t^2 + 1}.$$

Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \cos(x)} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{2}{(t^2 + 1) \left(\frac{1 - t^2}{t^2 + 1} + 1 \right)} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int 1 dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = t \Big|_{t=\operatorname{tg}(\frac{x}{2})} + C = \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) + C. \end{aligned}$$

□

(iii)

$$\int \frac{1}{1 + \sin(x)} dx$$

Megoldás. Alkalmazzuk a fenti helyettesítést, azaz, legyen

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = g^{-1}(x),$$

vagyis,

$$x = 2\arctg(t) = g(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{2}{t^2 + 1}.$$

Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \sin(x)} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{2}{(t^2 + 1) \left(\frac{2t}{t^2+1} + 1\right)} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{2}{(t+1)^2} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = -\frac{2}{t+1} \Big|_{t=\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)} + C = -\frac{2}{\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 1} + C. \end{aligned}$$

□

(iv)

$$\int \frac{4}{5 + 6 \cos(x)} dx$$

(v)

$$\int \frac{1}{\sin(x) \cos(x)} dx$$

(vi)

$$\int \frac{2}{1 + 2\operatorname{tg}(x)} dx$$

5. Feladat. A $t = e^x = g^{-1}(x)$ helyettesítés alkalmazásával határozzuk meg a következő függvények primitív függvényeit.

(i)

$$\int \frac{4}{e^{2x} - 4} dx$$

Megoldás. A megoldás során a

$$t = e^x = g^{-1}(x),$$

azaz az

$$x = g(t) = \ln(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{1}{t}$$

helyettesítést fogjuk alkalmazni. Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{4}{e^{2x} - 4} dx &= \int \frac{4}{(e^x)^2 - 4} dx = \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{4}{t^2 - 4} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{(t+2)} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2} \frac{1}{(t-2)} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \frac{\ln(|t+2|)}{2} - \ln|t| + \frac{\ln(|t-2|)}{2} \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= \frac{\ln(|e^x + 2|)}{2} - \ln|e^x| + \frac{\ln(|e^x - 2|)}{2} + C. \end{aligned}$$

□

(ii)

$$\int \frac{5}{e^{2x} + 1} dx$$

(iii)

$$\int \frac{e^{3x}}{e^x + 2} dx$$

Megoldás. A megoldás során a

$$t = e^x = g^{-1}(x),$$

azaz az

$$x = g(t) = \ln(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{1}{t}$$

helyettesítést fogjuk alkalmazni. Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{3x}}{e^x + 2} dx &= \int \frac{(e^x)^3}{e^x + 2} dx = \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{t^3}{t + 2} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \frac{4}{t + 2} + t - 2t \Big|_{t=g^{-1}(x)} = 4 \ln(|t + 2|) + \frac{t^2}{2} - 2t \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= 4 \ln(|e^x + 2|) + \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + C. \end{aligned}$$

□

(iv)

$$\int \frac{e^x}{e^{-x} + 2} dx$$

(v)

$$\int \frac{e^x}{(e^x + 2)^2} dx$$

Megoldás. A megoldás során a

$$t = e^x = g^{-1}(x),$$

azaz az

$$x = g(t) = \ln(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{1}{t}$$

helyettesítést fogjuk alkalmazni. Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{(e^x + 2)^2} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{t}{(t + 2)^2} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{1}{(t + 2)^2} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = -\frac{1}{t + 2} \Big|_{t=g^{-1}(x)} = -\frac{1}{e^x + 2} + C. \end{aligned}$$

□

(vi)

$$\int \frac{e^x + 4}{e^{2x} + 4e^x + 3} dx$$

Megoldás. A megoldás során a

$$t = e^x = g^{-1}(x),$$

azaz az

$$x = g(t) = \ln(t) \quad \text{és} \quad g'(t) = \frac{1}{t}$$

helyettesítést fogjuk alkalmazni. Ebben az esetben

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x + 4}{e^{2x} + 4e^x + 3} dx &= \int \frac{e^x + 4}{(e^x)^2 + 4e^x + 3} dx = \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{t + 4}{t^2 + 4t + 3} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{1}{6(t+3)} - \frac{3}{2(t+1)} + \frac{4}{3t} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \frac{\ln(|t+3|)}{6} - \frac{3 \ln(|t+1|)}{2} + \frac{4 \ln|t|}{3} \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= \frac{\ln(|e^x+3|)}{6} - \frac{3 \ln(|e^x+1|)}{2} + \frac{4 \ln|e^x|}{3} + C. \end{aligned}$$

□

(vii)

$$\int \frac{e^{2x} + e^x - 1}{e^x(e^{2x} + 7e^x + 6)} dx$$

6. Feladat. A $t = \sqrt[n]{ax+b} = g^{-1}(x)$ helyettesítés alkalmazásával határozzuk meg a következő függvények primitív függvényeit.

(i)

$$\int x \sqrt{5x+3} dx$$

Megoldás. Legyen

$$t = \sqrt{5x+3} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = \frac{t^2-3}{5} = g(t).$$

Ekkor

$$g'(t) = \frac{2}{5}t,$$

valamint

$$\begin{aligned} \int x \sqrt{5x+3} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{t^2-3}{5} t \cdot \frac{2}{5} t dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{2t^4 - 6t^2}{25} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \frac{2t^5 - 10t^3}{125} \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C = \frac{2(\sqrt{5x+3})^5 - 10(\sqrt{5x+3})^3}{125} + C. \end{aligned}$$

□

(ii)

$$\int (3x+6) \sqrt{2x-4} dx$$

(iii)

$$\int (x^2 - 2x + 3) \sqrt{2x-1} dx$$

Megoldás. Legyen

$$t = \sqrt{2x-1} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = \frac{t^2+1}{2} = g(t).$$

Ekkor

$$g'(t) = t,$$

valamint

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 3) \sqrt{2x-1} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int t^2 \left(\frac{(t^2+1)^2}{4} - t^2 + 2 \right) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{t^6}{4} - \frac{t^4}{2} + \frac{9t^2}{4} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \frac{t^7}{28} - \frac{t^5}{10} + \frac{3t^3}{4} \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= \frac{(\sqrt{2x-1})^7}{28} - \frac{(\sqrt{2x-1})^5}{10} + \frac{3(\sqrt{2x-1})^3}{4} + C. \end{aligned}$$

□

(iv)

$$\int (2x-1) \sqrt{(5x-3)^3} dx$$

(v)

$$\int \frac{2x}{\sqrt{6x+4}} dx$$

Megoldás. Legyen

$$t = \sqrt{6x+4} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = \frac{t^2-4}{6} = g(t).$$

Ekkor

$$g'(t) = \frac{1}{3}t,$$

valamint

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{\sqrt{6x+4}} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{2 \frac{t^2-4}{6}}{\frac{t}{3}} \cdot \frac{1}{3} t dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int t^2 - 4 dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \frac{t^3}{3} - 4t \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= \frac{(\sqrt{6x+4})^3}{3} - 4\sqrt{6x+4} + C. \end{aligned}$$

□

(vi)

$$\int x \sqrt[4]{5x+3} dx$$

(vii)

$$\int \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{6x-4}} dx$$

Megoldás. Legyen

$$t = \sqrt[3]{6x-4} = g^{-1}(x) \quad \text{azaz} \quad x = \frac{t^3+4}{6} = g(t).$$

Ekkor

$$g'(t) = \frac{1}{2}t^2,$$

valamint

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{6x-4}} dx &= \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \\ &= \int \frac{3 \left(\frac{t^3+4}{6} \right)^2 + 2}{t} \cdot \frac{1}{2} t^2 dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \int \frac{t^7}{24} + \frac{t^4}{3} + \frac{5t}{3} dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} = \frac{t^8}{192} + \frac{t^5}{15} + \frac{5t^2}{6} \Big|_{t=g^{-1}(x)} + C \\ &= \frac{(\sqrt[3]{6x-4})^8}{192} + \frac{(\sqrt[3]{6x-4})^5}{15} + \frac{5(\sqrt[3]{6x-4})^2}{6} + C. \end{aligned}$$

□