



ការសិក្សាស្វែងយល់ពីថ្នាំ DIAZEPAM 5 MG



និយមន័យឱសថសាស្ត្រ និង ដំណើរការឱសថស្ថីសាស្ត្រ (Pharmacokinetics) ក្នុងរាងកាយមនុស្ស

បទបង្ហាញដោយ
Mr. Khoun Sotha



ផ្នែកទី ១៖ និយមន័យ និងលក្ខណៈទូទៅ

- ការយល់ដឹងពីប្រភព និងឥទ្ធិពលឱសថសាស្ត្រមូលដ្ឋានរបស់
Diazepam



និយមន័យ **DIAZEPAM 5 MG**

សមាសធាតុ និងក្រុមថ្នាំ

DIAZEPAM 5 MG គឺជាថ្នាំក្នុងក្រុម
BENZODIAZEPINES ដែលមានសារធាតុសកម្ម
DIAZEPAM ចំនួន 5 មីលីក្រាម ក្នុងមួយគ្រាប់។

សកម្មភាពលើប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តាល

វាមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធប្រសាទ
កណ្តាល (CNS) ដោយផ្ទាល់៖

- បន្ថយការថប់បារម្ភ (ANXIOLYTIC)
- បន្ធូរសាច់ដុំ (MYORELAXANT)
- គ្រប់គ្រងការប្រកាច់ (ANTICONVULSANT)

ផលរំខាន និងការប្រុងប្រយ័ត្ន

ផលរំខានទូទៅ

ដោយសារថ្នាំនេះមានឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់លើប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តាល វាអាចបង្កឱ្យមានអាការៈ ងងឹយដេក និង ស្រវាំងភ្នែក ជាដើម ដែលតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ការណែនាំក្នុងការប្រើ

គ្រប់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ គឺត្រូវស្ថិតក្រោម ការណែនាំ និងវេជ្ជបញ្ជាយ៉ាងតឹងរឹងពីគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីជៀសវាងការឈានដល់ការញៀនថ្នាំ ឬផលវិបាកអវិជ្ជមានផ្សេងៗ។

ផ្នែកទី ២៖ វិទ្យាស្រាស្ត្រសិក្សាអំពីចលនាបស់ថ្នាំក្នុងរាងកាយ (Pharmacokinetics)

ដំណាក់កាលទាំង ៤ នៃការបំបាត់ថ្នាំក្នុងរាងកាយ (ADME)

វិជ្ជាសាស្ត្រ ADME របស់ Diazepam

1

ដំណាក់កាលទី ១
Absorption

ការស្រូបចូលពីរាងកាយ
ចូលទៅក្នុងក្រពះ
ពោះវៀន និងចូលទៅ
ក្នុងចរន្តឈាម។

2

ដំណាក់កាលទី ២
Distribution

ការចែកចាយឈាម ទៅ
កាន់ជាលកា និងឆ្លងកាត់
Blood-Brain Barrier
ចូលខួរក្បាល។

3

ដំណាក់កាលទី ៣
Metabolism

ការបំបែកសារធាតុថ្នាំ
នៅក្នុងថ្លើម ដោយ
ប្រព័ន្ធអ័ន្ទស្រម CYP450
បង្កើតបាន
Metabolites សកម្ម។

4

ដំណាក់កាលទី ៤
Excretion

ការបញ្ចេញកាកសំណល់
និង metabolites ចេញពី
ក្នុងរាងកាយជាចម្បងតាម
តម្រងនោម។

Absorption & Distribution

1. Absorption (ការស្រូបចូល)


- លេបតាមមាត់ ស្រូបបានល្អពីក្រពះ និងពោះវៀន ចូលឈាម។
- កម្រិតថ្នាំក្នុងឈាមឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត (Peak) ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 1-1.5 ម៉ោង។

2. Distribution (ការចែកចាយ)

- ចែកចាយទៅកាន់ជាលិការផ្សេងៗក្នុងរាងកាយ។
- អាច ឆ្លងកាត់ Blood-Brain Barrier ចូលទៅក្នុងខួរក្បាល បង្កើតបានផលរលោចប្រព័ន្ធប្រសាទ ថប់បារម្ភចរិយចុះ និងងងឹយដេក។



Metabolism & Excretion



3. Metabolism (ការបំប្លែង)

- ប្រព្រឹត្តទៅជាចម្បងនៅក្នុង ថ្លើម ដោយប្រព័ន្ធអង់ស៊ីម CYP450។
- បង្កើតបាន metabolites មួយចំនួនដែលបន្តមានសកម្មភាព (Active metabolites) ធ្វើឱ្យថ្នាំមានរយៈពេលសកម្មភាពយូរ។

4. Excretion (ការបញ្ចេញកាកសំណល់)

- បន្ទាប់ពីការបំប្លែង សារធាតុត្រូវបានបញ្ចេញចោលជាចម្បងតាម តម្រងនោមក្នុងទឹកនោម។
- ដោយសារមាន metabolites សកម្ម និង Half-life យូរ ថ្នាំអាចស្ថិតក្នុងរាងកាយបានយូរថ្ងៃ។

សង្ខេបជាខ្សែដំណើរ (ADME Flow)

ការប្រើប្រាស់

Diazepam 5 mg (លេបតាមមាត់)



Absorption (ស្រូបចូល)
ក្រពះ / ពោះវៀន → ស្រូបចូលទៅក្នុង
ចំណូលរាង



Distribution (ចែកចាយ)
រាង → ខួរក្បាល និងជាលកា
គោលដៅផ្សេងៗ



Metabolism & Excretion (បំប្លែង
និងបញ្ចេញ) ថ្លៃម (CYP450)
បំប្លែងសារធាតុ → តម្រង់នោម
បញ្ចេញតាមទឹកនោម

