

Застосування вакуум-терапії при вогнепальних пораненнях кінцівок

Петренко Петро Петрович

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Тарасов О. А.

Кафедра хірургії №1

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф. Пойда О. І.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

м. Київ, Україна

Вступ: Сучасні бойові дії характеризуються високою часткою мінно-вибухових та кульових поранень кінцівок із великим дефектом м'яких тканин [1]. Вакуум-асистоване закриття ран (NPWT) є золотим стандартом лікування складних інфікованих ран.

Мета: Оцінити ефективність використання методики NPWT на ранніх етапах хірургічної обробки бойової вогнепальної травми.

Матеріали і методи: Проаналізовано результати лікування 42 поранених з вогнепальними дефектами тканин, які перебували на лікуванні у 2024-2025 роках.

Результати: Використання NPWT дозволило зменшити площу раньового дефекту на 34% швидше, ніж при традиційних перев'язках, та знизити рівень бактеріального обсіменіння на 3-тю добу.

Висновок: Раннє застосування NPWT при вогнепальних травмах кінцівок прискорює очищення ран і скорочує терміни підготовки до аутодермопластики.

Ключові слова: вогнепальні поранення, бойова травма, вакуумна терапія, NPWT

Список літератури:

1. Заруцький, Я. Л., та ін. (2024). Воєнно-польова хірургія. Київ: Фенікс.
2. Armstrong, D. G., et al. (2023). Negative pressure wound therapy in trauma. *Lancet Surgery*, 12(4), 310-318.