

5ª Lista de Exercícios

Transformações lineares

Exercício 1. Seja $T : V \rightarrow W$ uma função, em que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com escalares reais.

Classifique as afirmações em (V) verdaderas ou (F) falsas.

- () Se T é linear, então T preserva somas e produtos por escalar.
- () Se $T(x + y) = T(x) + T(y)$ então T é linear.
- () T é injetora se e somente se $\ker T = \{0\}$.
- () Se T linear, então $T(0) = 0$.
- () Se $T : V \rightarrow W$ é linear então $\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = \dim W$
- () Se T é linear, então T leva conjuntos L.I. em conjuntos L.I.
- () $T, U : V \rightarrow W$ são ambas lineares e coincidem em uma base de V , então $T = U$
- () Dados $x_1, x_2 \in V$, $x_1 \neq x_2$ e $y_1, y_2 \in W$, existe T linear tal que $T(x_1) = y_1$ e $T(x_2) = y_2$

Exercício 2. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$T(1, 0, 0) = (1, 2), \quad T(0, 1, 1) = (-1, -2). \quad T(0, 1, -1) = (5, -4)$$

- a) Encontre a expressão de $T(x, y, z)$.
- b) Encontre a matriz de T

Exercício 3. Considere a base canônica $B = \{e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}\}$ de $M_2(\mathbb{R})$:

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

e considere a transformação $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ que opera a transposta, isto é,

$$T(A) = A^t$$

- a) Mostre que T é transformação linear
- b) Encontre a matriz de T correspondente à base canônica B .