

Operaciones entre vectores

1. a. i. (9,6) ii. (0, 1) iii. (-1, -1) iv. (4, 1) v. $\left(3, -\frac{4}{3}\right)$

b. i. (4, 2, 0) ii. (4, -2, 1) iii. (-1, 0, 0)

2. a. $\|\vec{OP}\| = \sqrt{10}$ $\|\vec{OQ}\| = \sqrt{10}$ $\|\vec{OR}\| = \sqrt{14}$ $\|\vec{OS}\| = \sqrt{13}$

b. $\|\vec{PQ}\| = 2\sqrt{5}$

c. $d(P, Q) = 2\sqrt{5}$

d. $d(R, S) = \sqrt{17}$

e. $\left(\frac{\sqrt{14}}{7}, \frac{3\sqrt{14}}{14}, \frac{\sqrt{14}}{14}\right)$

3. a. $\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$ b. $\alpha = \frac{\pi}{3}$ c. $(-1, \sqrt{3})$

4. a. $\vec{v} \cdot \vec{u} = 5$, $\vec{w} \cdot (2\vec{u} - \vec{v}) = -12$, $\vec{v} \cdot (\vec{w} + \vec{u}) = 19$

b. El ángulo comprendido entre \vec{u} y \vec{v} es de aproximadamente 1,38 radianes. El ángulo comprendido entre \vec{v} y \vec{w} es de aproximadamente 0,886 radianes.

c. $\vec{u} \times \vec{v} = (9, 23, 10)$ $\vec{u} \times \vec{w} = (-1, 6, 16)$

d. $k(14, -7, 7)$ con $k \in \mathbb{R}$

5. a. $k = -3$ b. $k = -17$

Ecuación de la recta y del plano

6. i. $X = (0 \ 2) + \lambda(2 \ -1)$ $\lambda \in \mathbb{R}$ ii. $X = (0 \ 3) + \lambda(1 \ -1)$ $\lambda \in \mathbb{R}$

iii. $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda(3 \ 1)$ $\lambda \in \mathbb{R}$ iv. $X = \lambda(3 \ 1)$ $\lambda \in \mathbb{R}$

7. i. $X = (1 \ 3 \ -1) + \lambda(0 \ 1 \ 2)$ $\lambda \in \mathbb{R}$ ii. $X = (1 \ 2 \ -1) + \lambda(1 \ -1 \ 2)$ $\lambda \in \mathbb{R}$ iii. $X = (3 \ 2 \ -1) + \lambda(1 \ 4 \ -6)$ $\lambda \in \mathbb{R}$

iv. Una posibilidad es $X = (-3 \ 2 \ 1) + \lambda(2 \ 1 \ 0)$ $\lambda \in \mathbb{R}$. No es única.

8. i. Son concurrentes. Se intersecan en el punto $(1 \ -2 \ 5)$

ii. Son alabeadas.

iii. Son paralelas.

iv. Son coincidentes.

9. a. Dos puntos del plano podrían ser $(1, 1, -2)$ y $(0, 0, 0)$.

b. Un versor normal podría ser $\left(\frac{3\sqrt{14}}{14} \quad \frac{\sqrt{14}}{14} \quad \frac{\sqrt{14}}{7} \right)$

c. La intersección del plano con cada uno de los ejes coordenados es el origen de coordenadas.

d. $3x + y + 2z = 1$

e. $X = (1, -1, 0) + \lambda(3, 1, 2)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

10.

a. i. $x + y + 2z = 2$ ii. $2y + z = 2$ iii. $z = 3$

b. i. $x + z = 1$ ii. $-13x + 6y + 11z = 1$

c. $y = 0$

d. $2x + 4y - 3z = -18$

e. $x + 2y + 2z = -2$

f. $2x - y + 4z = 3$

11.

a. $X = \lambda(1 \ 5 \ 3) + (0 \ 0 \ 1)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

b. $X = \lambda(-8 \ 5 \ 7) + \left(\frac{17}{7} \ -\frac{1}{7} \ 0 \right)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

c. $(2 \ -1 \ -3)$

d. $\left(0 \ -\frac{3}{2} \ \frac{3}{2} \right)$

12.

a. $\Pi: 5x + 2y + 7z = 19$ r: $X = \lambda(5 \ 2 \ 7) + (3 \ 4 \ 5)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

b. $M = \left(\frac{1}{2} \ 3 \ \frac{3}{2} \right)$

13.

a. $-2x + 14y + 5z + 12 = 0$

b. $k = \frac{7}{2}$

14.

$k = 5, k = -4$

Distancia de un punto a una recta, proyecciones y simetrías respecto de una recta

15.

a. $A' = \left(\frac{1}{2} \ 1 \right)$

b. $A' = (3 \ 2 \ -1)$

16.

a. $A'' = \left(\frac{47}{5} \ \frac{21}{5} \right)$

b. $A'' = \left(\frac{22+2\sqrt{3}}{3} \ \frac{-5-\sqrt{3}}{3} \ \frac{-5\sqrt{3}+5}{3} \right)$

17.

a. $P' = \left(\frac{3}{2} \ \frac{7}{2} \ 1 \right)$

b. $P' = (-5 \ 0 \ 4)$

18.

a. $P'' = \left(-\frac{4}{3} \ -\frac{2}{3} \ \frac{5}{3} \right)$

b. $P'' = (0 \ 3 \ 1)$

- 19.** a. $X = \lambda(1 \ 0 \ 1) \ \lambda \in \mathbb{R}$ b. No existe tal recta c. $r: X = \lambda(1 \ 1) + (5 \ -1)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$
- 20.** a. $x - 3y + 2z + 10 = 0$ b. $d(A, \Pi) = \sqrt{14}$
- 21.** a. $B' = \left(\frac{6}{7} \ -\frac{162}{35} \ -\frac{4}{35}\right)$, $C' = (-2 \ 0 \ 1)$

Espacios vectoriales, subespacios y bases

- 22.** a. V es subespacio b. V no es subespacio c. V es subespacio d. V no es subespacio.
- 23.** a. Si es posible b. Si es posible c. No es posible d. Si es posible
- 24.** a. linealmente independiente b. linealmente dependiente c. li d. li
- 25.** a. $k \neq -10$ b. $k = -10$
- 26.** a. $B = \{(2 \ 3)\}$ $\dim(S) = 1$ b. $B = \{(-3 \ 2 \ 0) (2 \ 0 \ 1)\}$ $\dim(S) = 2$ c. $B = \{(1 \ -1 \ -1)\}$ $\dim(S) = 1$
d. $B = \{(-1 \ 1 \ 3) (0 \ 5 \ -1)\}$ $\dim(S) = 2$ e. $B = \{(2 \ 6 \ 9)\}$ $\dim(S) = 1$
- 27.** a. $B = \{(-1 \ 0 \ 1 \ 3)(2 \ 1 \ 0 \ 5)(0 \ 4 \ 8 \ -4)\}$ $\dim(S) = 3$
b. $k = -2$
- 28.** a. $B = \{(1 \ -2 \ 1)\}$ $\dim(S^\perp) = 1$
b. $B = \{(1 \ 0 \ 0 \ 1)(1 \ -3 \ 0 \ 1)\}$ $\dim(S^\perp) = 2$
c. $B = \{(2 \ 1 \ 0)(-1 \ 0 \ 1)\}$ $\dim(S^\perp) = 2$
d. $\dim(S^\perp) = 0$. S^\perp no tiene base
- 29.** Si es un subespacio. Una base de S^\perp es $B = \{(1 \ 1 \ 1)\}$, $\dim(S^\perp) = 1$.