

Fiche méthode : changements de base de numération

I./ Comment convertir un nombre décimal (base10) en base $b \neq 10$?

- On divise le nombre à convertir par le nombre b , en faisant une division euclidienne, c'est-à-dire une division avec quotient et reste.
- On prend le quotient de la division précédente et on le divise à nouveau par b .
- On continue à faire des divisions jusqu'à ce que le quotient trouvé soit égal à 0.
- Les restes des divisions successives, pris dans l'ordre inverse, donnent le nombre de départ écrit dans la base b .
- Remarque : si $b > 10$, il faut plus de dix symboles pour écrire le nombre dans la base b . En plus des dix chiffres de 0 à 9, on introduit les lettres de l'alphabet en commençant par A. Un reste de 10 sera donc symbolisé par la lettre A, un reste de 11 par la lettre B, etc.

Exemple : Soit $(45678)_{10}$ à convertir en base 16 :

$$45678 \div 16 = 2854 \text{ et il reste } 14.$$

$$2854 \div 16 = 178 \text{ et il reste } 6.$$

$$178 \div 16 = 11 \text{ et il reste } 2.$$

$$11 \div 16 = 0 \text{ et il reste } 11.$$

Le quotient de la division étant nul, on arrête et on relève les restes dans l'ordre inverse : 11, 2, 6 et 14. Le 11 sera symbolisé par B, le 14 par E. On a donc :

$$(45678)_{10} = (B26E)_{16}$$

II./ Comment convertir un nombre écrit en base $b \neq 10$ en décimal ?

- On considère les chiffres du nombre écrit en base b , et on les numérote de la façon suivante, en partant de la droite et en commençant par 0 : $C_n C_{n-1} \dots C_2 C_1 C_0$. Par exemple, pour le nombre 5678, on a : $C_0 = 8$, $C_1 = 7$, $C_2 = 6$ et $C_3 = 5$.
- On effectue le calcul suivant, en utilisant les puissances successives du nombre b : $N = C_n \times b^n + C_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + C_2 \times b^2 + C_1 \times b^1 + C_0 \times b^0$. Le nombre N trouvé correspond au résultat de la conversion.
- Remarques : il faut se souvenir que $b^1 = b$ et $b^0 = 1$. De plus, pour les bases $b > 10$, il faut remplacer les symboles non numériques par leur valeur : A deviendra 10, B deviendra 11, etc.

Exemple : Soit $(4321)_7$ à convertir en base 10 :

$$C_0 = 1, C_1 = 2, C_2 = 3, C_3 = 4 \text{ et } b = 7.$$

$$N = C_3 \times b^3 + C_2 \times b^2 + C_1 \times b^1 + C_0 \times b^0 = 4 \times 7^3 + 3 \times 7^2 + 2 \times 7^1 + 1 \times 7^0$$

$$N = 4 \times 343 + 3 \times 49 + 2 \times 7 + 1 \times 1 = 1534$$

On a donc :

$$(4321)_7 = (1534)_{10}$$

III./ Comment convertir un nombre écrit en base $b_1 \neq 10$ en base $b_2 \neq 10$?

Le plus simple est de convertir le nombre de la base b_1 à la base 10, puis de la base 10 à la base b_2 , en se servant des méthodes précédentes.

Exemple : Soit $(678)_9$ à convertir en base 5.

$$C_0 = 8, C_1 = 7, C_2 = 6 \text{ et } b = 9.$$

$$N = C_2 \times b^2 + C_1 \times b^1 + C_0 \times b^0 = 6 \times 9^2 + 7 \times 9^1 + 8 \times 9^0$$

$$N = 6 \times 81 + 7 \times 9 + 8 \times 1 = 557$$

On a donc :

$$(678)_9 = (557)_{10}$$

$$557 \div 5 = 111 \text{ et il reste } 2.$$

$$111 \div 5 = 22 \text{ et il reste } 1.$$

$$22 \div 5 = 4 \text{ et il reste } 2.$$

$$4 \div 5 = 0 \text{ et il reste } 4.$$

Le quotient de la division étant nul, on arrête et on relève les restes dans l'ordre inverse : 4, 2, 1 et 2.

On a donc :

$$(557)_{10} = (4212)_5$$

$$\text{Donc : } (678)_9 = (4212)_5$$

IV./ Comment passer rapidement du binaire à l'hexadécimal et vice-versa ?

Il est intéressant de noter qu'il y a une correspondance directe entre les chiffres de l'écriture hexadécimale (base 16) d'un nombre et les paquets de 4 bits (ou quartets) de son écriture binaire (base 2). Cela permet une conversion très rapide et explique l'utilisation de l'hexadécimal en informatique :

Dec	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bin	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Exemples :

1./ Soit $(1111101011011010)_2$ à convertir en base 16 :

On sépare les différents quartets : 1111 1010 1101 1010.

On regarde la correspondance en hexadécimal : F A D A.

On a donc :

$$(1111101011011010)_2 = (FADA)_{16}$$

2./ Soit $(BAFFE)_{16}$ à convertir en base 2 :

On regarde la correspondance en binaire des différents chiffres hexadécimaux :

$$B = 1011, A = 1010, F = 1111, E = 1110.$$

On a donc :

$$(BAFFE)_{16} = (101110101111111110)_2$$