ONE HEALTH VETERINARY
NUCLEO BANDEIRANTES/DF
TELEFONE: (61) 3053-3293 CELULAR: (61) 96307002
centrodehemoterapiapet@gmail.com

No. do Exame: 001/118879
Nome .....: FREDERICO
Raça.....: BULLDOG FRANCES
Sexo.....: MACHO
Prop.....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Médico Vet.: THAYNARA MARTINS
Dt Impressão: 11/07/2026 17:28:50

Data Entrada..: 09/07/2026
Espécie..:CANINO
Idade: 0 **Ano(s)** 4 **Mes(es)** **Dia(s)**
Peso(Kg).:00,0

Clínica Vet.: HOSPITAL ACR CUNHA _ VETERINARI

Babesia canis - Real Time PCR Qualitativo



MATERIAL UTILIZADO : ***Sangue total em EDTA.***

MÉTODO : qPCR(REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)

RESULTADO:..... ***Não detectado.***

Resultados positivos confirmam a presença de material genético de Babesia canis na amostra pesquisada. Resultados negativos devem ser avaliados com cautela, pois, há fatores que podem contribuir para a não detecção, como MOMENTO DA INFECÇÃO/ ESTÁGIO DA DOENÇA, tratamentos concomitantes, tipo de material coletado e sua preservação, dentre outros.

COMENTÁRIO TÉCNICO:
O método utilizado foi desenvolvido para DETECÇÃO EXCLUSIVA de material genético de Babesia canis.
A técnica possui especificidade e sensibilidade equivalentes a 95% na amostra adequada.
Em caso de resultado negativo e persistência da suspeita clínica, recomenda-se nova coleta de amostra com melhor representatividade/correlação com o quadro clínico do animal.

Observações:
- A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente antes da antibioticoterapia.
- A parasitemia (patógeno em corrente sanguínea) inicia entre 4-21 dias pós-infecção, aumentando a chance de detecção do DNA do patógeno.
- Em infecções crônicas, a detecção do DNA do patógeno nem sempre é possível.
- Importante avaliar coinfecções com outros hemoparasitas.
- A coinfecção de hemoparasitas é relativamente comum, principalmente devido aos vetores de transmissão, e pode agravar o quadro clínico e interferir na resposta aos tratamentos usuais.

NOTA **:**
Um resultado negativo na qPcr, não exclui o diagnóstico, especialmente em pacientes assintomáticos ou em coletas precoces no início da infecção.

CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO:
Foram realizados os controles abaixo:
Controles positivo e controle negativo da reação: ..... Válidos/Conformes
Controle endógeno de amplificação:..... Válido/Conforme

Obs: A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao OHV.

Brasília , 11/07/2026

Dr. Francisco Anilton Alves Araújo

Doar Sangue! Um ato de amor!

ONE HEALTH VETERINARY
NUCLEO BANDEIRANTES/DF
TELEFONE: (61) 3053-3293 CELULAR: (61) 96307002
centrodehemoterapiapet@gmail.com

No. do Exame: 001/118879
Nome .....: FREDERICO
Raça.....: BULLDOG FRANCES
Sexo.....: MACHO
Prop.....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Médico Vet.: THAYNARA MARTINS
Dt Impressão: 11/07/2026 17:28:51

Data Entrada..: 09/07/2026
Espécie..:CANINO
Idade: 0 **Ano(s)** 4 **Mes(es)** **Dia(s)**
Peso(Kg).:00,0

Clínica Vet.: HOSPITAL ACR CUNHA _ VETERINARI

Anaplasma platys. - Real Time PCR Qualitativo

MATERIAL UTILIZADO: ***Sangue total em EDTA.***

MÉTODO: qPCR (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)

RESULTADO.....: ***Não detectado.***

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:
Resultados positivos confirmam a presença do Anaplasma platys. na amostra pesquisada.
Resultados negativos devem ser avaliados com cautela, pois há fatores que podem contribuir para a não detecção como MOMENTO DA INFECÇÃO/ESTÁGIO DA DOENÇA, tipo de material coletado e sua preservação dentre outros.

COMENTÁRIO TÉCNICO:
O método utilizado foi desenvolvido SOMENTE PARA DETECÇÃO in vitro do Anaplasma platys.
A técnica possui especificidade e sensibilidade equivalentes a 95%, detectando-se no mínimo 500 cópias/mL.
Em caso de reteste para confirmação em caso de resultados diferentes do esperado, recomenda-se a realização de novos exames a partir de nova colheita de amostras.

NOTA **:**
Um resultado negativo na qPcr, não exclui o diagnóstico, especialmente em pacientes assintomáticos ou em coletas precoces no início da infecção.

CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO:
Foram realizados os controles abaixo:
Controles positivo e controle negativo de detecção:.....Válidos/Conformes
Controle interno de amplificação:.....Válido/Conforme

Obs: A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao OHV.

Brasília , 11/07/2026

Dr. Francisco Anilton Alves Araújo

Doar Sangue! Um ato de amor!

ONE HEALTH VETERINARY
NUCLEO BANDEIRANTES/DF
TELEFONE: (61) 3053-3293 CELULAR: (61) 96307002
centrodehemoterapiapet@gmail.com

No. do Exame: 001/118879
Nome .....: FREDERICO
Raça.....: BULLDOG FRANCES
Sexo.....: MACHO
Prop.....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Médico Vet.: THAYNARA MARTINS
Dt Impressão: 11/07/2026 17:28:51

Data Entrada..: 09/07/2026
Espécie..:CANINO
Idade: 0 **Ano(s)** 4 **Mes(es)** **Dia(s)**
Peso(Kg).:00,0

Clínica Vet.: HOSPITAL ACR CUNHA _ VETERINARI

Ehrlichia canis - Real Time PCR Qualitativo

MATERIAL UTILIZADO: ***Sangue total em EDTA.***

MÉTODO: qPCR (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)

RESULTADO:..... ***Não detectado.***

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:
Resultados positivos confirmam a presença de Ehrlichia canis na amostra pesquisada. Resultados negativos devem ser avaliados com cautela, pois há fatores que podem contribuir para a não detecção como MOMENTO DA INFECÇÃO / ESTÁGIO DA DOENÇA, tipo de material coletado e sua preservação dentre outros.

COMENTÁRIO TÉCNICO:
O método utilizado foi desenvolvido SOMENTE PARA DETECÇÃO in vitro de Ehrlichia canis. A técnica possui especificidade e sensibilidade equivalentes a 95%, detectando-se no mínimo 500 cópias/mL. Em caso de reteste para confirmação, ou em caso de resultados diferentes do esperado, recomenda-se a realização de novos exames a partir da nova colheita de amostras.
O diagnóstico a partir de sangue total é mais recomendado para a fase aguda da doença, uma vez que em estágios mais tardios, o patógeno frequentemente está ausente no sangue e o resultado negativo não exclui a infecção. Para fase crônica, a amostra mais recomendada é a medula óssea.

NOTA :
Um resultado negativo na qPcr, não exclui o diagnóstico, especialmente em pacientes assintomáticos ou em coletas precoces no início da infecção.

CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO:
Foram realizados os controles abaixo:
Controles positivo e controle negativo de reação:.....Válidos/Conformes
Controle interno de amplificação :.....Válido/Conforme

Obs: A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao OHV.

Brasília , 11/07/2026

Dr. Francisco Anilton Alves Araújo

Doar Sangue! Um ato de amor!

ONE HEALTH VETERINARY
NUCLEO BANDEIRANTES/DF
TELEFONE: (61) 3053-3293 CELULAR: (61) 96307002
centrodehemoterapiapet@gmail.com

No. do Exame: 001/118879
Nome .....: FREDERICO
Raça.....: BULLDOG FRANCES
Sexo.....: MACHO
Prop.....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Médico Vet.: THAYNARA MARTINS
Dt Impressão: 11/07/2026 17:28:51

Data Entrada..: 09/07/2026
Espécie..:CANINO
Idade: 0 **Ano(s)** 4 **Mes(es)** **Dia(s)**
Peso(Kg).:00,0

Clínica Vet.: HOSPITAL ACR CUNHA _ VETERINARI

Leishmania spp. - Real Time PCR Qualitativo

MATERIAL UTILIZADO: ***Sangue total em EDTA.***

MÉTODO: qPCR(REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)

RESULTADO:..... ***Não detectado.***

Resultados positivos confirmam a presença de material genético de Leishmania spp. na amostra pesquisada. Resultados negativos devem ser avaliados com cautela, pois há fatores que podem contribuir para a não detecção, como MOMENTO DA INFECÇÃO / ESTÁGIO DA DOENÇA, tratamentos concomitantes, tipo de material coletado e sua preservação, dentre outros. Por isto, é sempre necessário avaliar e correlacionar com exames específicos, exames diferenciais de outras patologias, além de exames complementares.

COMENTÁRIO TÉCNICO:
A técnica possui especificidade e sensibilidade equivalentes a 95% na amostra adequada.
Um resultado negativo pode ocorrer em situações que envolvem número de microrganismos abaixo do limite de detecção, como avaliações pós-tratamento e pacientes em estágio crônico da doença.
Em caso de resultado negativo e persistência da suspeita clínica, recomenda-se nova coleta de amostra com melhor representatividade (ex.:medula óssea com EDTA e/ou aspirado de linfonodo).
Em cães assintomáticos com suspeita de infecção, recomenda-se a realização de análises a partir de amostras de medula óssea ou de linfonodos.
O exame de qPCR pode apresentar resultados falsamente negativos em animais infectados, porém sem parasitemia detectável no momento da coleta.
O monitoramento de cães infectados, mas clinicamente assintomáticos, deve ser conduzido em intervalos de 3 a 6 meses, preferencialmente por meio de métodos quantitativos, fim de avaliar a carga parasitária e a evolução da infecção.

Obs.: Importante avaliar diferenciais e coinfecções com outros hemoparasitas. A coinfecção de hemoparasitas pode agravar o quadro clínico e interferir na resposta aos tratamentos usuais.

CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO:
Foram realizados os controles abaixo:
Controles positivo e controle negativo da reação: ..... Válidos/Conformes
Controle interno de extração de DNA: ..... Válido/Conforme

Obs: A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao OHV.

Brasília , 11/07/2026

Dr. Francisco Anilton Alves Araújo

Doar Sangue! Um ato de amor!