ACR Cunha Hospital Veterinário
Avenida Central, lote 1490 loja 2, Loja - Núcleo Bandeirante
(61) 3346-2692 - (61) 98339-3296 - (61) 98467-5116

Relação Proteína Creatinina Urinária

Animal:	71722 - Frederico	**Peso:**	5,445 kg em 06/07/2026
Espécie:	CANINA	**Sexo:**	Macho
Raça:	Bulldog Francês	**Idade:**	4 meses, 21 dias
Pelagem:	-	**Chip:**	963003101445374
Responsável:	64506 - Bruno Nogueira de Almeida	**CPF:**	034.555.531-76
Endereço:	Rua Alecrim 1003 - Sul (Águas Claras) - Taguatinga/DF		

RELAÇÃO PROTEÍNA CREATININA URINÁRIA

	Resultado
UPC:	1,11

Relação UPC = Relação entre proteína urinária e creatinina urinária (UPRO/UCRE).

Os resultados do exame devem ser avaliados de acordo com o local acometido, persistência da proteinúria e grau de azotemia.

LOCAL: A proteinúria pode ser pré-renal, renal ou pós-renal.

Pré-renal: Pesquisar proteínas de Bence Jones, mioglobina e hemoglobina.

Renal: Determinar níveis de azotemia.

Pós-renal: Analisar sedimento urinário para pesquisa de hemorragia, inflamação & e infecção.

PERSISTÊNCIA: Verificar se a proteinúria é persistente repetindo a relação PCU três ou mais vezes com intervalo de pelo menos >duas semanas.

AVALIAÇÃO:

NÃO AZOTÊMICA & PROTEINÚRIA PERSISTENTE COM SEDIMENTO URINÁRIO INATIVO (CÃES & GATOS):

UPC <0,5 - não há proteinúria significativa.

UPC >=0,5<1,0 - requer acompanhamento.

PC >=1,0<2,0 - proteinúria.

UPC >=2,0 - proteinúria significativa.

Relação Proteína Creatinina Urinária

CÃES COM AZOTEMIA & PROTEINÚRIA PERSISTENTE COM SEDIMENTO URINÁRIO INATIVO (CÃES):

UPC <0,5 - não há proteinúria significativa.

UPC >=0,5 - proteinúria significativa.

GATOS COM AZOTEMIA & PROTEINÚRIA PERSISTENTE COM SEDIMENTO URINÁRIO INATIVO (GATOS):

UPC <0,4 - não há proteinúria significativa.

UPC >=0,4 - proteinúria significativa.

NOTA: Em casos graves de doença renal crônica, a relação UPC pode diminuir. Isto ocorre porque o aumento da creatinina plasmática e a diminuição do número de néfrons funcionantes reduzem as perdas de proteína pela urina.