HistoPato
Análise Anatomopatologica Veterinária

RESULTADO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO

NECROPSIA [ ] BIOPSIA [x]

PAT: 4642-26	Data rec.: 05/06/2026	Data envio: 15/06/2026
Clínico: Dr(a). Ingryd (**Pet com Pet**) **End:** Av. Flamboyant, LT. 24, LJ. 08, Ed. Real Panoramic		**Fone:** 61-99862 5422
Responsável: Junia	Raça: Lhasa apso	Idade: 9 anos
Espécie: canina **(Birt)**		
Sexo: []M [x]F		
Conservação do material: Formol a 10%.		
História clínica e descrição do material enviado: Segundo informações do(a) veterinário(a): "1) cadeia mamária. 2) nódulo em região cervical, próximo a orelha direita. 3) nódulo em região dorsal".		
Descrição de material enviado: Recebido 3 frascos, um identificado como "Birt, 1" contendo uma peça cirúrgica mamária completa de 26,6 x 2,0 x 1,0 cm, com lesão em M5 de 1,2 x 1,0 x 1,0 cm, não ulcerada, firme, regular e esbranquiçada **(A1)**. Linfonodo inguinal **(A2)**. Outro frasco identificado como "Birt, 2" contendo uma peça cirúrgica cutânea de 1,2 x 1,0 x 0,3 cm, com lesão de 0,3 cm de diâmetro, não ulcerada, firme, regular e escurecida **(B)**. Outro frasco identificado como "Birt, 3" contendo uma peça cirúrgica cutânea de 1,2 x 0,6 x 0,4 cm, com lesão de 0,4 cm de diâmetro, não ulcerada, firme, regular e escurecida **(C)**.		
Procedimento laboratorial: H.E [x] coloração especial [] Qual:		
Descrição histopatológica: **A1) Glândula mamária:** cerca de 70% do fragmento está acometido por lesão neoplásica, mista, hipercelular, demarcada, nodular, não encapsulada que infiltra e substitui o parênquima mamário. A lesão caracteriza-se por formações tubulares/papilares entre 10-75% do tecido analisado, acompanhadas células mesenquimais se diferenciando em tecido mixoide/condroide com perda da delimitação da membrana basal. As células epiteliais são cúbicas, bordo citoplasmático pouco definido, citoplasma moderado, levemente eosinofílico, núcleo central, grande, cromatina pontilhada com nucléolo evidente e único. O pleomorfismo é moderado e foi visualizada 1 mitose em 12 campos de maior aumento (FN 20/40× - 2,37 mm^2). Os possíveis vasos analisados, todas as margens e o linfonodo estão livres de células neoplásicas, porém a margem profunda está estreita. **A2) Linfonodo:** hiperplasia linfoide/reacional associada a edema e hemossiderose. **B e C) Pele hirsuta:** melanoma melanocítico misto (90%). O pleomorfismo é moderado e foram visualizadas 1-2 mitoses em 12 campos de maior aumento (FN 20/40× - 2,37 mm^2). Os possíveis vasos analisados e todas as margens laterais de ambos os nódulos estão livres de células neoplásicas, porém as margens profundas de ambos os nódulos estão comprometidas.		
Diagnóstico histopatológico: ***A1) Glândula mamária: carcinoma em tumor misto (grau 1) (70%).*** ***A2) Linfonodo: hiperplasia linfoide/reacional associada a edema e hemossiderose.*** ***B e C) Pele hirsuta: melanoma melanocítico misto (90%).***		
Comentário: O carcinoma em tumor misto é descrito como uma possível progressão do tumor misto benigno, caracterizado pela ausência da membrana basal associada com proliferação mesenquimal benigna (ex: cartilagem/ osso). Segundo a graduação histológica, o presente caso possui: 10-75% de formações tubulares (2); moderada variação nuclear (2); 1 mitose/10 campos de maior aumento (400x) (1); Totalizando 5 pontos correspondendo a grau 1 (3-5 pontos). *Cassali et		

Esse exame deve ser analisado em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente para auxílio diagnóstico. Imagens possuem direitos autorais. Favor consultar o laboratório caso as utilize. O não cumprimento implica em sanções penais.
End: SHIS QI 29 Bl. C, Subsolo Lj 41/45 Ed. Dom Bosco-Lago Sul. CNPJ: 21.293.781/0001-20. Tel: 3367-4292/99146-6788.
E-mail: histopato.bsb@gmail.com Site: www.histopato.com


al.; Consensus for the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine Mammary Tumors -2013. **Braz J Vet Pathol**, 2014, 7(2), 38 – 69. **Cassali, et al.; Consensus Regarding the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine and Feline Mammary Tumors - 2019. **Braz J Vet Pathol**, 2020, 13(3), 555 – 574. Recomenda-se acompanhamento oncológico da paciente.

MSc. Rômulo Santos Adjuto Eloi
Médico Veterinário CRMV: 2202 DF
Especializado em Anatomia Patológica Animal

MSc. PhD. Letícia Batelli de Oliveira
Médica Veterinária CRMV: 2889 DF
Especializada em Anatomia Patológica Animal

MSc. PhD. Guilherme Reis Blume
Médico Veterinário CRMV: 2980 DF
Especialista em Anatomia Patológica Animal
Patologista certificado (ABPV)

ANEXO



Fotomicrografia 1. Neoplasia epitelial maligna com formação mixoide (estrela preta).

Esse exame deve ser analisado em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais do paciente para auxílio diagnóstico. Imagens possuem direitos autorais. Favor consultar o laboratório caso as utilize. O não cumprimento implica em sanções penais.
End: SHIS QI 29 Bl. C, Subsolo Lj 41/45 Ed. Dom Bosco-Lago Sul. CNPJ: 21.293.781/0001-20. Tel: 3367-4292/99146-6788.
E-mail: histopato.bsb@gmail.com Site: www.histopato.com