NOME: Frederico **TUTOR (A):** Bruno		**DATA:** 14/09/2026 **SOLICITANTE:** Ingryd	
ESPÉCIE: Cão	**RAÇA:** Buldogue Francês	**SEXO:** M	**IDADE:** 08 meses

DESCRIÇÃO RADIOGRÁFICA – MEMBRO PÉLVICO ESQUERDO (MPE) E PELVE

- **Suspeita clínica:** sobrecarga articular.
- **Região avaliada:** membro pévico esquerdo e pelve
- **Projeções:** ventrodorsal e laterolateral direita/esquerda; craniocaudal e mediolateral.

Ausência do membro pélvico direito, decorrente de amputação por desarticulação coxofemoral.

Aumento de volume e radiopacidade de tecidos moles na região do coto cirúrgico, com aspecto homogêneo e contornos relativamente definidos. Não são observadas áreas de lise, proliferação periosteal ou outras alterações ósseas no acetábulo e nos segmentos avaliados do hemipelvis direito.

Articulação coxofemoral esquerda congruente, com superfícies articulares regulares.

Estruturas ósseas do membro pélvico esquerdo com cortical e trabeculado preservados, sem evidências de fratura, reação periosteal ou lise óssea. Fises de crescimento abertas, condizentes com a faixa etária.

Discreto aumento de radiopacidade e perda parcial da definição da gordura infrapatelar esquerda. Superfícies articulares femorotibiopatelares regulares, sem evidências de alterações ósseas periarticulares. Patela em posição anatômica.

Articulações tarsocrural e intertársicas congruentes, sem alterações radiográficas.

Impressão diagnóstica:

- Aumento de volume de tecidos moles na região do coto de amputação do membro pélvico direito, sugestivo de processo inflamatório pós-operatório. Considerando a presença de secreção sanguinolenta, recomenda-se avaliação ultrassonográfica da região para investigação de coleções líquidas, trajetos fistulosos, granuloma ou comprometimento dos planos musculares remanescentes. A coleta de material para avaliação citológica, cultura e antibiograma poderá ser considerada conforme os achados clínicos e ultrassonográficos.

- Discreto aumento de radiopacidade da gordura infrapatelar esquerda, sugestivo de inflamação articular/sinovite incipiente. Alterações tendíneas ou ligamentares não podem ser excluídas radiograficamente. Recomenda-se ultrassonografia da articulação femorotibiopatelar esquerda.

- Ausência de alterações ósseas radiográficas no membro pélvico esquerdo ou na região do acetábulo direito.


- O histórico de sobrecarga biomecânica decorrente da ausência do membro contralateral deve ser correlacionado aos achados clínicos.

As imagens analisadas foram recebidas via Telerradiologia. Este laudo refere-se exclusivamente à interpretação das imagens fornecidas, não tendo o Radiologista Veterinário participado da execução dos exames ou do posicionamento do paciente, o que pode influenciar na qualidade e interpretação dos achados.

Assinado por Dhyego Thomazoni – Radiologista Veterinário – CRMV-PR 12.464
Responsável pelo exame - Túlio Felipe Barbosa da Silva – Radiologista Veterinário – CMRV-DF 2.953
Equipe EssencialVet – Diagnóstico por Imagem Volante Especializa


Frederico
O
8M
DX000650
LEG:KNEE LAT FLEX
XXHospital
14.09.2026
16:53:07
EI:4716.00
ML - MPE
ms:50.00


Frederico
O
8M
DX000650
LEG:TARSUS LAT
XXHospital
14.09.2026
16:52:19
EI:6728.00
LATERAL MPE
ms:50.00


Frederico
O
8M
DX000650
LEG:KNEE LAT EXT
XXHospital
14.09.2026
16:51:16
EI:6538.00
LLD
ms:50.00


Frederico
O
8M
DX000650
VD
LEG:TARSUS D-P
XXHospital
14.09.2026
16:50:37
EI:3723.00
E
D
ms:50.00