ONE HEALTH VETERINARY
NUCLEO BANDEIRANTES/DF
TELEFONE: (61) 3053-3293 CELULAR: (61) 96307002
centrodehemoterapiapet@gmail.com

No. do Exame: 001/124185
Nome .....: FREDERICO
Raça.....: BULLDOG FRANCES
Sexo.....: MACHO
Prop.....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Médico Vet.: INGRID KETLEN
Dt Impressão: 03/10/2026 13:45:33

Data Entrada..: 02/10/2026
Espécie..: CANINO
Idade: Ano(s) 8 Mes(es) 00 Dia(s)
Peso(Kg).: 00,0

Clínica Vet.: PET COM PET
CRMV: 4615

Babesia canis - Real Time PCR Qualitativo

MATERIAL UTILIZADO : ***Sangue total em EDTA.***

INFORMES CLÍNICOS : ***Não informado.***

MÉTODO : qPCR(REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)

RESULTADO:..... ***Não detectado.***
Cycle Threshold (Ct): **-**

Resultados positivos confirmam a presença de material genético de Babesia canis na amostra pesquisada. Resultados negativos devem ser avaliados com cautela, pois, há fatores que podem contribuir para a não detecção, como MOMENTO DA INFECÇÃO/ ESTÁGIO DA DOENÇA, tratamentos concomitantes, tipo de material coletado e sua preservação, dentre outros.

COMENTÁRIO TÉCNICO:
O método utilizado foi desenvolvido para DETECÇÃO EXCLUSIVA de material genético de Babesia canis.
A técnica possui especificidade e sensibilidade equivalentes a 95% na amostra adequada.
Em caso de resultado negativo e persistência da suspeita clínica, recomenda-se nova coleta de amostra com melhor representatividade/correlação com o quadro clínico do animal.

Observações:
- A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente antes da antibioticoterapia.
- A parasitemia (patógeno em corrente sanguínea) inicia entre 4-21 dias pós-infecção, aumentando a chance de detecção do DNA do patógeno.
- Em infecções crônicas, a detecção do DNA do patógeno nem sempre é possível.
- Importante avaliar coinfecções com outros hemoparasitas.
- A coinfecção de hemoparasitas é relativamente comum, principalmente devido aos vetores de transmissão, e pode agravar o quadro clínico e interferir na resposta aos tratamentos usuais.

NOTA **:**
Um resultado negativo na qPcr, não exclui o diagnóstico, especialmente em pacientes assintomáticos ou em coletas precoces no início da infecção.

CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO:
Foram realizados os controles abaixo:
Controles positivo e controle negativo da reação: ..... Válidos/Conformes
Controle endógeno de amplificação:..... Válido/Conforme

Obs: A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao OHV.

Brasília , 03/10/2026

Dr. Francisco Anilton Alves Araújo
CRMV 0540

Doar Sangue! Um ato de amor!