

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

| CPF: tem indicação de vacinação por ser portador da comorbidade abaixo |
|---|
| Diabetes mellitus |
| Pneumopatias crônicas graves (DPOC, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática) |
| Hipertensão Arterial Resistente (HAR) (PA acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos o PA controlada em uso de quatro ou mais anti-hipertensivos) |
| Hipertensão arterial estágio 3 PAS ≥180 e/ou PAD ≥110 independente da lesão em órgão-alvo ou comorbidade |
| Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade (PAS entre 140 e 179 e/ou PAD entre 90 109 na presença de órgão-alvo e/ou Comorbidade) |
| Insuficiência cardíaca IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independent de classe funcional da New York Heart Association |
| Cor pulmonale, Hipertensão pulmonar Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. |
| Cardiopatia hipertensiva hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólic e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo |
| Síndromes coronarianas crônicas Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras |
| Lesão valvar com repercussão hemodinâmica ou sintomática, ou comprometimento do miocárdio, (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
| Miocardiopatias e Pericardiopatias Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatireumática |
| Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demai grandes vasos |
| Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; outras) |
| Cardiopatias congênita no adulto Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiênci cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
| Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória d média e longa permanência). |
| Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demênci vascular |
| Doença renal crônica Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/o síndrome nefrótica |
| Imunossuprimidos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 < 35 células/mm3, doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalent > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressore ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico no últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
| Hemoglobinopatias graves Doença falciforme e talassemia maior |
| Obesidade mórbida IMC ≥ 40 Síndrome de Down |
| Cirrose hepática (Child Pugh A, B ou C) |
| Gestante com comorbidade :(Especificar |
| Gestante |
| Puérpera Deficiência física permanente (Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escada |
| Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo / Indivíduos com grand dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos / Indivíduos com alguma deficiência intelectua permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.) |

Em ___ / ___ / 2021.