


Clases 19 y 20: Repaso de la Unidad I

Funciones y gráficas

Brian Villegas Villalpando

brvillea@gmail.com

brian.villegas@edu.uaa.mx



Definición de función

Una **función** f asigna a cada elemento x de un conjunto $D \subset X$, llamado dominio, un ÚNICO elemento $f(x)$ en un conjunto Y , llamado contradominio. Esta asignación se denota de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f : D \subset X &\rightarrow Y \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Ejemplo 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{2\} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{1}{x-2} \end{aligned}$$

Definición de función inyectiva

Una función

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

es **inyectiva** si cualesquiera dos elementos distintos del dominio tienen distinto valor funcional, es decir, si $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Ejemplo 2 (Contraejemplo)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (x - 2)^2 + 1$$

Definición de función sobreyectiva

Una función

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

es **sobreyectiva** si para toda $y \in Y$ existe una $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

Ejemplo 3 (Contraejemplo)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (x - 2)^2 + 1$$

Definición de función biyectiva

Una función

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

es **biyectiva** si para toda $y \in Y$ existe una ÚNICA $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

Ejemplo 4

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^3$$

Definición de función constante

Una función

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

es **constante** si existe una $c \in Y$ tal que $f(x) = c$ para toda $x \in X$.

Ejemplo 5

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 3$$

Definición de función definida por partes

Una función

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

está **definida por partes** si su dominio está dividido y para cada división se tiene una regla de correspondencia, donde la relación resultante sigue siendo una función.

Ejemplo 6

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} (x-1)^2 + 3, & x \in [1, +\infty), \\ 2x + 1, & x \in (-\infty, 1]. \end{cases}$$

Definición de función polinomial

Una función

$$P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto P(x)$$

es **polinomial** si existen $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ con $n \in \mathbb{N}_0$ y $a_n \neq 0$ tales que

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Al número $n \in \mathbb{N}_0$ se le llama el grado de P .

Ejemplo 7

$$P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 3x^5 + x + 2$$

Definición de funciones racionales

Una función

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

es **racional** si existen polinomios P y Q tales que

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad \forall x \in D.$$

Ejemplo 8

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{1\} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x^3 - 6x^2 + 3}{x^5 - 1} \end{aligned}$$

Definición de ceros de funciones

Dada una función

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

decimos que $x \in D$ es un **cero** de f si $f(x) = 0$.

Ejemplo 9

Dada una función cuadrática $x \mapsto ax^2 + bx + c$ los ceros de la función se pueden calcular usando la fórmula general:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Observaciones

- 1 Un polinomio $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de grado n tiene a lo más n ceros reales.
- 2 Una función de tipo

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

se denomina de valor real y variable real.


Sección 2

Métodos de líneas verticales y horizontales

Función o no función

El método de líneas verticales se puede usar para determinar si una relación graficada en el plano cartesiano es una función o no. Para esto hacemos lo siguiente:

- 1 Trazar una línea vertical que corte a la gráfica
- 2 Si al menos una de esas líneas corta la gráfica en más de un punto, entonces la relación no es una función.



Sección 3

Gráficas y bosquejos


Graficando por medio de tabulación

Dada una regla de correspondencia, digamos

$$x \mapsto f(x) = 3x^3 + 1,$$

podemos graficar la función calculando las parejas por medio de tabulación:

- 1 Elegimos cualesquiera puntos de interés en el dominio.
- 2 Realizamos los cálculos de la regla de correspondencia.
- 3 Graficamos las parejas encontradas.
- 4 Entre más puntos calculemos, mejor será la aproximación de la gráfica




Bosquejo de funciones lineales

Consideremos una función lineal

$$x \mapsto ax + b, \quad a \neq 0.$$

Para bosquejar esta función podemos considerar los siguientes dos puntos:

- 1 La pareja $(0, b)$, donde la función intercepta al eje vertical.
- 2 La pareja $(-b/a, 0)$, donde la función intercepta al eje horizontal.




Bosquejo de funciones cuadráticas

Consideremos una función cuadrática

$$x \mapsto f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Si $a > 0$, entonces la función abre hacia arriba. De lo contrario, abre hacia abajo. Para bosquejar esta función podemos considerar los siguientes puntos:

- 1 El vértice de la parábola, que ocurre en $(-\frac{b}{2a}, f(\frac{-b}{2a}))$.
- 2 La pareja $(0, c)$, donde la función intercepta al eje vertical.
- 3 Las raíces (o ceros) de la parábola.




Bosquejo de semicírculos

Consideremos una semicírculo

$$x \mapsto b \pm \sqrt{r^2 - (x - a)^2}, \quad r > 0.$$

Para bosquejar esta función debemos identificar lo siguiente:

- 1 El centro (a, b)
- 2 El radio $r > 0$.
- 3 Si es un semicírculo superior o inferior dependiendo del signo \pm .




Bosquejo de raíces cuadradas

Consideremos la función

$$x \mapsto b + a\sqrt{\pm(x - c)}, \quad a \neq 0.$$

Para bosquejar esta función debemos identificar lo siguiente:

- ❶ El vértice, que ocurre en (c, b) .
- ❷ Si $a > 0$, entonces se trata de la parte superior. De lo contrario, es la inferior.
- ❸ Si abre a la derecha o a la izquierda dependiendo del signo \pm .
- ❹ Si es posible calcularlos, el cero de la función y el valor cuando $x = 0$.




Bosquejo de funciones racionales

Consideremos la función

$$x \mapsto \frac{1}{ax + b} + k, \quad a \neq 0.$$

Para bosquejar esta función debemos identificar lo siguiente:

- 1 El punto de indeterminación, que ocurre en $x = -b/a$.
- 2 La asíntota horizontal, que ocurre cuando $y = k$.
- 3 Si $a > 0$, entonces los trazos están en las esquinas superior derecha e inferior izquierda. De lo contrario, están en la superior izquierda e inferior derecha.




Bosquejo de funciones por partes

Dada una asignación definida por partes, digamos

$$x \mapsto \begin{cases} 2, & x \in (-\infty, 1] \\ (x-1)^2, & x \in (1, +\infty) \end{cases}.$$

podemos bosquejarla haciendo los bosquejos de cada parte con las restricciones de los dominios. Por ejemplo,

- ❶ Bosquejamos la función constante 2 desde menos infinito hasta 1.
- ❷ Bosquejamos la función $x \mapsto (x-1)^2$ desde 1 hasta más infinito.
- ❸ Los puntos finales se dejan abiertos o cerrados dependiendo de los intervalos.



Sección 4

Dominios naturales

Cálculo algebraico de dominios naturales

Recordemos que las reglas de correspondencia $x \mapsto \frac{1}{x}$ y $x \mapsto \sqrt{x}$ tienen dominio natural $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $[0, +\infty)$, respectivamente. Por lo tanto, dada una regla de correspondencia, digamos $x \mapsto 3x + 1$, el dominio natural de

$$x \mapsto \frac{1}{3x + 1}$$

se obtiene calculando y removiendo los puntos donde el denominador es cero (en este caso, resolviendo la ecuación $3x + 1 = 0$). Mientras que el dominio natural de

$$x \mapsto \sqrt{3x + 1}$$

se obtiene considerando únicamente los puntos donde el radicando es mayor o igual a cero (en este caso, resolviendo la desigualdad $3x + 1 \geq 0$). **¿Cómo se calcula el**


dominio natural de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{3x+1}}$?

Interpretación de gráficas

Una función, digamos

$$x \mapsto \frac{1}{2}(1 - (x - 2)^2),$$

- 1 Es cero para los valores de x donde la gráfica intercepta el eje horizontal.
- 2 Es mayor a cero para los valores de x donde la gráfica está por encima del eje horizontal.
- 3 Es menor a cero para los valores de x donde la gráfica está por debajo del eje horizontal.



Sección 5

Taller de bosquejo