NutriScienza

GUIDA PRATICA GRATUITA

L'ordine giusto nel *piatto.*

Stessi cibi, stesse quantità, ordine diverso. Cosa dicono davvero gli studi sull'ordine dei cibi, e come applicarlo ai pasti italiani senza rinunciare a niente.

1 Prima le verdure

2 Poi proteine e grassi

3 Per ultimi i carboidrati

nutriscienza.org · Edizione ottobre 2026 · Contenuto educativo: non sostituisce il parere del medico.

01 · COSA DICE LA RICERCA

Perché l'ordine conta

Quando mangi carboidrati (pane, pasta, riso, patate, dolci) a stomaco vuoto, gli zuccheri arrivano nel sangue velocemente e la glicemia sale con un picco. Se prima mangi verdure, proteine e grassi, lo stomaco si svuota più lentamente e l'organismo rilascia ormoni (come il GLP-1) che aiutano a gestire lo zucchero in arrivo. Risultato: lo stesso pasto produce una curva glicemica più bassa e più dolce.

−53%
area glicemica dopo il pasto, carboidrati per ultimi vs per primi (16 adulti con diabete tipo 2)

−54%
picco glicemico nello stesso studio

+38%
circa di GLP-1, l'ormone della sazietà, con i carboidrati per ultimi

Fonte: Shukla et al., *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 2017. Lo stesso pasto è stato consumato in tre ordini diversi, in giorni diversi.

E chi non ha il diabete?

L'effetto c'è anche in persone sane, ma è più piccolo. In uno studio su 18 giovani donne sane, mangiare prima le verdure ha ridotto glicemia e insulina dopo il pasto, anche quando il pasto veniva consumato velocemente (Imai et al., 2023). In adulti senza diabete, sia normopeso sia in sovrappeso, l'ordine "proteine prima, carboidrati per ultimi" ha dato il picco glicemico più basso (Lee et al., 2020).

> **Onestà prima di tutto.** Questi studi sono piccoli (da 11 a 31 persone) e misurano la glicemia nelle ore dopo un singolo pasto. Non dimostrano che l'ordine dei cibi, da solo, faccia dimagrire. Il peso dipende soprattutto da quanto mangi nell'arco della giornata. L'ordine dei cibi è un'abitudine semplice e gratuita che migliora la risposta al pasto: un tassello, non la soluzione intera.

02 · LA REGOLA

Tre passi, nessuna rinuncia

Non devi togliere niente dal piatto. Cambia solo la sequenza.

1

Prima le verdure

Insalata, verdure cotte, minestrone senza pasta, pinzimonio. Bastano 5–10 minuti di vantaggio: le fibre rallentano lo svuotamento dello stomaco.

2

Poi proteine e grassi

Carne, pesce, uova, legumi, formaggi, olio extravergine. Le proteine stimolano il GLP-1 e aumentano la sazietà.

3

Per ultimi i carboidrati

Pane, pasta, riso, patate, frutta, dolce. Arrivano in uno stomaco già "preparato" e la glicemia sale più piano.

Quanto aspettare tra un passo e l'altro?

Negli studi di laboratorio i carboidrati arrivavano circa 10 minuti dopo il resto. Nella vita reale non serve il cronometro: l'importante è che i carboidrati non siano la prima cosa che mangi a stomaco vuoto.

Funziona anche con il piatto unico?

Sì, con un accorgimento: inizia con qualche forchettata di verdure e proteine, poi mangia il resto insieme. Anche mangiare tutto insieme è meglio che iniziare dai soli carboidrati: nello studio del 2017 il pasto "tutto insieme" ha dato un picco più alto del pasto con i carboidrati per ultimi, ma più basso di quello con i carboidrati per primi.

03 · NELLA PRATICA

Come applicarla ai pasti italiani

Il pranzo all'italiana mette il primo (pasta, risotto) prima del secondo. È l'ordine opposto a quello degli studi. Ecco come adattarlo senza stravolgere le abitudini.

SITUAZIONE	ORDINE ABITUALE	ORDINE CONSIGLIATO
Pranzo con primo e secondo	Pasta → carne → insalata	Insalata o contorno → secondo → pasta (anche una porzione più piccola)
Piatto di pasta da solo	Pasta al pomodoro	Antipasto di verdure + condimento con legumi, tonno o ricotta; inizia dalle verdure
Pizza	Pizza, poi eventualmente insalata	Insalata mista prima; scegli una pizza con verdure o proteine (es. con verdure grigliate o prosciutto)
Colazione dolce	Cornetto e cappuccino	Yogurt greco o un uovo prima, poi la parte dolce; oppure fette biscottate dopo il latte
Aperitivo	Patatine, taralli, pizzette	Prima olive, verdure in pinzimonio, formaggio o affettati; poi gli snack
Cena veloce	Panino	Verdure crude da sgranocchiare prima; nel panino più proteine e verdure

Tre errori comuni

1. **Pensare che basti l'ordine.** Se le quantità restano eccessive, il peso non cambia. L'ordine aiuta la sazietà, non annulla le calorie.
2. **Aggiungere cibo invece di riordinarlo.** Antipasto più primo più secondo più dolce non è la regola: è un pasto più grande.
3. **Saltare le verdure.** Sono il passo più semplice e quello con più prove a favore.

Se hai il diabete o prendi farmaci per la glicemia (in particolare insulina o sulfaniluree), parla con il tuo medico prima di cambiare le tue abitudini a tavola: cambiare il momento in cui assumi i carboidrati può influire sulla glicemia rispetto alla terapia.

04 · IL PROSSIMO PASSO

L'ordine giusto, nelle quantità giuste

L'ordine dei cibi migliora la risposta a ogni pasto. Per cambiare davvero la composizione corporea serve anche la quantità giusta: quante calorie, quante proteine, quanti carboidrati, calcolati sui tuoi dati.

Il **Piano Base di NutriScienza** fa esattamente questo: rispondi a un questionario di 3 minuti e ricevi via email un piano alimentare personalizzato in PDF, con calorie e macronutrienti calcolati sulle formule della letteratura scientifica (Mifflin-St Jeor, LARN) e pasti già organizzati con l'ordine giusto.

Piano Base · €19, una tantum

Nessun abbonamento. Piano in PDF via email entro 24 ore.

Crea il tuo piano →

NutriScienza è uno strumento digitale: i piani sono generati con formule validate e intelligenza artificiale, non da un nutrizionista. Non è un servizio medico e non sostituisce il parere di un professionista sanitario.

FONTI

- Shukla AP et al. *Carbohydrate-last meal pattern lowers postprandial glucose and insulin excursions in type 2 diabetes.* BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5:e000440. doi:10.1136/bmjdrc-2017-000440
- Shukla AP et al. *Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels.* Diabetes Care. 2015;38(7):e98–9. doi:10.2337/dc15-0429
- Imai S et al. *Eating Vegetables First Regardless of Eating Speed Has a Significant Reducing Effect on Postprandial Blood Glucose and Insulin in Young Healthy Women.* Nutrients. 2023;15(5):1174. doi:10.3390/nu15051174
- Lee CL et al. *Food order and glucose excursion in Indian adults with normal and overweight/obese BMI: a randomised crossover pilot trial.* Nutr Health. 2021;27(2):161–169. doi:10.1177/0260106020975573
- Nesti L, Mengozzi A, Tricò D (Università di Pisa). *Impact of Nutrient Type and Sequence on Glucose Tolerance.* Front Endocrinol. 2019;10:144. doi:10.3389/fendo.2019.00144

© 2026 NutriScienza · nutriscienza.org