物理学院 Bryan* 学号: 1500066666

A 随机行走的统计特性

第 i 步($i=1,2,\ldots,n$)随机行走带来的坐标变动可由矢量 \vec{X}_i 描述;一般来说,它是一个多维随机变量。在此基础上,第 n 步时的坐标可表示为:

$$\vec{r}_n = \sum_{i=1}^n \vec{X}_i$$

注意到 \vec{X}_i, \vec{X}_j 相互独立且分布一致,自然有 $\langle \vec{r}_n \rangle = n \langle \vec{X}_i \rangle$; 若 $\langle \vec{X}_i \rangle \neq 0$, 则 $\langle \vec{r}_n \rangle$ 随步数 n 线性增大。

类似地,

$$\begin{split} \left(\vec{r}_{n} - \langle \vec{r}_{n} \rangle\right)^{2} &= \left(\sum_{i=1}^{n} \vec{X}_{i}\right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} \vec{X}_{j}\right) - 2\vec{r}_{n} \cdot \langle \vec{r}_{n} \rangle + \langle \vec{r}_{n} \rangle^{2} \\ &= \sum_{i,j} \vec{X}_{i} \cdot \vec{X}_{j} - 2\vec{r}_{n} \cdot \langle \vec{r}_{n} \rangle + \langle \vec{r}_{n} \rangle^{2} \\ &= \sum_{i=j} \vec{X}_{i}^{2} + \sum_{i \neq j} \vec{X}_{i} \cdot \vec{X}_{j} - 2\vec{r}_{n} \cdot \langle \vec{r}_{n} \rangle + \langle \vec{r}_{n} \rangle^{2}, \\ \sigma^{2} &= \left\langle \left(\vec{r}_{n} - \langle \vec{r}_{n} \rangle\right)^{2} \right\rangle = n \langle X_{i}^{2} \rangle - \langle \vec{r}_{n} \rangle^{2} + \sum_{i \neq j} \langle \vec{X}_{i} \cdot \vec{X}_{j} \rangle \end{split}$$

若概率分布关于原点对称 (如,各项同性),则 $\sum_{i\neq j}\langle \vec{X}_i\cdot\vec{X}_j\rangle=0, \langle \vec{r}_n\rangle=0,$ 相应有 $\sigma^2=n\langle X_i^2\rangle\propto n$. 注意,这一结论适用于任意维数的随机行走。

然而,即便步长固定为 1, 若概率分布关于原点不对称,则 $\sum_{i\neq j}\langle \vec{X}_i\cdot\vec{X}_j\rangle\neq 0, \langle \vec{r}_n\rangle\neq 0$, 特别地,对一维随机行走而言,若向右、向左概率分别为 p,q,p+q=1, 则:

$$\langle \vec{r}_n \rangle = n(p-q), \quad \langle \vec{X}_i \cdot \vec{X}_j \rangle = p^2 + q^2 - 2pq = (p-q)^2, \quad \sum_{i \neq j} \langle \vec{X}_i \cdot \vec{X}_j \rangle = n(n-1) (p-q)^2,$$

$$\therefore \quad \sigma^2 = n \left(1 - (p-q)^2 \right) = n \operatorname{Var}(\vec{X}_i)$$

简单起见,这里规定行走的步长恒定为 1; 可见 σ^2 依然正比于 n, 但 |p-q| 越大,比例系数越小。若 p=1 或 q=1,则 $\sigma^2=0$,此时随机行走退化为单向规则运动。此外,若允许有呆着不走的概率,则 $\langle X_i^2 \rangle < 1$,同样 $\sigma^2=n\langle X_i^2 \rangle \propto n$,且比例系数小于 1.

^{*}邮箱: pls_contact_via_github@fake_email.com