Vorlesungsaufgaben

LOOP-Implementierung

- (a) Geben Sie eine LOOP-Implementierung für
 - (i) $add(x_i, x_j)$

```
x_0 := x_i;

LOOP x_j DO

x 0 := succ(x_0);

END
```

(ii) $mult(x_i, x_j)$

```
x_0 := x_i;
L00P x_j D0
x0 := add(x_0, x_i);
END
```

(iii) $power(x_i, x_j)$

```
x_0 := succ(0);
LOOP x_j D0
x 0 := mult(x_0, x_i);
END
```

(iv) $hyper(x_i, x_i)$

```
1  x_0 := succ(0);
2  LOOP x_j DO
3  x_0 := power(x_i, x_0);
4  END
```

(v) 2^{x_i}

```
Mit power

x_0 := power(2, x_i);

Mit mult

x_0 := 1;

x_2 := 2;

LOOP x_i DO

x0 := mult(x_0, x_2);

END
```

an.

(b) Beweisen Sie, dass der größte gemeinsame Teiler zweier natürlicher Zahlen LOOP-berechenbar ist.

```
ggT(x_1, x_2)

x_3 := MAX(x_1, x_2);

x_4 := MIN(x_1, x_2);

LOOP x_4 DO

x_5 := x_3 - x_4;

x_3 := MAX(x_4, x_5);

x_4 := MIN(x_4, x_5);

END

x_0 := x_3;
```