
Minimierungsalgorithmus




z_0	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
z_1		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
z_2	*1	*1	Ø	Ø	Ø	Ø
z_3	*1	*1		Ø	Ø	Ø
z_4	*1	*1			Ø	Ø
<i>z</i> ₅	*2	*2	*1	*1	*1	Ø
	z_0	z_1	z_2	<i>z</i> ₃	z_4	z_5

 $\ast^1 Paar$ aus End-/ Nicht-Endzustand kannt nicht äquivalent sein. $\ast^2 Test,$ ob man mit Eingabe zu bereits markiertem Paar kommt.

Zustandspaar	0	1
(z_0, z_1)	(z_1, z_0)	(z_2, z_3)
(z_0,z_5)	(z_1, z_5)	$(z_2, z_5) *^2$
(z_1, z_5)	(z_0, z_5)	$(z_3, z_5) *^2$
(z_2, z_3)	(z_4, z_4)	(z_5, z_5)
(z_2, z_4)	(z_4, z_4)	(z_5,z_5)
(z_3, z_4)	(z_4, z_4)	(z_5, z_5)

 (z_2,z_3) , (z_2,z_4) unnd (z_3,z_4) können zu einem Zustand verschmolzen werden, weil sie alle drei bei der Eingabe von 0 zu (z_4,z_4) und bei 1 zu (z_5,z_5) werden.

 $z_{\rm 5}$ kann nicht verschmolzen werden, weil er in der Tabelle markiert ist.



https://studyflix.de/informatik/dea-minimieren-1212