

0.1 主坐标分析

0.1.1 摘要

在上期，我们学习了 PCA 公式的推导过程，但该公式在实际使用中较为麻烦。需要先求出协方差矩阵，再对其进行奇异值分解。因此更常用的方法是直接对中心化的数据集进行奇异值分解。

此外，使用主成分分析，我们最终得到的是新的坐标基，要对数据集进行降维，还需要再进行坐标的投影。因此本期将介绍一种相似但更为简便的方法：主坐标分析 (PCoA)

0.1.2 算法

SVD and PCA

在上一期中，我们推导出了协方差矩阵的简化形式：

$$S = \frac{1}{N} X^T H X$$

同时，我们也顺带推导出中心矩阵 $H^2 = H^T$ 都是其本身 H 。因此得到：

$$S = \frac{1}{N} X^T H^T H X$$

又因为我们可以对任何矩阵进行奇异值分解，因此我们有：

$$H X = U \Sigma V^T$$

因此，代入协方差矩阵中：

$$S = V \Sigma U^T U \Sigma V^T$$

我们知道：

$$U^T U = I \quad V^T V = V V^T = I$$

Σ 为对角矩阵

因此：

$$S = V \Sigma^2 V^T$$

写到这里，我们发现，只需对中心化的数据集进行奇异值分解，我们就可以得到协方差矩阵的特征值 Σ 和特征向量 V 。

我们计算 $H X V$ 即可得到投影后的坐标。

PCoA

下面我们对 S 的形式做一下颠倒，构造一个矩阵：

$$T = H X X^T H^T$$

与上述过程相似，我们得到：

$$\begin{aligned}T &= HXX^TH^T \\&= U\Sigma V^TV\Sigma U^T \\&= U\Sigma^2U^T\end{aligned}$$

我们将投影后的坐标稍加推导：

$$H XV = U\Sigma V^TV = U\Sigma$$

因此主坐标分析可以直接求出投影坐标