

Алгоритм симплекс метода (одноэтапного)

Одноэтапный можно применять только для задач, записанных в канонической форме.

1. Проверить, что задача записана в каноническом виде, выписать начальное допустимое базисное решение

$$f = x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_2 \leq 4, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Получим

$$f = -x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 8, \\ x_2 + x_5 = 4, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

$$x_1=0, x_2=0, x_3=2, x_4=8, x_5=4$$

$$(0, 0, 2, 8, 4) - \text{начальное допустимое базисное решение. } f(0, 0, 2, 8, 4) = 0$$

2. Выразить целевую функцию через нулевые переменные
3. Определим, возрастание какой переменной нам выгодно. Для этого в целевой функции выберем переменную с наибольшим по модулю отрицательным коэффициентом. Если отрицательного коэффициента нет, то решение оптимальное. **x_1 будем вводить в базис, сделаем ненулевой. Ведущий столбец - первый.**
4. Определим, какая переменная выйдет из базиса первой при увеличении выбранной на предыдущем этапе переменной.

Для этого составим для каждого уравнения отношение правых частей к коэффициентам при выбранной на третьем шаге переменной.

$$\left\{ \frac{2}{1}, \frac{8}{1}, \frac{4}{0} \right\} \text{ Выберем минимальное неотрицательное значение.}$$

Берем то уравнение, в котором достигается этот минимум. Базисная переменная в нем первая обратится в ноль. В нашем случае **первой обратится в ноль и выйдет из базиса переменная x_3 . Ведущая строка – первая.**

5. Алгебраические преобразования.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 6, \\ x_2 + x_5 = 4. \end{cases}$$

$$f = -x_2 + x_3 - 2$$

В выбранном на предыдущем шаге уравнении сделаем базисной переменной выбранную на третьем шаге (выделена зеленым – на пересечении ведущей строки и ведущего столбца), **коэффициент при ней сделаем равным 1, и исключим эту переменную из остальных ограничений и целевой функции**, получим ДБР.

$$f(2, 0, 0, 6, 4) = -2$$

1 симплекс таблица

Базис	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	значения	действия
x ₃	1	-2	1	0	0	2	:1
x ₄	1	1	0	1	0	8	-I
x ₅	0	1	0	0	1	4	
f	-1	1	0	0	0	0	+I

2 симплекс-таблица

Базис	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	значения	действия
x ₁	1	-2	1	0	0	2	+2Π'
x ₄	0	3	-1	1	0	6	:3
x ₅	0	1	0	0	1	4	-Π'
f	0	-1	1	0	0	2	+Π'

ДБР (2,0,0,6,4) $f(2,0,0,6,4) = -2$ – значение уменьшилось (было равно нулю)

Следующая итерация. В строке целевой функции есть отрицательные элементы, поэтому решение не оптимально, значение целевой функции еще можно уменьшить.

Максимальный по модулю отрицательный коэффициент при переменной x_2 , будем ее вводить в базис, поэтому **ведущий столбец - второй**

Для определения ведущей строки составим отношения $\left\{ \frac{2}{-2}, \frac{6}{3}, \frac{4}{1} \right\}$, исключим

отрицательные и те, где содержится деление на ноль, из оставшихся найдем минимум

$$\min \left\{ \frac{6}{3}, \frac{4}{1} \right\} = 2 - \text{вторая строка ведущая}$$

3 симплекс-таблица

Базис	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
x ₁	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	6
x ₂	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	2
x ₅	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	2
f	0	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	4

ДБР (6,2,0,0,2) $f(6,2,0,0,2) = -4$ – значение уменьшилось (было -2). Это решение является оптимальным, т.к. в строке целевой функции больше нет отрицательных коэффициентов.

Ответ: $f_{\min}(6,2,0,0,2) = -4$. Ответ к исходной задаче $f_{\max}(6,2) = 4$