

Лабораторная работа №5. Структурирование LATEX-документа

Предварительная подготовка:

- ✓ Изучите раздел «**11. Структурирование документа**» из файла «*Оформление документов в системе LATEX.pdf*» (стр. 22-26).
- ✓ Задачи пятой лабораторной работы:
 - добавить внутренние и внешние ссылки в документ;
 - оформить библиографический список;
 - оформить титульный лист;
 - секционировать документ и создать оглавление.

В результате работы Latex-документ должен принять вид, приведенный в образце.

Порядок выполнения работы:

1. Откройте проект, созданный в ходе предыдущей лабораторной работы № 4 (в котором уже набраны все таблицы, формулы и вставлены графические объекты).
2. Создайте в документе **метки** на все таблицы, рисунки, а также на все пронумерованные формулы.
3. Сделайте активные (кликабельные) ссылки на соответствующие объекты в тексте документа (см. на образце документа элементы, выделенные **желтым цветом**).
4. Вставьте в документ гиперссылки на термины, выделенные в образце **синим цветом**. Гиперссылки должны открывать страницы Интернета, описывающие соответствующие понятия или содержащие информацию об указанных ученох.
5. После заключения на новой странице документа вставьте библиографический список из файла «**Библиография.txt**». Список должен быть оформлен именно как библиография (см. раздел «**11.2 Оформление библиографии**» в файле «*Оформление документов в системе LATEX.pdf*» (стр. 23)), чтобы из текста документа можно было сделать ссылки на литературные источники.
6. Вставьте в документ ссылки на литературные источники (см. на образце документа элементы, выделенные **зеленым цветом**).
7. Задайте цвета и другие параметры созданных ссылок, используя параметры пакета **hyperref** (`\hypersetup{colorlinks..., linkcolor..., urlcolor..., citecolor...}`).
8. Изучите раздел «**11.3 Создание титульного листа**» из файла «*Оформление документов в системе LATEX.pdf*» (стр. 24-25) и оформите в начале Вашего документа титульный лист по образцу.
9. Согласно материалу, описанному в пункте «**11.4 Секционирование документа**» файла «*Оформление документов в системе LATEX.pdf*» (стр. 26), структурируйте документ, оформив разделы и подразделы, а затем на отдельной странице между титульным листом и введением создайте оглавление Вашего документа (см. образец).
Обратите внимание, что пункты «Введение», «Заключение» и «Список литературы» должны входить в оглавление, но при этом **не должны быть пронумерованы**.
10. Документ практически готов, однако, обратите внимание на нумерацию страниц: хотя титульный лист и не нумеруется, но страница с содержанием имеет номер 1, а должна иметь номер 2. Разберитесь самостоятельно и исправьте этот недостаток.

Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

Кафедра цифровых технологий в образовании

РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:

**«НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ»**

Работу выполнил: _____Фамилия И. О.

Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент _____Фамилия И. О.

Оценка: _____

Киров, 2024

Содержание

Введение	3
1 Общие определения	3
2 Критерий знаков (G-критерий)	4
2.1 Описание критерия знаков	4
2.2 Применение критерия знаков	5
3 Критерий Пирсона (хи-квадрат)	6
3.1 Суть критерия хи-квадрат	6
3.2 Применение критерия хи-квадрат	7
4 U-критерий Манна – Уитни	8
4.1 Математическая основа U-критерия	8
4.2 Применение U-критерия	9
Заключение	11
Список литературы	12

Введение

Любые научные исследования, касающиеся использования и обработки полученных данных в различных областях, как в социологии, экономике, физике, так и в педагогике, не могут обойтись без использования математического аппарата, поскольку только строгий математический анализ может однозначно определить эффективность проведенного эксперимента. Для этих целей применяют, как правило, статистические методы при проверке предположений.

Методы математической статистики позволяют выявить различные закономерности по выборочным данным, выдвигать статистические гипотезы и делать обоснованные выводы, используя математическое обоснование. При проведении педагогического эксперимента часто возникают исследовательские задачи, связанные с применением новой методики преподавания, новой образовательной технологии. Методы проверки гипотез могут быть использованы в данном случае для подтверждения эффективности новой методики [4].

Сравнивая на глазок (по процентным соотношениям) результаты до и после какого-либо воздействия (эксперимента), исследователь может прийти к заключению, что если наблюдаются различия в результатах, то имеет место различие в сравниваемых выборках. Однако подобный подход категорически неприемлем, так как для процентов нельзя определить уровень достоверности в различиях. Проценты, взятые сами по себе, не дают возможности делать статистически достоверные выводы. Чтобы доказать эффективность какого-либо воздействия, необходимо выявить статистически значимую тенденцию в смещении (сдвиге) показателей. Для решения подобных задач исследователь может использовать ряд **критериев различия**, о которых пойдет речь в данной работе.

Непараметрические критерии методов математической статистики

Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении. . .
Предсказание становится невозможным

Жюль Анри Пуанкаре

1 Общие определения

Статистические гипотезы – это предположения или допущения о неизвестных параметрах, выражаемых в терминах вероятности, которые могут быть проверены на основании выборочных показателей с помощью статистических критериев [1].

Статистические гипотезы различают по виду предположений, содержащихся в них, при этом рассматривают *нулевую* и *альтернативную* гипотезы.

Существует два типа **статистических методов**:

1. **Параметрические методы** – это количественные методы статистической обработки данных, применение которых требует обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров.

2. **Непараметрические методы** – это количественные методы статистической обработки данных, применение которых не требует знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров.

Статистический критерий (К) (критерий значимости) – это некий параметр, вычисленный по определенному алгоритму, который используется для проверки основной гипотезы. В соответствии с применяемыми методами статистические критерии также бывают:

1. Параметрические критерии:
 - (a) критерий Стьюдента;
 - (b) критерий Фишера;
 - (c) критерий Романовского.
2. Непараметрические критерии:
 - (a) критерий знаков;
 - (b) критерий Пирсона;
 - (c) критерий Манна-Уитни

2 Критерий знаков (G-критерий)

2.1 Описание критерия знаков

Данный критерий был разработан доктором **Джоном Арбетнотом** – шотландским врачом, сатириком и эрудитом в 1710 году. Критерий предназначен для сравнения состояния некоторого свойства у членов двух зависимых выборок на основе измерений [3].



Рис. 1: Джон Арбетнот

Имеется две серии наблюдений над случайными переменными X и Y , полученные при рассмотрении двух **зависимых выборок**. На их основе составлено N пар вида (x_i, y_i) , где x_i, y_i – результаты двукратного измерения одного и того же свойства у одного и того же объекта.

Элементы каждой пары x_i, y_i сравниваются между собой по величине, и паре присваивается знак «+», если $x_i < y_i$, знак «-», если $x_i > y_i$ и «0», если $x_i = y_i$.

Нулевая гипотеза формулируется следующим образом: в состоянии изучаемого свойства нет значимых различий при первичном и вторичном измерениях.

Альтернативная гипотеза: законы распределения величин X и Y существенно различны в одной и той же совокупности при первичном и вторичном измерениях свойства.

Статистика критерия ($T_{\text{эмп}}$) определяется следующим образом: допустим, что из N пар (x_i, y_i) нашлось несколько пар, в которых значения x_i и y_i равны. Такие пары обозначаются знаком «0» и при подсчете значения величины $T_{\text{эмп}}$ не учитываются. Предположим, что за вычетом из числа N числа пар, обозначенных знаком «0», осталось всего n пар. Среди оставшихся n пар подсчитаем число пар, обозначенных знаком «+». Это значение и будет определять статистику критерия $T_{\text{эмп}}$.

Нулевая гипотеза принимается на уровне значимости 0,05, если наблюдаемое значение $T_{\text{эмп}} < T_{\text{крит}}$, где значение $T_{\text{крит}}$ определяется из статистических таблиц для критерия знаков.

2.2 Применение критерия знаков

Пример 1. Учащиеся выполняли контрольную работу, направленную на проверку усвоения некоторого понятия. Пятнадцать учащихся затем предложили электронное пособие, составленное с целью формирования данного понятия у учащихся с низким уровнем обучаемости. После изучения пособия учащиеся снова выполняли ту же контрольную работу, которая оценивалась по пятибалльной системе. Результаты двукратного выполнения работы (в баллах) 15 учащимися запишем в форме таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1: Результаты контрольной работы

	Учащиеся(№)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первое выполнение	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Второе выполнение	2	3	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	2	4	4
Разность отметок	0	+	+	+	+	-	0	+	+	0	+	+	-	+	+

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на диаграмме (см. рис. 2).




Рис. 2: Результаты эксперимента на диаграмме

Проверяется гипотеза H_0 : состояние знаний учащихся не повысилось после изучения пособия. Альтернативная гипотеза H_1 : состояние знаний учащихся повысилось после изучения пособия.

Подсчитаем значение статистики критерия $T_{\text{эмп}}$ равное числу положительных разностей отметок, полученных учащимися. Согласно данным табл. $T_{\text{эмп}} = 10, n = 12$.

Для определения критических значений статистики критерия $T_{\text{крит}}$ используем соответствующие таблицы. Для уровня значимости $\alpha = 0,05$ при $n = 12$ значение $T_{\text{крит}} = 9$. Следовательно выполняется неравенство $T_{\text{эмп}} > T_{\text{крит}}$ ($10 > 9$). Поэтому в соответствии с правилом принятия решения нулевая гипотеза отклоняется на уровне значимости 0,05 и принимается альтернативная гипотеза, что позволяет сделать вывод об улучшении знаний учащихся после самостоятельного изучения пособия.

3 Критерий Пирсона (хи-квадрат)

3.1 Суть критерия хи-квадрат

Предложенный в 1900 году английским математиком **Карлом Пирсоном** критерий согласия χ^2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распределений объектов двух совокупностей на основе измерений по шкале наименований в двух **независимых выборках** [5].



Рис. 3: Карл Пирсон

Предположим, что состояние изучаемого свойства (например, выполнение определенного задания) измеряется у каждого объекта по шкале наименований, имеющей только две взаимоисключающие категории (например, верно – неверно). По результатам измерения состояния изучаемого свойства у объектов двух выборок составляется четырехклеточная таблица (см. табл. 2).

В этой таблице O_{ij} – число объектов в i – ой выборке, попавших в j – ую категорию по состоянию изучаемого свойства; $i = 1, 2$ – число выборок; $j = 1, 2$ – число категорий; N – общее число наблюдений, равное $n_1 + n_2$ или вычисляемое по формуле:

$$N = \sum_{i,j=1}^2 O_{ij} \quad (1)$$

Таблица 2: Результаты измерения

	Категория 1	Категория 2	
Выборка № 1	O_{11}	O_{12}	$O_{11} + O_{12} = n_1$
Выборка № 2	O_{21}	O_{22}	$O_{21} + O_{22} = n_2$
	$O_{11} + O_{21}$	$O_{12} + O_{22}$	$n_1 + n_2 = N$

Тогда на основе данных таблицы 2 можно проверить нулевую гипотезу о равенстве вероятностей попадания объектов первой и второй совокупностей в первую (вторую) категорию шкалы измерения проверяемого свойства, например, гипотезу о равенстве вероятностей верного выполнения некоторого задания учащимися контрольных и экспериментальных классов. При проверке нулевых гипотез не обязательно, чтобы значения вероятностей p_1 и p_2 были известны, так как гипотезы только устанавливают между ними некоторые соотношения (равенство, больше или меньше).

Для проверки рассмотренных выше нулевых гипотез по данным таблицы подсчитывается значение статистики критерия $T_{\text{эмп}}$ по следующей формуле:

$$T = \frac{N \cdot (|O_{11} \cdot O_{22} - O_{12} \cdot O_{21}| - \frac{N}{2})^2}{n_1 \cdot n_2 \cdot (O_{11} + O_{21}) \cdot (O_{12} + O_{22})} \quad (2)$$

где n_1, n_2 – объемы выборок, N – общее число наблюдений, рассчитанное по формуле (1).

Проводится проверка гипотезы $H_0: p_1 \leq p_2$, при альтернативе – $H_1: p_1 > p_2$. Пусть α – принятый уровень значимости. Тогда значение статистики $T_{\text{эмп}}$, полученное на основе экспериментальных данных, сравнивается с критическим значением статистики $T_{\text{крит}}$, которое определяется по таблице с учетом выбранного значения α . Если верно неравенство $T_{\text{эмп}} < T_{\text{крит}}$, то нулевая гипотеза принимается на уровне α . Если данное неравенство не выполняется, то у нас нет достаточных оснований для отклонения нулевой гипотезы.

3.2 Применение критерия хи-квадрат

Пример 2. Проводился эксперимент, направленный на выявление лучшего из учебников, написанных двумя авторскими коллективами для изучения геометрии 9 класса. Для проведения эксперимента методом случайного отбора были выбраны два района. Учащиеся первого района (20 классов) обучались по учебнику № 1, учащиеся второго района (15 классов) обучались по учебнику №2.

Рассмотрим методику сравнения ответов учителей экспериментальных школ двух районов на один из вопросов анкеты: "Доступен ли учебник в целом для самостоятельного чтения и помогает ли он усвоить материал, который учитель не объяснял в классе?" (Ответ: да – нет.)

Ответы 20 учителей первого района и 15 учителей второго района распределим на две категории и запишем в форме таблицы 3.

Подсчитаем статистику критерия по формуле (2):

$$T = \frac{35 \cdot (|15 \cdot 8 - 7 \cdot 5| - \frac{35}{2})^2}{20 \cdot 15 \cdot (15 + 7) \cdot (5 + 8)} = 1.86$$

Таблица 3: Ответы учителей

	Да	Нет	
Выборка № 1	$O_{11} = 15$	$O_{12} = 5$	$n_1 = O_{11} + O_{12} = 20$
Выборка № 2	$O_{21} = 7$	$O_{22} = 8$	$n_2 = O_{21} + O_{22} = 15$
	$O_{11} + O_{21} = 22$	$O_{12} + O_{22} = 13$	$N = n_1 + n_2 = 35$

По таблице для одной степени свободы ($v = 1$) и уровня значимости $\alpha = 0,05$ найдем $T_{\text{крит}} = 3.84$. Отсюда верно неравенство $T_{\text{эмп}} < T_{\text{крит}}$ ($1.86 < 3.84$). Согласно правилу принятия решений, полученный результат не дает достаточных оснований для отклонения нулевой гипотезы, то есть результаты проведенного опроса учителей двух экспериментальных районов не дают достаточных оснований для отклонения предположения об одинаковой доступности учебников №1 и 2 для самостоятельного чтения учащимися.

4 U-критерий Манна – Уитни

Этот метод сравнения двух выборок признается наиболее чувствительным и мощным среди прочих непараметрических критериев. Он был предложен в 1945 году **Фрэнком Уилкоксоном**. В 1947 году он был существенно переработан и расширен **Х.Б.Манном** и **Д.Р.Уитни**, по именам которых и называется.



Рис. 4: Ф. Уилкоксон, Х.Б. Манн и Д.Р. Уитни (слева направо)

4.1 Математическая основа U-критерия

Согласно нулевой гипотезе, сравниваемые совокупности имеют одинаковые распределения [2]. Техника метода состоит в том, что все варианты сравниваемых совокупностей ранжируют в одном общем ряду: каждому значению присваивают ранг, порядковый номер. При этом одинаковым (повторяющимся) значениям вариант должен соответствовать один

и тот же средний ранг (они как бы «делят места»). После этого ранги вариантов суммируют отдельно по каждой выборке:

$$R_1 = \sum_{i=1}^{n_1} r_i \quad (3)$$

$$R_2 = \sum_{j=1}^{n_2} r_j \quad (4)$$

и вычисляют величину критерия:

$$T = \frac{U - 0.5 \cdot n_1 \cdot n_2}{\sqrt{(n_1 \cdot n_2 \cdot (n + 1)/12)}} \quad (5)$$

где $U = \max(U_1, U_2)$ – максимальное значение из двух величин:

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + 0.5 \cdot n_1(n_1 + 1) - R_1 \quad (6)$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + 0.5 \cdot n_2(n_2 + 1) - R_2 \quad (7)$$

Если выборка достаточно велика ($n > 20$), величина статистики $T_{\text{эмп}}$ сравнивается с табличным значением критерия Стьюдента для $df = \infty$ и $\alpha = 0.1$ (то есть для верхней 95% области нормального распределения).

4.2 Применение U-критерия

Пример 3. Сравним результаты тестирования групп X и Y, обучаемых по различным методикам, представленные в табл. 4.

Таблица 4: Результаты тестирования

X	29	31	38	41	43	44	45	71	
Y	31	50	51	52	52	52	54	62	62

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на графике (см. рис. 5).




Рис. 5: Результаты тестирования на графике

Из таблицы 4 следует, что $n_1 = 8$, $n_2 = 9$. Высокие коэффициенты вариации (30 и 17%) говорят о том, что распределения признаков, скорее всего, не соответствуют нормальному. Поэтому сравнивать средние следует с помощью непараметрического критерия.

Упорядочим все значения X и Y в новую таблицу 5 так, чтобы значения каждой выборки располагались в двух отдельных рядах (X , Y). Такое расположение упрощает назначение рангов (ряды r_1, r_2) и суммирование рангов (R), рассчитанные по формулам (3) и (4).

Таблица 5: Ранжирование результатов тестирования

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	R
X	29		31	38	41	43	44	45									71	
Y		31							50	51	52	52	52	54	62	62		
r_1	1		2.5	4	5	6	7	8									17	50.5
r_2		2.5							9	10	12	12	12	14	15.5	15.5		102.5

Вычисляем по формулам (6) и (7):

$$U_1 = 9 \cdot 8 + 0.5 \cdot 9 \cdot (9 + 1) - 50.5 = 66.5$$

$$U_2 = 9 \cdot 8 + 0.5 \cdot 8 \cdot (8 + 1) - 102.5 = 5.5$$

$$U = \max(U_1, U_2) = 66.5$$

Подставляя найденные значения в формулу (5), находим $T_{\text{эмп}}$:

$$T = \frac{66.5 - 0.5 \cdot 9 \cdot 8}{\sqrt{(9 \cdot 8 \cdot 10/12)}} = 3.81$$

Полученное значение (3.81) больше табличного $T_{\text{крит}}(0.1, \infty) = 1.65$, следовательно, различия между выборками достоверны.

Заключение

Для более достоверного подтверждения результатов исследований, их визуального представления используются методы математической статистики, которые могут быть как параметрическими, так и непараметрическими. Первые обладают большей статистической мощностью в сравнении со вторыми. Это означает, что если в природе существует какая-либо закономерность, то с наибольшей вероятностью эта закономерность будет выявлена с помощью параметрических критериев. Однако такие критерии возможно применять только при одновременном соблюдении двух условий: количественном характере вариации и нормальном распределении.

Если же эти условия не выполняются (например, высокие коэффициенты вариации могут указывать на то, что распределения признаков, скорее всего, не соответствуют нормальному), то используют непараметрические критерии, которые обычно проще и не требуют сложных расчетов.

В данной работе были рассмотрены три непараметрических критерия методов математической статистики: критерий знаков, критерий Пирсона (хи-квадрат) и U-критерий Манна – Уитни. По каждому критерию приведено подробное описание алгоритма расчетов, указаны границы применимости и приведен конкретный пример применения критерия для оценки результатов эксперимента.

Следует, однако, отметить, что список непараметрических критериев не ограничивается указанными. Выделяют также следующие непараметрические критерии [5]:

- Q-критерий Розенбаума;
- критерий Колмогорова-Смирнова;
- критерий Андерсона-Дарлинга;
- критерий согласия Кёйпера
- и др.

Список литературы

- [1] Бородачёв, С. М. Методы математической статистики : учебное пособие / С. М. Бородачёв. – Екатеринбург : УрФУ, 2012. – 129 с.
- [2] Крохалев, В.Я. Статистика : уч. пособие / В.Я. Крохалев, С.А. Скопинов, В.А. Телешев — Екатеринбург : Изд-во УГМУ, 2018
- [3] Лемешко, Б.Ю. Непараметрические критерии согласия. Руководство по применению / Б.Ю. Лемешко– М.: ИНФРА-М, 2014.
- [4] Середенко, П. В. Методы математической статистики в психолого-педагогических исследованиях: учеб. пособ. / П. В. Середенко, А. В. Должикова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2009.
- [5] Шелонцев, В.А. Непараметрические методы статистики: Учебное пособие / В.А. Шелонцев, Л.Н. Шелонцева. - Омск: Полиграфический центр КАН – 2016.