**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

Un peuple-un but-une foi

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE

PROGRAMME NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

PNLP

# PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU SENEGAL 2021-2025

# RAPPORT DE FORMATION

**Intitulé de la formation : le paludisme au Sénégal**

**Nom des formateurs : Mr SYLLA**
**Mr FALL**
**Date et lieu : 30 juillet 2024 au district nord de Dakar**

**Objectifs :**

- **Définir le paludisme**
- **Connaitre l'épidémiologie de la maladie**
- **Reconnaitre les types de paludisme**
- **Connaitre les ponts clés de la prévention anti palustre**

# PLAN

I. **Approche**
   1. **Présentation**
   2. **Etude épidémiologie**

II. **Les types de paludisme selon la gravité**
   1. **Paludisme simple**
   2. **Paludisme grave**

# I. Approche

## 1. Présentation

Le séminaire a débuté vers 10h par des mots de bienvenus du district suivi de la présentation des participants.

## 2. Epidémiologie

Apres 30 minutes, la session est ouverte par une étude épidémiologique du paludisme. Ainsi, le paludisme a été définie comme une maladie parasitaire due au développement dans l'organisme du parasite intracellulaire (plasmodium falciparum) transmis à l'homme par la piqure d'un insecte appelé anophèle femelle. Il existe plusieurs types de plasmodium mais celui falciparum est le dominant au Sénégal avec un taux de 98%.

Dans son processus de transmission, trois choses sont inclus : l'agent pathogène (plasmodium), le vecteur (anophèle femelle) et réservoir.
Ainsi, le diagnostic est posé devant une fièvre confirmée par le TDR ou GE ou FS.
Cependant, la problématique épidémiologie est caractérisée par l'ampleur et la gravité.
Ce qui nous fait entrer dans la typologie du paludisme en fonction de la gravité vers 13H30.

# II. Types de paludisme

Ainsi deux types de paludisme ont été retenus : le paludisme simple et le paludisme grave.

## 1. Le paludisme simple

Il est défini comme tout cas de fièvre sans signe de gravité confirmé par la biologie (TDR, GE, FS).
Le TDR est fait en cas de fièvre, d'un antécédent de fièvre, de MAS ou de VIH.
Ainsi tous cas de paludisme simple, le diagnostic doit être traité par les ACT en respectant la posologie et la durée requise du traitement.

## 2. Le paludisme grave

Il s'agit de tous cas de fièvre avec des signes de gravité associé à un TDR+ ou GE+.

Ces signes de gravité peuvent être cliniques ou biologiques.

Par exemple : trouble de la conscience, prostration, Ictère, hypoglycémie, anémie sévère etc.
Ainsi tous cas de paludisme grave confirmé doit être traité en 1$^{ier}$ intension par l'arthésunate injectable dont la posologie est en fonction du poids et selon la durée requise. En son absence, l'arthéméter et la quinine peuvent être utilisé (injectable).
Cependant, tous cas de paludisme grave doit bénéficier d'un relais orale de 3 jours par les ACT. Cette partie est suivie de la pose déjeunée vers 16h.
Apres 30 minutes, la séance a repris par une discussion sur les grandes lignes déjà développées et elle est clôturée vers 17h par un rendez-vous le lendemain.