

HW4

Problem 13

$$(a) \quad P_2(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(0-2)(0-3)} [1] + \frac{(x-0)(x-3)}{(2-0)(2-3)} [3] + \frac{(x-0)(x-2)}{(3-0)(3-2)} [0]$$

(b) is similar to part (a).

$$(c) \quad P_3(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(-1-2)(-1-3)(-1-5)} [0] + \frac{(x+1)(x-3)(x-5)}{(\cancel{2+1})(\cancel{2-3})(\cancel{2-5})} [1] +$$

$$\frac{(x+1)(x-2)(x-5)}{(\cancel{3+1})(\cancel{3-2})(\cancel{3-5})} [1] + \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(\cancel{5+1})(\cancel{5-2})(\cancel{5-3})} [2]$$

Problem 3.

Problem 14

$$(a) \quad P_3(x) = \frac{(x-1850)(x-1900)(x-2000)}{(1800-1850)(1800-1900)(1800-2000)} [280] +$$

$$\frac{(x-1800)(x-1900)(x-2000)}{(50)(-50)(-1500)} [283] +$$

$$\frac{(x-1800)(x-1850)(x-2000)}{100(50)(-100)} [291] +$$

$$\frac{(x-1800)(x-1850)(x-1900)}{(200)(150)(100)} [370]$$

$$(b) \quad P_3(1950)$$

$$P_3\left(\frac{2050}{810}\right)$$

Problem 4

Problem 15

$$|f(x) - p_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x+1)x(x-1) \right| \quad \text{on } [-1, 1]$$

$$f(x) = e^x \quad f^{(3)}(x) = e^x.$$

$$|f(x) - p_2(x)| \leq \frac{|f^{(3)}(\xi)|}{6} |x^3 - x| \quad \text{on } [-1, 1]$$

$$\max |f^{(3)}(\xi)| = e^1$$

Let $h(x) = x^3 - x$. Now, let's find the maximum for $h(x)$

$$h'(x) = 3x^2 - 1 = 0$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}^3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$\therefore \max_{x \in (-1, 1)} |h(x)| = \left| \frac{3-1}{3\sqrt{3}} \right|$$

$$= \frac{2}{3\sqrt{3}}$$

$$\therefore |f(x) - p_2(x)| \leq \frac{e}{6} \frac{2}{3\sqrt{3}}$$

Problem 5. Problem 16

$$(a). \quad S(x) = \begin{cases} S_0(x) = x^3 + x - 1 \\ S_1(x) = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 - (x-1)^3 \end{cases}$$



$$S_0(1) = 1, \quad S_1(1) = 1.$$

$$\Rightarrow \boxed{S_0(1) = S_1(1)} \text{ ok } \checkmark$$

$$S_0'(1) \stackrel{?}{=} S_1'(1)$$

$$S_0'(x) = 3x^2 + 1 \Rightarrow S_0'(1) = 4$$

$$S_1'(x) = 3 + 6(x-1) - 3(x-1)^2 \Rightarrow S_1'(1) = 3$$

$$\Rightarrow S_0'(1) \neq S_1'(1)$$

cubic.
Not a spline.

$$(b) \quad S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 2x^3 + x^2 + 4x + 5 & \text{on } [0, 1] \\ S_1(x) = 12 + 12(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3 & \text{on } [1, 2] \end{cases}$$

* Continuity of $S_0(x)$ and $S_1(x)$ at $x=1$.

$$S_0(1) = 2 + 1 + 4 + 5 = 12$$

$$S_1(1) = 12$$

$$S_0(1) = S_1(1)$$

* Continuity of the 1st derivatives at $x=1$.

$$S'_0(x) = 6x^2 + 2x + 4$$

$$S'_1(x) = 12 + 14(x-1) + 3(x-1)^2$$

$$S'_0(1) = 12 = S'_1(1)$$

* Continuity of the 2nd derivative at $x=1$.

$$S''_0(x) = 12x + 2$$

$$S''_1(x) = 14 + 6(x-1)$$


$$S''_0(1) = S''_1(1) = 14$$

\Rightarrow Cubic spline!

Problem 6

Problem 17

Natural cubic spline through $(0,3)$, $(1,2)$, and $(2,1)$


 $+d_0x^3$

$$S_0(x) = a_0 + b_0(x-0) + c_0(x-0)^2 + d_0(x-0)^3 = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$$

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x-1) + c_1(x-1)^2 + d_1(x-1)^3$$

$$S_0(0) = 3$$

$$\boxed{a_0 = 3} \quad \text{--- (1)}$$

$$S_1(1) = 2$$

$$\boxed{a_1 = 2} \quad \text{--- (3)}$$

$$S_0(1) = 2$$

$$\boxed{a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 2} \quad \text{--- (2)}$$

$$S_1(2) = 1$$

$$\boxed{a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 1} \quad \text{--- (4)}$$

$$S'_0(x) = b_0 + 2c_0x + 3d_0x^2$$

$$S'_1(x) = b_1 + 2c_1(x-1) + 3d_1(x-1)^2$$

Continuity of the 1st derivative.

$$S_0'(1) = S_1'(1)$$

$$\boxed{b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1} \quad \text{--- (5)}$$

$$S_0''(x) = 2c_0 + 6d_0 x$$

$$S_1''(x) = 2c_1 + 6d_1(x-1)$$

Continuity of the 2nd derivative.

$$S_0''(1) = S_1''(1)$$

$$\boxed{2c_0 + 6d_0 = 2c_1} \quad \text{--- (6)}$$

Naturall BC^s

$$S_0''(0) = 0$$

$$\boxed{2c_0 = 0} \quad \text{--- (7)}$$

$$S_1''(2) = 0$$

$$\boxed{2c_1 + 6d_1 = 0} \quad \text{--- (8)}$$