

Tartalomjegyzék

1. Saját jelölések	2
2. Vektorterek	3
3. Alterek összege	4
4. Konjugált mátrixok	5
5. Mátrixok sajátfelbontása	6
6. Spektrálfelbontás	7
7. Bilineáris leképezések	8
8. Euclides-terek	9
9. Ortogonális bázisok	10
10. Ortogonális kiegészítő	11
11. Adjungált	11
12. Ortogonális transzformációk	12
13. Szemiortogonális mátrixok	13

1. Saját jelölések

| Példa

Jelölés Az $\{i \in \mathbb{N} | 1 \leq i \leq n\}$ halmazt \underline{n} jelöli.

Jelölés A szokásos halmazokon értelmezett kivonást a $-$ jel fogja jelölni \ helyett

| A nemnulla valós számok halmaza: $\mathbb{R} - \{0\}$

2. Vektorterek

1 Deffiníció Ha (X, \leq) parciálisan rendezett halmaz, ha \leq parciális rendezés.

2 Deffiníció Ha (X, \leq) parciálisan rendezett halmaz, ekkor $a \in X$ maximális, ha $\forall b \in X, a \leq b$ esetén $a = b$.

3 Deffiníció Ha (X, \leq) parciálisan rendezett halmaz, ekkor $Y \subset X$ lánc, ha (Y, \leq) teljesen rendezett halmaz.

3. Alterek összege

Jelölés V_K jelöli a V vektorteret K test felett, de következetesség miatt mindig megjegyezzük, hogy " V_K vektortér", ami még mindig rövidebb, mint a hosszú " V K test feletti vektortér".

4 Definíció Ha V_K vektortér és $V_1, \dots, V_n \leq V$, akkor ezen alterek **összege**:

$$V_1 + \dots + V_n = \{v_1 + \dots + v_n \mid v_i \in V_i, i \in \underline{n}\}$$

5 Definíció Ha V_K vektortér és $V_1, \dots, V_n \leq V$, akkor ezen alterek **direkt összege**, olyan alterek összege, aminek minden eleme egyértelműen áll elő $v_1 + \dots + v_n$ ($\forall v_i \in V_i, i \in \underline{n}$) alakban.

6 Definíció V_K vektortér, $U, W \leq V$, $V = U \oplus W$, $\pi : V \rightarrow V$ lineáris leképezés, $u \in U$, $w \in W$, hogy $v = u + w \in V$ esetén $\pi(v) = u$. Ekkor π -t az **U altérre való W irányú vetítésnek nevezzük.**

4. Konjugált mátrixok

7 Deffiníció $A, B \in K^{n \times n}$ A és B **konjugáltak** (hasonlók), ha létezik egy olyan $X \in K^{n \times n}$, melyre $B = X^{-1}AX$.

8 Deffiníció V_K vektortér, $f : V \rightarrow V$ lineáris leképezés a V **endomorfizmusa**.

Jelölés $\text{End}_K V$

9 Deffiníció V_K vektortér, $f \in \text{End}_K V$, $t \in K$:

1. $t \in K$ **sajátértéke** f -nek, ha létezik egy olyan nemnulla V -beli vektor, amire $f(v) = tv$,
2. $t \in K$ sajátérték, ekkor a V -beli v vektor a t -hez **tartozó sajátvektor**, ha $f(v) = tv$.
3. az f összes sajátértékének halmaza f **spektruma**.

10 Deffiníció Ha $n \geq 1$, $A \in K^{n \times n}$, ekkor A **mátrix sajátértékei, sajátvektorai, spektruma** az $f_A : K^n \rightarrow K^n$, $x \mapsto Ax$ endomorfizmus sajátértékei, sajátvektorai és spektruma.

11 Deffiníció V_K vektortér, $f \in \text{End}_K V$, az S_t a t -hez tartozó sajátvektorokat tartalmazó halmaz, akkor $S \cup 0_V$ az f endomorfizmus t -hez tartozó **sajátaltère**.

Jelölés $\text{Eig}_{f,t}$

12 Deffiníció V_K vektortér $f \in \text{End}_K V$, t változó, akkor $\det(f - tI)$ polinom az f **karakterisztikus polinomja**.

Jelölés $\text{char}_f(t)$

13 Deffiníció V_K vektortér, $f \in \text{End}_K V$, $t \in K$, ekkor $\dim(\text{Eig}_{f,t})$ a t sajátértékének **geometriai multipllicitása**.

14 Deffiníció V_K vektortér, t_0 az $f \in \text{End}_K V$ sajátértéke, ekkor t_0 **algebrai multipllicitása** k , ha t_0 pontosan k -szoros gyöke $\text{char}_f(t)$ -nek.

15 Deffiníció V_K vektortér, ekkor $f \in \text{End}_K V$ **diagonalizálható**, ha létezik egy \mathcal{B} bázis, amiben $[f]_{\mathcal{B}}$ diagonális.

5. Mátrixok sajátfelbontása

16 Definíció $A \in K^{n \times n}$, $y \in K^n - 0$, akkor az y^T sorvektor az A baloldali sajátvektora, ha $y^T A = \lambda y^T$

17 Definíció $A \in K^{n \times n}$ diagonalizálható mátrix sajátfelbontása PDP^{-1} , ahol P i -edik oszlopa az A mátrixhoz tartozó t_i -edik egyik sajátvektora (jelölje ezt most \underline{x}_i), P^{-1} i -edik sora az A mátrix t_i -hez tartozó egyik baloldali sajátvektora (jelölje most ezt \underline{y}_i). Ekkor:

$$\sum_{i=1}^n t_i \underline{x}_i \underline{y}_i$$

a sajátfelbontás diadikus alakja.

6. Spektrálfelbontás

18 Definíció Ha $A \in K^{n \times n}$ -nak létezik sajátfelbontása és P_i a $\text{Eig}_{A,t(i)}$ -re való vetítés mátrixa (a vetítés iránya a többi sajátaltér direkt összege), akkor A **spektrálfelbontása**:

$$A = t_1 P_1 + \dots + t_k P_k$$

7. Bilineáris leképezések

Deán vannak itt dolgok, amit nem akarok leírni.

Dia (definíció)tartalma:

1. bilineáris leképezés
2. szimmetrikus bilineáris leképezés
3. Gram-mátrix
4. baloldali, jobboldali mag, reguláris
5. ortogonalitás bilineáris leképezésre nézve
6. ortogonális kiegészítő
7. Tehetetlenségi Tétel

8. Euclides-terek

19 Deffiníció $V_{\mathbb{R}}, \beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineáris leképezés, ekkor β **pozitív definit**, ha szimmetrikus és minden V -beli v vektorra $\beta(v, v) \geq 0$, továbbá $\beta(v, v) = 0$ pontosan akkor, ha $v = 0$. Másik elnevezés a **skalárszorzat**.

20 Deffiníció

1. $V_{\mathbb{R}}, \beta := \langle \cdot, \cdot \rangle : V^2 \rightarrow \mathbb{R}$ skalárszorzat (másnéven belsőszorzat), ekkor a $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pár **Euclides-tér** (inner product space).
2. $v \in V$, akkor $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ a v **normája**
3. $v, w \in V$, akkor $d(v, w) = \|v - w\|$ a v és a w **távolsága**

Jelölés $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E$ jelöli a $V_{\mathbb{R}}$ vektorteret, amiben $\langle \cdot, \cdot \rangle$ vektorszorzat. Ha emellett V még véges dimenziós is, akkor ezt $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_{E, \infty}$ jelöli.

21 Deffiníció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E$ ekkor ha $v, w \in V$, akkor a **szögük**:

$$\arccos \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

22 Deffiníció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E$ és $v, w \in V$, akkor $v \perp_{\langle \cdot, \cdot \rangle} w$, ha v és w szöge $\frac{\pi}{2}$.

9. Ortogonális bázisok

23 **Definíció** $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E$ $S \subset V$ **ortogonális** részhalmaz, ha minden $v, w \in S$ esetén $v \perp_{\langle \cdot, \cdot \rangle} w$, valamint S **ortonormált**, ha ortogonális és minden S -beli v -re $\|v\| = 1$, és S **ortonormált bázis**, ha ortonormált és bázis.

24 **Definíció** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **pozitív definit mátrix**, ha $\beta(x, y) = x^T A y$ pozitív definit pontosan akkor, ha A szimmetrikus és $x^T A x > 0$ minden nemnulla $\mathbb{R}^n - 0$ -beli vektorra.

10. Ortogonális kiegészítő

11. Adjungált

25 Definiáció $(V_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)_E, (V_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)_E, f : V_1 \rightarrow V_2$ lineáris leképezés $f^* : V_2 \rightarrow V_1$ lineáris függvényt az f adjungáltjának nevezzük, ha minden $v \in V_1, w \in V_2$ -beli vektorokra:

$$\langle f(v), w \rangle_2 = \langle v, f^*(w) \rangle_1.$$

26 Definiáció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E, f \in \text{End}_{\mathbb{R}} V$, ekkor f önadjungált, ha $f^* = f$.

27 Definiáció $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonális, ha $X^T X = I$ (azaz $X^T = X^{-1}$).

12. Ortogonális transzformációk

28 Definíció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_E$, $f \in \text{End}_{\mathbb{R}} V$, ekkor f **ortogonális transzformáció**, ha bijektív (izomorfizmus) és minden V -beli v és w esetén:

$$\langle v, w \rangle = \langle f(v), f(w) \rangle.$$

29 Definíció A (G, \cdot) páros **csoport**, ha $G \neq \emptyset$.

30 Definíció A (G, \cdot) páros **Abel-csoport**, ha (G, \cdot) csoport és \cdot kommutatív.

Jelölés $O_{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ (vagy $O_{\langle \rangle}$).

31 Definíció Ha $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_{E, \infty}$, $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ $A \in V$ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ -ortogonális leképezés mátrixa, ekkor az ilyen leképezések csoportja a mátrixszorzásra nézve az **n -edrendű ortogonális csoport**.

Jelölés $O_{n, \langle \rangle}(\mathbb{R})$

32 Definíció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_{E, \infty}$, $f \in O(V)$, ekkor az olyan f -ek melyekre $\det(f) = 1$ a **speciális ortogonális csoportot** alkotnak.

Jelölés $SO(V)$

33 Definíció Ha $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mátrix:

$$A = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

alakú, akkor **kétdimenziós forgásmátrix**.

Jelölés R_t

34 Következmény Két síkra való tükrözés tengely körüli forgatás.

13. Szemiortogonális mátrixok

35 Definíció $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ **szemiortogonális**, ha az oszlopok vagy sorok ortonormált bázist (vagy csak rendszert?) alkotnak. Tehát $A^T A = I_n$, ha az oszlopok alkotnak, $AA^T = I_m$, ha a sorok alkotnak ortonormált rendszert.

36 Definíció A teljes oszloprangú ($\text{rk } A = n$) $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ **QR-felbontása** $QR = A$, ha $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ szemiortogonális, $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pedig felsőháromszögmátrix, ahol a diagonális elemek nemnegatívak.

37 Definíció $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)_{E, \infty}$, $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, szimmetrikus, bilineáris, akkor β :

1. **pozitív definit**, ha $\forall v \in V : \beta(v, v) \geq 0$ és $\beta(v, v) = 0 \leftrightarrow v = 0$,
2. **pozitív semidefinit**, ha $\forall v \in V : \beta(v, v) \geq 0$,
3. **negatív definit**, ha $\forall v \in V : \beta(v, v) \leq 0$ és $\beta(v, v) = 0 \leftrightarrow v = 0$,
4. **negatív semidefinit**, ha $\forall v \in V : \beta(v, v) \leq 0$,
5. **indefinit**, ha $\exists v, w : \beta(v, v) > 0, \beta(w, w) < 0$.