

ПАМЯТКА: ПРЕДНИЗОЛОН И ЦИКЛОФОСФАМИД

Инструкция по дозированию, снижению, контролю и побочным эффектам при ХБП

ПАЦИЕНТ: Рамзес (Кане-Корсо, 11 лет) | ДИАГНОЗЫ: Лимфома / Хилоторакс + ХБП 2 ст. IRIS

1. ПРЕДНИЗОЛОН (PREDNISOLONE / PREDNISONE)

КРИТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО: НЕ НАЧИНАТЬ ДО БИОПСИИ / ЦИТОЛОГИИ!

Глюкокортикоиды вызывают массивный апоптоз лимфоидных клеток за 24–48 часов. Раннее назначение Преднизолона **стирает гистологическую и цитологическую картину**, делая точную верификацию лимфомы невозможной, и провоцирует **множественную лекарственную устойчивость (MDR)**.

Преднизолон входит в протокол СНОР как необходимый антинеопластический компонент. Его прием требует четкого соблюдения графика плавного снижения дозировки (tapering).

Этап цикла	Суточная доза	Режим приема	Цель и клинические примечания
Неделя 1 (Дни 1–7)	2.0 мг/кг (40 мг/м ²)	1 раз в день, утром с едой	Индукция ремиссии, снижение опухолевой массы и выпота.
Неделя 2 (Дни 8–14)	1.5 мг/кг	1 раз в день, утром с едой	Первое снижение дозы (-25%) в день Циклофосфамида.
Неделя 3 (Дни 15–21)	1.0 мг/кг	1 раз в день, утром с едой	Поддерживающая доза перед вторым Винкристином.
Неделя 4 (Дни 22–28)	0.5 мг/кг	1 раз в день или через день	Завершение индукции. Подготовка к перерыву.

Как правильно снижать дозу и контролировать прием:

- Запрет резкой отмены:** Внезапное прекращение вызовет надпочечниковый криз, гипотензию, рвоту и резкий рецидив выпота.
- Плавное снижение:** Доза уменьшается на 25% каждые 7 дней под строгим наблюдением врача.
- Контроль глюкозы и ЖКТ:** У Рамзеса гипогликемия (2.42 ммоль/л). Преднизолон поднимет глюкозу. Принимать строго с едой. При черном стуле (мелене) — немедленно отменить!

2. ЦИКЛОФОСФАМИД (CYCLOPHOSPHAMIDE / CYTOXAN)

Циклофосфамид — алкилирующий цитостатик (2-я неделя СНОР). Учитывая ХБП 2 стадии у Рамзеса, требуется редукция дозы и усиленная уропротекция.

Параметр	Стандарт	Коррекция для Рамзеса (ХБП 2 ст.)	Меры безопасности и контроль
Дозировка	250 мг/м ² PO	Редукция на 15–20% (~200 мг/м ²)	Предотвращает накопление токсичных метаболитов при почечном клиренсе.
Время приема	Любое время	Строго УТРОМ	Собака бодрствует, пьет воду и часто опорожняет пузырь в течение дня.
Уропротекция	Питьевой режим	Фуросемид (1–2 мг/кг) + питье	Форсированный диурез вымывает акролеин и предотвращает геморрагический цистит.
Контроль крови	ОКВ в день приема	ОКВ перед приемом + День 7	ANC > 1500/мкл перед приемом и забор на 7-й день для оценки надира нейтрофилов.

Как контролировать токсичность Циклофосфамида:

- Защита от геморрагического цистита:** Утренний прием + Фуросемид + выгул каждые 2 часа. При каплях крови в моче — отмена!
- Контроль Надира (День 7):** Измерение ANC через неделю. Если нейтрофилы < 750/мкл — старт антибиотиков (энрофлоксацин).

3. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И МЕР ИХ КУПИРОВАНИЯ

Препарат	Побочный эффект	Симптомы у собаки	Что делать владельцу / Врачебная мера
Преднизолон	Полиурия / Полидипсия	Усиленная жажда, частое мочеиспускание, одышка	Воду не ограничивать! Пройдет при снижении дозы.
Преднизолон	Гастротоксичность / Язвы	Тошнота, рвота, черный стул (мелена)	Давать строго с едой. При черном стуле — отмена и омепразол.
Циклофосфамид	Геморрагический цистит	Кровь в моче, частые болезненные потуги	Утренний прием + Фуросемид + выгул. При крови — отмена!
Циклофосфамид	Миелосупрессия (Надир)	Вялость, лихорадка (>39.2 °C), инфекция	ОКВ на 7 день. При лихорадке и ANC<750 — антибиотики.
Оба препарата	Тошнота / Анорексия	Слюнотечение, отказ от корма, рвота	Серения (Маропитант 2 мг/кг) за 1 час до приема или при тошноте.

4. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ И ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ

Заполняйте данный чек-лист на каждой неделе 4-недельного цикла СНОР. Это позволит отследить надир нейтрофилов и предотвратить осложнения со стороны почек и мочевого пузыря.

Неделя / Препарат	План приема и сдачи анализов	ЧДД во сне	Температура / Стул	Отметка / Статус
Неделя 1 (Винкристин + Преднизолон)	• ОКВ + Биохимия почек • Преднизолон 2.0 мг/кг (утро, с едой)	___ в мин (<30 норма)	Т: ___ °C Стул: ____	[] Анализы сданы [] Доза принята
Неделя 2 (Циклофосфамид)	• Преднизолон 1.5 мг/кг • Утром: Циклофосфамид + Фуросемид	___ в мин (<30 норма)	Т: ___ °C Моча: ____	[] Выгул каждые 2 ч [] Доза принята
День 7 после Циклоф. (День Надира)	• Контрольный ОКВ (оценка ANC нейтрофилов)	___ в мин	ANC: ____ /мкл PLT: ____ /мкл	[] ОКВ сдан [] ANC > 1500 (ОК)
Неделя 3 (Винкристин)	• Преднизолон 1.0 мг/кг • В/в введение Винкристина в клинике	___ в мин	Т: ___ °C Стул: ____	[] Винкристин введен [] Доза принята
Неделя 4 (Доксорубицин)	• Преднизолон 0.5 мг/кг • Доксорубицин + ЭхоКГ сердца	___ в мин	Т: ___ °C ЭхоКГ: ____	[] Премедикация дана [] ЭхоКГ выполнено

- 🚩 **КРАСНЫЕ ФЛАГИ: КОГДА СРОЧНО ЗВОНИТЬ ВРАЧУ ИЛИ ЕХАТЬ В КЛИНИКУ**
1. Появление капель крови или выраженная боль при мочеиспускании (геморрагический цистит).

2. Повышение температуры тела выше 39.2 °C (102.5 °F) на фоне вялости (фебрильная нейтропения).

3. ЧДД во сне превышает 35 движений в минуту или появление дыхания с открытым ртом.

4. Повторная многократная рвота или черный дегтеобразный стул (мелена).