

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ДРУГ»

Исследование выпотной жидкости: Цитология & Биохимия

Официальный лабораторный протокол № 105732-178203 | Дата отбора: 01.09.2026 | Выдача: 02.09.2026

Пациент:	Рамзес (собака)	Владелец:	Гаврашенко Анна Владимировна
Порода / Возраст:	Кане-корсо / 11 лет	Пол / Статус:	Кобель (кастрирован)
Вид материала:	Плевральный выпот	Место отбора:	Грудная полость (пункция)

1. Физико-химические и органолептические свойства

Показатель	Результат	Ед. изм.	Интерпретация
Цвет (Колір)	Красный (червоний)	—	Геморрагический компонент / примесь эритроцитов
Прозрачность (Прозорість)	Мутная (мутна)	—	Высокая клеточность и липидная взвесь
Количество осадка	Значительное (значна)	—	Богатый клеточный и фибринозный осадок
Удельный вес (Питома вага)	1.026	—	Высокая плотность (характерно для экссудатов)
Ядерные клетки (WBC)	2.90	тыс/мкл	Умеренная цитозность выпота
Гематокрит (HCT)	2.6	%	Умеренное геморрагическое примешивание

2. Биохимический профиль выпотной жидкости

Показатель	Результат	Ед. изм.	Диагностическое значение
Общий белок (Загальний білок)	50.0	г/л	Высокобелковый экссудат (>30 г/л)
Альбумин	24.3	г/л	Соотношение Альбумин/Глобулин = 0.9
Триглицериды (Тригліцериди)	3.87	ммоль/л	Прямой маркер хилоторакса (выша сыворотки)
Холестерин	2.81	ммоль/л	Соотношение Холестерин / Триглицериды < 1.0
Глюкоза	4.66	ммоль/л	Сохранена (отсутствие бактериального потребления)

3. Цитологическая картина выпота

Клеточный тип	Процент / Кол-во	Характеристика и морфология
Нейтрофилы	57 %	Преобладающая фракция, сегментоядерные и палочкоядерные формы
Лимфоциты	30 %	Смешанный состав (зрелые + атипичные лимфоидные элементы)
Эозинофилы	7 %	Умеренная эозинофильная реакция
Макрофаги	6 %	Фагоцитарная активность, макрофагальный ответ
Мезотелиальные клетки	3–4 в п/з	Реактивный мезотелий с признаками гиперплазии
Эритроциты	Покрывают п/з	Умеренно покрывают поле зрения
Инфекционные агенты	Не выявлены	Бактерии и грибы в препарате не обнаружены

4. Заключение лаборатории и клиническая интерпретация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ:

«Хілозний випіт з ознаками неопластичного процесу» (Хилёзный выпот с признаками неопластического процесса).

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР:

- Биохимическая верификация хилоторакса:** Концентрация триглицеридов в выпоте (3.87 ммоль/л) существенно превышает сывороточный уровень, а соотношение холестерина к триглицеридам составляет < 1.0 , что является патогномоничным критерием застоя и накопления хилуса в плевральной полости.
- Механизм формирования:** У пожилых собак (11 лет) хилёзный выпот наиболее часто обусловлен **механической обструкцией или сдавлением грудного лимфатического протока** опухолевой массой в краниальном средостении или локальной лимфаденопатией.
- Ведущий дифференциальный диагноз:** Выявление атипичной лимфоидной фракции (30% лимфоцитов) на фоне реактивного мезотелия с высокой вероятностью указывает на **медиастинальную или мультицентрическую лимфому**.
- Сопутствующий почечный контекст:** Наличие стабильной ХБП 2 стадии по IRIS (креатинин 132–140 мкмоль/л) требует проведения любых диагностических и терапевтических процедур под строго контролируемой гидратацией.

5. Рекомендуемые пошаговые действия врача-онколога

- Морфологическая верификация:** Проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) выявленных масс/лимфоузлов с последующей иммуноцитохимией (ICC: CD20/CD3), PARR-тестом на моноклональность или проточной цитометрией.
- Стадирование процесса:** УЗИ брюшной полости и ангио-КТ / УЗИ грудной клетки для локализации обструкции грудного протока.
- Исключение кардиогенной причины:** ЭхоКГ сердца и биомаркер NT-proBNP для исключения застойной правожелудочковой недостаточности.

- **Симптоматический контроль:** Проведение торакоцентеза при повышении ЧДД во сне > 30-35 в мин во избежание острой гипоксии.