第四单元 • 加法模型和乘法模型 • 参考答案

单独答案页 • 可只打印这一页

第四单元 • 加法模型和乘法模型 • 参考答案

一、填空

1. 621；总数－上午＝下午（或：总数－部分＝另一部分）
2. 1620；单价×数量＝总价（108×15）
3. 80（已行 274－34＝240，240÷3＝80）
4. 272（女生 113＋46＝159，共 113＋159＝272）
5. （1）单价
   （2）已知单价和数量，求总价
   （3）总价＝单价×数量
6. 高铁列车（用时 6 小时，速度约 1260÷6＝210 千米/时，最接近 230）
7. 20；2500（箭头指向 125×20 的部分积）

二、选一选

1. ② 路程
2. ① 单价
3. ③ 民用客机（约 900 千米/时最快；①≈72 千米/时，②＝300 千米/时，④＝90 千米/时）
4. ②（竖式中 450＝225×2，表示 2 分钟路程；若原卷箭头指移位的 2250 则选 ③）
5. ③（面积＝15×(15×4)＝15×60，不能只用 15×4；①②④均可直接用 15×4）
6. ③（3×[14÷(4＋3)]＝乐乐相遇时所行路程）
7. ③（走了 20 分钟×50＝1000 米，全程约 1200 米，最可能到 ③ 处）

三、竖式计算

- 354×18＝6372
- 750×40＝30000
- 75×504＝37800
- 138×25＝3450

四、解决问题

1. 16×120＝1920（元）
2. 速度＝900÷18＝50 米/分；450÷50＝9（分钟）
3. 一昼夜行 1000＋800＝1800 里；1800×420＝756000（米）
4. 苹果 6÷2＝3 元/千克，8×3＝24 元；葡萄 15÷3＝5 元/千克，9×5＝45 元；共 69 元
5. （1）妈妈路程 370－160＝210 km，速度 210÷3＝70 km/h
   （2）求全程的平均速度（总路程÷总时间）
6. （1）选 ①③；数量关系：路程＝速度×时间
   （2）57×(56－20)＝57×36＝2052（米）
   （3）示例：百合花单价是多少？840÷24＝35 元/束（其他合理问题亦可）