



PRIMMAX SANAP

DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

- Ação bactericida comprovada para: *Listeria Monocytogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis* e *Escherichia Coli*;
- Ação bactericida comprovada para desinfecção de hortifrutícolas: *Enterococcus faecium* e *Escherichia Coli*;
- Atende a resolução RDC 774/2023 da ANVISA;
- Promove alveamento das superfícies removendo manchas ocasionadas por resíduos e pigmentos de alimentos;
- Seguro para efluentes uma vez que decompõe-se em água liberando oxigênio e ácido acético.
- Eficaz em temperatura ambiente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido transparente
Cor..... Incolor
Odor..... Característico
Densidade (g/cm³) 1,12 ± 0,05

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: Desinfecção de superfícies em geral de cozinhas profissionais e Indústrias alimentícias, incluindo equipamentos processadores de carne e salas refrigeradas. Em Indústrias de bebidas pode ser utilizado na limpeza por circulação (CIP) para desinfecção de tanques, tubulações, carbonatadores, trocadores de calor e enchedoras. Em laticínios, pode ser utilizado para desinfecção de plantas HTST e UHT. Na desinfecção de hortifrutícolas e sanificação dos frutos na pós-colheita.

MODO DE USO:

Para desinfecção por circulação (CIP) - circular o PRIMMAX SANAP na concentração entre 0,15 e 0,30% (p/v), por 20 a 30 minutos em temperatura ambiente. Para desinfecção por imersão (uso obrigatório de EPI'S) - utilizar o PRIMMAX SANAP na concentração de 0,20% (p/v), por 10 a 15 minutos em temperatura ambiente. Para desinfecção por pulverização (uso obrigatório de EPI'S) - aplicar o PRIMMAX SANAP na concentração de 0,05% (p/v), por 10 a 15 minutos em temperatura ambiente. Para desinfecção de superfícies com alto nível de contaminação - preparar uma solução 0,5% (diluir 50 mL do produto e completar o volume com água em um recipiente de capacidade de 10 litros). Aplicar na superfície previamente limpa ou emergir os utensílios e deixar agir por 10 a 15 minutos, remover a solução desinfetante e enxaguar com água potável. Para o controle de microrganismos na lavagem de ovos, carcaças e ou partes de animais de açougue, peixes e crustáceos: utilizar soluções nas concentrações de 80 a 200 ppm de PRIMMAX SANAP. O enxágue final de equipamentos deve ser realizado apenas com água potável. Sanificação (desinfecção) de frutas, verduras e legumes: lavar as frutas, verduras (desfolhadas) e legumes em água corrente, imergir em uma solução de 0,067% de PRIMMAX SANAP (6,7 mL do produto e completar o volume com água em um recipiente com capacidade para 10 litros) por 10 minutos, retirar da solução sanitificante e enxaguar com água corrente. Mamadeiras, bicos e chupetas: lavar as mamadeiras, bicos e chupetas com auxílio de escova e detergente, enxaguar em abundância. Imergir na solução de PRIMMAX SANAP com concentração 0,067% durante 15 minutos. A seguir enxaguar com água filtrada e deixar secar. USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX SANAP é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 5 Kg e 20 Kg.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

COMPOSIÇÃO:

Ácido peracético, peróxido de hidrogênio, acidificante e veículo.

Princípio Ativo:

Ácido Peracético.....15,0%.

INCOMPATIBILIDADES:

Álcalis, ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem.

Metais: ferro, cobre, níquel, titânio, chumbo, manganês, cromo, prata, Zinco e suas respectivas ligas. Borrachas: naturais e sintéticas.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX: 0800 722 6001. Tratamento específico. Contém Ácido Peracético. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO-MS: 3.0415.0237

PRAZO DE VALIDADE: 8 Meses a partir da data de fabricação

REV.: 014/23