

1 Spazio euclideo

$$R^n := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, x_n \in R\}$$

In R^n vale

Somma tra vettori $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$

$$x + y = (x_1 + y_1 + \dots + x_n + y_n)$$

Prodotto con scalare dato $x = (x_1, \dots, x_n), \lambda \in R$, poniamo

$$\lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Definizione Prodotto scalare euclideo Dati $x, y \in R^n$, poniamo:

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

1.1 Proprietà:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \quad \forall x, y \in R^n$
2. $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ e $\langle z, \lambda x + \mu y \rangle = \lambda \langle z, x \rangle + \mu \langle z, y \rangle \quad \forall x, y, z \in R^n, \lambda, \mu \in R$
3. $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in R^n$
4. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = \underline{0} = (0, 0, \dots, 0)$.

1.2 Definizione Vettori ortogonale

$x, y \in R^n$ si dicono ortogonali se $\langle x, y \rangle = 0$

1.3 Definizione Norma euclidea

Dato $x \in R^n$, poniamo $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \in [0, +\infty[$
Si dice norma di x (viene usata la notazione $|x|$)

Interpretazione della norma con lunghezza (con il Teorema di Pitagora)

1.3.1 Proprietà della norma

1. $|\lambda x| = |\lambda| \cdot |x| \quad \forall \lambda \in R, x \in R^n$
2. $|x| \geq 0 \quad \forall x \in R^n$ in oltre $|x| = 0 \iff x = 0$
3. $|x + y| \leq |x| + |y| \quad \text{for all } x, y \in R^n$ (disuguaglianza triangolare, con relativa interpretazione)

1.4 Normalizzato di un vettore

Definizione: dato $x \neq 0, x \in R^n$, il normalizzato di x è il vettore $\frac{x}{|x|}$, l'unico multiplo positivo di x che ha norma 1

1.5 Scrittura del prodotto scalare in coordinate polari in R^n

Dati $x \in R^2 \setminus \{0\}$, scriviamo

$$x = |x| \frac{x}{|x|} = r(\cos \theta, \sin \theta)$$

dove $r = |x|$ e $\theta \in R$ è opportuno. Presi $x = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ e $y = (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi)$, risulta

$$\langle x, y \rangle = r\rho \cos(\phi - \theta) = |x| \cdot |y| \cos(\phi - \theta)$$

la conseguenza è la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

1.6 La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$\forall x, y \in R^n$ vale

$$|\langle x, y \rangle| \leq |x| \cdot |y|$$

Inoltre vale l'uguaglianza sse x e y sono indipendenti

1.7 Formula del "quadrato di un binomio"

Dati $x, y \in R^n$ vale

$$|x + y|^2 = |x|^2 + 2\langle x, y \rangle + |y|^2$$

La dimostrazione avviene con le proprietà del prodotto scalare. Dalla formula sopra segue che, se $x \perp y$ in R^n , allora vale

$$|x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2$$

Teorema di Pitagora

1.8 Disuguaglianza triangolare

Ancora della formula del "quadrato di un binomio" si può ottenere la dimostrazione della disuguaglianza triangolare

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in R^n$$

Infatti

$$|x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2 + 2\langle x, y \rangle \leq (\text{per Cauchy-Schwarz}) \leq |x|^2 + |y|^2 + 2|x| \cdot |y| = (|x| + |y|)^2 \quad \forall x, y \in R^n$$

1.9 Definizione distanza

$\forall x, y \in R$ la distanza tra x e y è

$$|x - y|$$

1.10 Interni sferici o dischi o palle

Dato $x \in R^n$ (centro) e $r > 0$ (raggio), poniamo

$$B(x, r) = \{y \in R^n \mid |y - x| < r\} \text{ (palla con centro } x \text{ e raggio } r)$$

1.11 Definizione insieme limitato

Sia $A \subseteq R^n$, si dice limitato se $\exists R > 0$ t.c. $A \subseteq B(0, R)$

1.12 Insieme aperto

Sia $A \subseteq R^n$ si dice aperto se

$$\forall x \in A \exists r > 0 \text{ t.c. } B(x, r) \subseteq A$$

Esempi: Gli intervalli $]a, b[$, i rettangoli $A = IJ \subseteq R^2$ con I, J aperti in R .

2 Successioni in R^n

Sia $(x_k)_{k \in N}$ una successione in $R^n \quad \forall k \in N$

2.1 Definizione

$(x_k)_{k \in N}$ successione in R^n ; $x \in R^n$ Si dice $x_k \rightarrow x$ per $k \rightarrow +\infty$ se vale

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^j = x^j \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Equivalentemente se vale $\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k - x| = 0$

3 Funzioni di più variabili

$A \subseteq R^n, B \subseteq R^q$. Data $f : A \rightarrow B$, il grafico di f è

$$Graf(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq A \times B$$

3.1 Definizione funzione continua

$f : A \rightarrow B$ (con $A \subseteq R^n, B \subseteq R^q$)

f si dice continua se \bar{x} se vale quanto segue:

$$\forall (x_k)_{k \in N}, (x_k) \text{ successione in } A, x_k \rightarrow +\infty \bar{x}$$